

Esercizi sugli studi di funzione

Studiare l'andamento e tracciare il grafico delle seguenti funzioni di x :

- (a) $\frac{x-1}{x^2}$; (b) $\frac{x^4}{x^3+2}$; (c) $2\cos x - \sin^2 x$; (d) $x^3 e^x$;
(e) $\log|e^x - 3x|$; (f) $\arctg \frac{2x+1}{|x|-1}$; (g) $(x^2+2x)\log|x|$; (h) $e^{\frac{1}{\sin x}}$;
(i) $|\operatorname{tg} x| - 2x$; (j) $\sqrt{|x^2+2x-3|} - x$; (k) $(x+1)\arctg|x|$; (l) $(|x|-1)e^{\frac{1}{x+1}}$.

(Per rendere più significativo l'esercizio, si consiglia di non leggere gli svolgimenti scritti e non osservare i grafici delle funzioni prima di aver provato a compierne personalmente lo studio, per quanto possibile.)

Risoluzione. Per ogni funzione f si seguirà, di massima, questo schema: dominio naturale; eventuali periodicità e parità; continuità; limiti notevoli; limitatezza; intersezioni del grafico con gli assi coordinati; segno; asintoti, e loro eventuali intersezioni col grafico; derivabilità, e calcolo di f' ; punti stazionari; crescita; estremanti locali; derivabilità ulteriore, e calcolo di f'' ; punti stazionari di f' ; convessità; punti di flesso, e calcolo della “tangente inflessionale”; descrizione della regolarità di f . I grafici sono riportati alla fine.

(a) [$f(x) = \frac{x-1}{x^2}$] Il dominio è dato da $x \neq 0$. La funzione non ha periodo né parità, è di classe \mathcal{C}^∞ in ogni punto del dominio, si annulla in $x = 1$ ed è positiva per $x > 1$. Vale $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0^\mp$ e $\lim_{x \rightarrow 0^\mp} f(x) = -\infty$; pertanto la funzione è inferiormente illimitata ma, come si può intuire da quanto appena calcolato, si può dimostrare che essa è superiormente limitata.¹ Come visto, $y = 0$ è asintoto orizzontale a $\mp\infty$ (interseca il grafico di $f(x)$ in $x = 1$), e $x = 0$ è asintoto verticale bilatero. La derivata è $f'(x) = \frac{1 \cdot x^2 - (x-1) \cdot 2x}{x^4} = \frac{2-x}{x^3}$; vale $f'(x) = 0$ per $x = 2$, e $f'(x) > 0$ per $0 < x < 2$, pertanto f decresce strettamente per $x < 0$ e $x > 2$ e cresce strettamente per $0 < x < 2$, così che $x = 2$ è punto di massimo relativo (in realtà, come preannunciato, assoluto) stretto per f , con $f(2) = \frac{1}{4}$. La derivata seconda risulta $f''(x) = \frac{(-1) \cdot x^3 - (2-x) \cdot 3x^2}{x^6} = \frac{2x-3}{x^4}$; vale $f''(x) = 0$ per $x = 3$, e $f''(x) > 0$ per $x > 3$, pertanto f è strettamente concava per $x < 0$ e $0 < x < 3$ e strettamente convessa per $x > 3$, dunque $x = 3$ è un flesso, con quota $f(3) = \frac{2}{9}$ e pendenza $f'(3) = -\frac{1}{27}$.

(b) [$f(x) = \frac{x^4}{x^3+2}$] Il dominio è dato da $x \neq -\sqrt[3]{2}$. La funzione non ha periodo né parità, è di classe \mathcal{C}^∞ in ogni punto del dominio, vale $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = \mp\infty$ e $\lim_{x \rightarrow -\sqrt[3]{2}^\mp} f(x) = \mp\infty$, dunque è illimitata sia sopra

¹Notando che (a) $f(x)$ è positiva se e solo se $x > 1$, (b) f è continua in tutto il suo dominio, (c) vale ad esempio $f(3) = \frac{2}{9}$, e (d) essendo $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^+$, esiste $M > 3$ tale che $f(x) < \frac{1}{9}$ per ogni $x > M$, certamente il massimo assoluto di $f(x)$ sull'intervallo $[1, M]$ —che esiste per il Teorema di Weierstrass— è anche massimo assoluto per $f(x)$ su tutto il suo dominio.

che sotto. Si ha $f(0) = 0$, $f(x) = 0$ solo per $x = 0$ e $f(x) > 0$ per $x > -\sqrt[3]{2}$. La retta $x = -\sqrt[3]{2}$ è asintoto verticale bilatero, e non vi sono asintoti orizzontali. Poiché invece $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{x^4}{x^4+2x} = 1$ e $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{x^4 - x^4 - 2x}{x^3+2} = 0$, si ha che $y = x$ è asintoto obliquo per f a $\mp\infty$ (interseca il grafico di $f(x)$ quando $f(x) = x$, dunque solo in $x = 0$). La derivata (dopo conti) è $f'(x) = \frac{x^3(x^3+8)}{(x^3+2)^2}$: vale $f'(x) = 0$ per $x = 0$ e $x = -2$, e $f'(x) > 0$ per $x < -2$ oppure $x > 0$: se ne deduce che $x = -2$ è punto di massimo locale (a quota $f(-2) = -\frac{8}{3}$) e $x = 0$ punto di minimo locale (a quota $f(0) = -\frac{8}{3}$). La derivata seconda (sempre dopo conti) è $f''(x) = \frac{12x^2(4-x^3)}{(x^3+2)^3}$: vale $f''(x) = 0$ per $x = 0$ e $x = \sqrt[3]{4}$, e $f''(x) > 0$ per $-\sqrt[3]{2} < x < \sqrt[3]{4}$, pertanto $x = \sqrt[3]{4}$ è un flesso con quota $f(\sqrt[3]{4}) = \frac{2\sqrt[3]{4}}{3}$ e pendenza $f'(\sqrt[3]{4}) = \frac{4}{3}$.

(c) [$f(x) = 2 \cos x - \sin^2 x$] La funzione ha dominio \mathbb{R} , periodo 2π ed è pari: conviene dunque studiarla in $[-\pi, \pi]$. Essa è ovunque C^∞ , vale $f(-\pi) = f(\pi) = -2$ e $f(0) = 0$; poiché $|f(x)| \leq 2|\cos x| + |\sin^2 x| \leq 3$, la funzione è limitata. Da $f(x) = \cos^2 x + 2 \cos x - 1 = 0$ si ottiene $\cos x = -\sqrt{2} - 1$ (impossibile) oppure $\cos x = \sqrt{2} - 1$: posto $\alpha = \arccos(\sqrt{2} - 1)$, poiché $0 < \sqrt{2} - 1 < \frac{1}{2}$ si ha che $\frac{\pi}{3} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, e vale $f(x) = 0$ per $x = \pm\alpha$. Quanto al segno, la disequazione $f(x) = \cos^2 x + 2 \cos x - 1 > 0$ è soddisfatta per $\cos x < -\sqrt{2} - 1$ (impossibile) oppure $\cos x > \sqrt{2} - 1$, vero per $-\alpha < x < \alpha$. La derivata risulta $f'(x) = -2 \sin x - 2 \sin x \cos x = -2 \sin x(1 + \cos x)$: vale $f'(x) = 0$ per $x = \pm\pi$ e $x = 0$, e $f'(x) > 0$ quando $\sin x < 0$, ovvero per $-\pi < x < 0$: se ne deduce che f cresce strettamente per $-\pi < x < 0$ e decresce strettamente per $0 < x < \pi$, dunque $x = \pm\pi$ e $x = 0$ sono rispettivamente punti di minimo e massimo relativi (in realtà assoluti) a quota -2 e 2 . La derivata seconda è $f''(x) = -2(\cos x(1 + \cos x) + \sin x(-\sin x)) = -2(2 \cos x - 1)(\cos x + 1)$: vale $f''(x) = 0$ per $x = \pm\pi$ e $x = \pm\frac{\pi}{3}$, e $f''(x) > 0$ quando $\cos x < \frac{1}{2}$, ovvero per $-\pi < x < -\frac{\pi}{3}$ e $\frac{\pi}{3} < x < \pi$: dunque f è strettamente convessa all'esterno di $\pm\frac{\pi}{3}$ e strettamente concava all'interno, così che $x = \pm\frac{\pi}{3}$ sono flessi con quota $f(\pm\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{4}$ e pendenza $f'(\pm\frac{\pi}{3}) = \mp\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(d) [$f(x) = x^3 e^x$] Il dominio è tutto \mathbb{R} ; la funzione non ha periodo né parità, ed è ovunque C^∞ . Vale ovviamente $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, mentre $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ è in forma indeterminata $\infty \cdot 0$; tuttavia, posto $t = -x$ si ottiene $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (-t^3 e^{-t}) = -\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3}{e^t} = 0^-$. Con gli stessi ragionamenti usati per le funzioni studiate in precedenza, si conclude che $f(x)$ è superiormente illimitata ma inferiormente limitata. Si ha $f(0) = 0$, $f(x) = 0$ solo per $x = 0$ e $f(x) > 0$ per $x > 0$. Come visto, la retta $y = 0$ è asintoto orizzontale a $-\infty$; essendo $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^x = +\infty$, non vi sono asintoti obliqui a $+\infty$ (era chiaro: la funzione cresce troppo rapidamente). La derivata risulta $f'(x) = 3x^2 e^x + x^3 e^x = x^2(x+3)e^x$: vale $f'(x) = 0$ per $x = -3$ e $x = 0$, mentre $f'(x) > 0$ per $x > -3$: se ne deduce che $x = -3$ è punto di minimo locale (in realtà assoluto) stretto, a quota $f(-3) = -\frac{27}{e^3} \sim 1,3$, mentre $x = 0$ è semplicemente un flesso orizzontale. La derivata seconda risulta $f''(x) = 2x(x+3)e^x + x^2 1e^x + x^2(x+3)e^x = x(x^2 + 6x + 6)e^x$: vale $f''(x) = 0$ per $x = 0$, $x = -3 - \sqrt{3} \sim -4,3$ e $x = -3 + \sqrt{3} \sim -1,7$, e $f''(x) > 0$ per $-3 - \sqrt{3} < x < -3 + \sqrt{3}$ oppure $x > 0$: pertanto, oltre al già noto flesso orizzontale $x = 0$, sono flessi anche i punti $x = -3 \pm \sqrt{3}$.

(e) [$f(x) = \log |e^x - 3x|$] Il dominio è dato dagli $x \in \mathbb{R}$ tali che $e^x \neq 3x$. Ma il grafico di e^x e quello di $3x$ si intersecano o no? Imponendo alla retta tangente $y - e^c = e^c(x - c)$ di passare per l'origine si trova $c = 1$ e la retta $y = ex$: essendo $3 > e$ e l'esponenziale strettamente convesso, esisteranno esattamente due punti α e β (con $0 < \alpha < 1 < \beta < 2$ essendo $(e^x)_{x=2} = e^2 > 6 = (3x)_{x=2}$) per cui $e^x \neq 3x$. Il dominio è dunque $\mathbb{R} \setminus \{\alpha, \beta\}$, ed in esso la funzione è di classe C^∞ . I limiti notevoli sono $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \beta} f(x) = -\infty$. Vale $f(0) = 0$, mentre $f(x) = 0$ se e solo se $|e^x - 3x| = 1$, cioè $e^x = 3x - 1$ (impossibile) o $e^x = 3x + 1$ (che accade per $x = 1$ e $x = \gamma$ con $\beta < \gamma < 2$, essendo $(e^x)_{x=2} = e^2 > 7 = (3x + 1)_{x=2}$); quanto a $f(x) > 0$, esso vale quando $|e^x - 3x| > 1$, ovvero $e^x < 3x - 1$ (impossibile) o $e^x > 3x + 1$ (che accade per $x < 0$ e $x > \gamma$). La funzione non ha asintoto obliquo a $-\infty$ (si noti che $f(x) \sim_{-\infty} \log |x|$) mentre ha $y = x$ come asintoto obliquo a $+\infty$ (infatti $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(e^x - 3x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 3}{e^x - 3x} = 1$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\log(e^x - 3x) - \log e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log \frac{e^x - 3x}{e^x} = 0$), e da $f(x) = x$ si ha $|e^x - 3x| = e^x$, ovvero $e^x - 3x = -e^x$ (impossibile) o $e^x - 3x = e^x$ (da cui $x = 0$). La derivata è $f'(x) = \frac{e^x - 3}{e^x - 3x}$; si ha $f'(x) = 0$ per $x = \log 3 \sim 1,1$ e $f'(x) > 0$ (cioè f strettamente crescente) per $\alpha < x < \log 3$ e $x > \beta$: dunque $x = \log 3$ è un punto di massimo locale, con $f(\log 3) = \log(3(\log 3 - 1)) \sim \log \frac{1}{3} = -\log 3 \sim -1,1$. Infine si ricava $f''(x) = -\frac{9}{(e^x - 3x)^2} ((x - 2)e^x + 3)$. Il confronto grafico tra le funzioni e^x e $-\frac{3}{x-2}$ risulta troppo delicato tra 0 e 2 (le due funzioni sono estremamente vicine; in particolare, in $x = 0$ la seconda sta sopra la prima ma ha pendenza inferiore...), dunque conviene procedere come segue: considerando la funzione derivabile $\varphi(x) = (x - 2)e^x + 3$ si ha $\varphi'(x) = (x - 1)e^x$, dunque $\varphi(x)$ ha minimo assoluto in $x = 1$, in cui vale $\varphi(1) = 3 - e \sim 0,3 > 0$: dunque $\varphi(x)$ è sempre positiva, e ne deduciamo che $f''(x) < 0$ (ovvero, f è concava) in ogni x del suo dominio.

(f) $[f(x) = \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{|x|-1}]$ Il dominio è $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$; la funzione non ha periodicità o parità, ed è \mathcal{C}^∞ in tutto il suo dominio eccetto che in 0, ove è certamente continua ma non è detto sia derivabile (a causa della presenza di $|x|$). Inoltre, f è limitata perché $|f(x)| \leq \frac{\pi}{2}$ per ogni x nel dominio. I limiti notevoli sono $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = \mp \operatorname{arctg} 2$ (ove $\operatorname{arctg} 2 \sim 1,1$) e $\lim_{-1^+} f(x) = \lim_{1^+} f(x) = \mp \frac{\pi}{2}$. Si ha $f(0) = -\frac{\pi}{4}$ e $f(x) = 0$ se e solo se $x = -\frac{1}{2}$; si ha poi $f(x) > 0$ se e solo se $\frac{2x+1}{|x|-1} > 0$, il che è vero se e solo se $-1 < x < -\frac{1}{2}$ oppure $x > 1$. Come visto, la retta $y = \mp \operatorname{arctg} 2$ è asintoto orizzontale per $f(x)$ a $\mp\infty$; da $f(x) = -\operatorname{arctg} 2$ (risp. $f(x) = \operatorname{arctg} 2$) da si ricava la sola intersezione $x = \frac{1}{4}$ (risp. $x = -\frac{3}{4}$). Per $x \neq 0, \pm 1$ si ricava $f'(x) = -\frac{2+\operatorname{sign} x}{5x^2+4x-2|x|+2}$, ovvero $f'(x) = -\frac{1}{5x^2+6x+2}$ (se $x < 0, x \neq -1$) e $f'(x) = -\frac{3}{5x^2+2x+2}$ (se $x > 0, x \neq 1$): si noti che $f'(x) < 0$ per ogni tale x , dunque la funzione è strettamente decrescente negli intervalli $]-\infty, -1[$, $]-1, 1[$ e $]1, +\infty[$. Per il disegno, è interessante notare che $\lim_{x \rightarrow -1} f'(x) = -1$, $f'_-(0) = -\frac{1}{2}$, $f'_+(0) = -\frac{3}{2}$ (dunque, come si sospettava, f non è derivabile in 0) e $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = -\frac{1}{3}$. Infine, se $x < 0$ e $x \neq -1$ si ha $f''(x) = 2\frac{5x+3}{(5x^2+6x+2)^2}$, mentre se $x > 0$ e $x \neq 1$ si ha $f''(x) = 6\frac{5x+1}{(5x^2+6x+2)^2}$: vale $f''(x) = 0$ se e solo se $x = -\frac{3}{5}$, e $f''(x) > 0$ (dunque f è strettamente convessa) per $-\frac{3}{5} < x < 0$ oppure $x > 0$; in $x = -\frac{3}{5}$ la funzione ammette dunque un flesso, con $f(-\frac{3}{5}) = -\operatorname{arctg} \frac{1}{2} \sim -0,46$ e $f'(-\frac{3}{5}) = -5$.

(g) $[f(x) = (x^2 + 2x) \log |x|]$ La funzione non è periodica, non ha parità, ed ha come dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; vale poi, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ e (usando il noto $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \log |t| = 0^+$) $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = 0^\mp$. Si ha $f(x) = 0$ se e solo se (nel dominio) $x^2 + 2x = 0$ oppure $\log |x| = 0$, ovvero se e solo se (nel dominio) $x = -2, -1, 1$. Vediamo ora il segno. Si ha $x^2 + 2x > 0$ se e solo se $x < -2$ oppure $x > 0$, mentre $\log |x| > 0$ se e solo se $|x| > 1$, cioè se e solo se $x < -1$ oppure $x > 1$: da ciò deduciamo che sarà $f(x) > 0$ se e solo se $x < -2, -1 < x < 0$ oppure $x > 1$. La funzione è di classe \mathcal{C}^∞ nel suo dominio, ed è priva di asintoti lineari. La derivata risulta $f'(x) = (2x + 2) \log |x| + \frac{x^2+2x}{x} = 2(x+1) \log |x| + x + 2$. Si ha allora $f'(x) = 0$ se e solo se $2(x+1) \log |x| + x + 2 = 0$; se $x = -1$ ciò è falso, e se $x \neq -1$, dividendo per $x+1$, ciò vale se e solo se $\log |x| = -\frac{x+2}{2(x+1)}$. La funzione al primo membro è la nota $\log |x|$ (il cui grafico si ottiene “riflettendo quello di $\log x$ rispetto all’asse y ”), mentre la funzione al secondo membro è la funzione affine con asintoto orizzontale $y = -\frac{1}{2}$, asintoto verticale $x = -1$ e che vale -1 per $x = 0$; un semplice confronto grafico tra le due funzioni mostra chiaramente l’esistenza di tre punti a, b, c con $-2 < a < -1 < b < 0 < c < 1$ in cui i loro grafici si intersecano. Per il segno di $f'(x)$, notiamo che $f'(-1) = 1 > 0$; se invece $x \neq -1$, nel dividere per $x+1$ bisogna fare attenzione al segno di quest’ultimo, e dunque se $x \geq -1$ si ha $f'(x) = 2(x+1) \log |x| + x + 2 > 0$ se e solo se $\log |x| \geq -\frac{x+2}{2(x+1)}$. Usando ancora il suddetto confronto grafico, ricaviamo dunque che $f'(x) > 0$ se e solo se $a < x < b$ oppure $x > c$: ne deduciamo che $x = a$ e $x = c$ sono punti di minimo relativo, mentre $x = b$ è un punto di massimo relativo. È altresì interessante notare che $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f'(x) = -\infty$: la funzione “si verticalizza” mentre tende a zero per $x \rightarrow 0$. Se si vuole (ma non era richiesto) si può derivare ulteriormente, ottenendo $f''(x) = 2 \log |x| + 2\frac{x+1}{x} + 1 = 2 \log |x| + \frac{3x+2}{x^2}$, che si può studiare coi metodi già usati per f' .

(h) $[f(x) = e^{\frac{1}{\sin x}}]$ Il dominio è $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}\pi = \{x : x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. La funzione è periodica di periodo 2π , dunque studiamola in $]-\pi, \pi[\setminus \{0\}$, in cui è di classe \mathcal{C}^∞ . I limiti notevoli sono $\lim_{x \rightarrow -\pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0^+$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = +\infty$; la funzione è inferiormente limitata da 0 (infatti un esponenziale è sempre > 0), e per quanto appena visto si ha $0 = \inf(f)$. La derivata è $f'(x) = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} e^{\frac{1}{\sin x}}$: si ha $f'(x) = 0$ per $\cos x = 0$, ovvero $x = \pm \frac{\pi}{2}$, e $f'(x) > 0$ per $\cos x < 0$, ovvero $-\pi < x < -\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi}{2} < x < \pi$. Dunque f ha un punto di massimo in $-\frac{\pi}{2}$ (con $f(-\frac{\pi}{2}) = 1/e$) e un punto di minimo in $\frac{\pi}{2}$ (con $f(\frac{\pi}{2}) = e$). Per il disegno, si noti che $\lim_{x \rightarrow -\pi^+} f'(x) = 0^+$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0^-$ (basta porre $t = \frac{1}{\sin x}$). Infine, si calcola $f''(x) = -\frac{\sin^3 x + \sin^2 x - 2 \sin x - 1}{\sin^4 x} e^{\frac{1}{\sin x}}$. Posto $u = \sin x$, consideriamo il polinomio $P(u) = u^3 + u^2 - 2u - 1$: derivando si ottiene $P'(u) = 3u^2 + 2u - 2$, dunque P cresce per $u < -\frac{\sqrt{7}+1}{2} \sim -1,8$ e $u > \frac{\sqrt{7}-1}{2} \sim 0,8$, ed essendo $\lim_{u \rightarrow \mp\infty} P(u) = \mp\infty$, $P(-2) = -1$, $P(-1) = 1$ e $P(0) = P(1) = -1$, per il Teorema degli Zeri le tre soluzioni $a < b < c$ di $P(u) = 0$ (si noti che non ci sono radici multiple, perché $P(u)$ e $P'(u)$ non hanno radici comuni) soddisferanno $a < -1 < b < 0 < 1 < c$. Pertanto $f''(x) = -\frac{(\sin x - a)(\sin x - b)(\sin x - c)}{\sin^4 x} e^{\frac{1}{\sin x}}$ ove vale sempre $\sin x - a > 0$ e $\sin x - c < 0$. Ne ricaviamo che $f''(x) = 0$ se e solo se $\sin x = b$ (da cui $x = \arcsin b < 0$ e $x = -\pi - \arcsin b$), e $f''(x) = 0$ se e solo se $\sin x > b$ (da cui $-\pi < x < -\pi - \arcsin b$, $\arcsin b < x < 0$ e $0 < x < \pi$): pertanto $-\pi - \arcsin b$ e $\arcsin b$ sono flessi, collocati tra $-\pi$ e 0; in essi f vale $e^{\frac{1}{b}} < 1$ e f' vale $\pm \frac{\sqrt{1-b^2}}{b^2} e^{\frac{1}{b}}$.

(i) $[f(x) = |\operatorname{tg} x| - 2x]$ Studiamo la funzione in $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Vale $\lim_{-\frac{\pi}{2}^+} f(x) = \lim_{\frac{\pi}{2}^-} f(x) = +\infty$. Si ha $f(x) \geq 0$ se e solo se $|\operatorname{tg} x| \geq 2x$, ed un semplice confronto grafico mostra che esiste un unico punto a in $]0, \frac{\pi}{2}[$ (ma più vicino a $\frac{\pi}{2}$ che a 0) tale che $f(x) = 0$ per $x = 0$ e $x = a$, $f(x) < 0$ per $0 < x < a$ e

$f(x) > 0$ per $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ oppure $a < x < \frac{\pi}{2}$. La derivata è $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 2 = \frac{1-2\cos^2 x}{\cos^2 x}$ se $x > 0$, ed è $f'(x) = -\frac{1}{\cos^2 x} - 2 = -\frac{1+2\cos^2 x}{\cos^2 x}$ se $x < 0$: dunque, se $x < 0$ la funzione è strettamente decrescente, mentre per $x > 0$ essa ha punti stazionari per $1 - 2\cos^2 x = 0$, ovvero per $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, che dà $x = \frac{\pi}{4}$, ed è strettamente crescente se $1 - 2\cos^2 x > 0$, ovvero per $\cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, ovvero per $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$. Dunque $x = \frac{\pi}{4}$ è un punto di minimo relativo (che vale $f(\frac{\pi}{4}) = 1 - \frac{\pi}{2} \sim -0,5$). Nel punto $x = 0$ la funzione non è derivabile; tuttavia, poiché essa è decrescente subito prima e subito dopo, tale punto non sarà d'estremo locale. Si ha inoltre $f'_-(0) = -1 - 2 = -3$ e $f'_+(0) = 1 - 2 = -1$. La derivata seconda è $f''(x) = 2\frac{\sin x}{\cos^3 x} > 0$ se $x > 0$, ed è $f''(x) = -2\frac{\sin x}{\cos^3 x} > 0$ se $x < 0$: dunque la funzione è strettamente convessa sia per $x > 0$ che per $x < 0$, e poiché $f'_-(0) = -3 < f'_+(0) = -1$ lo è anche in $x = 0$.

Sul resto del dominio naturale, la funzione tende a $+\infty$ in tutti i punti $\frac{\pi}{2} + k\pi$ (con $k \in \mathbb{Z}$); inoltre essa ha dei punti di minimo locale in $x_k = \frac{\pi}{4} + k\pi$, con $f(x_k) = 1 - \frac{\pi}{2} - 2k\pi$. Si noti che tutti questi minimi del grafico giacciono sulla retta $y = -2x + 1$ (infatti da $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ e $y = 1 - \frac{\pi}{2} - 2k\pi$, eliminando k si ottiene $y = 1 - \frac{\pi}{2} - 2\pi\frac{1}{\pi}(x - \frac{\pi}{4}) = -2x + 1$).

(j) [$f(x) = \sqrt{|x^2 + 2x - 3|} - x$] Il dominio di f è tutto \mathbb{R} (grazie al modulo, l'argomento della radice è sempre ≥ 0). La funzione non ha periodo né parità, ed è certamente continua ovunque; inoltre, nei punti in cui $x^2 + 2x - 3 \neq 0$ (ovvero per $x \neq -3$ e $x \neq 1$) essa è anche C^∞ . A tal proposito conviene notare subito che $x^2 + 2x - 3 \geq 0$ per $x \leq -3$ oppure $x \geq 1$, perciò in tal caso vale $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - x$; invece, quando $-3 < x < 1$ si ha $f(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2} - x$, e nei punti di passaggio vale $f(-3) = 3$ e $f(1) = -1$; vale inoltre $f(0) = \sqrt{3}$. Si ha poi $f(x) = 0$ quando $\sqrt{|x^2 + 2x - 3|} = x$; nell'ipotesi $x \geq 0$ ciò equivale a $|x^2 + 2x - 3| = x^2$, ovvero $x^2 + 2x - 3 = x^2$, da cui $x = \frac{3}{2} > 0$ (accettabile), oppure $x^2 + 2x - 3 = -x^2$, da cui $x = \frac{\sqrt{7}-1}{2} > 0$ (accettabile) e $x = \frac{-\sqrt{7}-1}{2} < 0$ (non accettabile). Pertanto il grafico di f interseca l'asse x nei due punti $x = \frac{\sqrt{7}-1}{2} \sim 0,8$ e $x = \frac{3}{2}$. Passando al segno, vale $f(x) > 0$ quando $\sqrt{|x^2 + 2x - 3|} > x$; se $x < 0$ ciò è sempre vero, mentre se $x \geq 0$ ciò equivale a $|x^2 + 2x - 3| \geq x^2$, ovvero $x^2 + 2x - 3 > x^2$, da cui $x > \frac{3}{2}$ (accettabile), oppure $x^2 + 2x - 3 < -x^2$, da cui $\frac{-\sqrt{7}-1}{2} < x < \frac{\sqrt{7}-1}{2}$ (accettabile solo l'intervallo $0 < x < \frac{\sqrt{7}-1}{2}$). Pertanto il grafico di f sta sopra l'asse x quando $x < \frac{\sqrt{7}-1}{2}$ e $x > \frac{3}{2}$.

Si ha $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (entrambi gli addendi tendono a $+\infty$), mentre $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ è in forma indeterminata $+\infty - \infty$; moltiplicando e dividendo per $\sqrt{x^2 + 2x - 3} + x$ si ottiene però $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + 2x - 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x - 3} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(2-3/x)}{x(\sqrt{1+2/x-3/x^2} + 1)} = 1$. Pertanto la retta $y = 1$ è asintoto orizzontale solo a $+\infty$; le sue inter-

sezioni col grafico di $f(x)$ sono date dall'equazione $f(x) = 1$, ovvero $\sqrt{|x^2 + 2x - 3|} = x + 1$, che nell'ipotesi $x + 1 \geq 0$, cioè $x \geq -1$, equivale a $|x^2 + 2x - 3| = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$, ovvero $x^2 + 2x - 3 = x^2 + 2x + 1$ (impossibile) oppure $x^2 + 2x - 3 = -(x^2 + 2x + 1)$, cioè $x^2 + 2x - 1 = 0$, con soluzioni $x = -1 \pm \sqrt{2}$ delle quali l'unica accettabile (perché ≥ -1) è $x = \sqrt{2} - 1 \sim 0,4$. A questo punto resta da indagare l'eventuale presenza di un asintoto obliquo a $-\infty$, pertanto calcoliamo $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x}{x}$ che è in

forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$; tuttavia, raccogliendo x^2 sotto radice e notando che $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (infatti x sta tendendo a $-\infty$) si ottiene $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1+2/x-3/x^2} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{1+2/x-3/x^2} - 1}{1} = -2$. Va calcolato ora $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{|x^2 + 2x - 3|} + x)$, in forma indeterminata $+\infty - \infty$; moltiplicando e dividendo per $\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x$ si ottiene $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 + 2x - 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x - 3} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(2-3/x)}{-x(\sqrt{1+2/x-3/x^2} + 1)} = -1$.

Pertanto la retta $y = -2x - 1$ è asintoto obliquo a $-\infty$, e interseca il grafico di $f(x)$ nel solo punto $x = -\sqrt{2} - 1 \sim -2,4$ (procedere come per le intersezioni con l'asintoto $y = 1$).

Passiamo finalmente al calcolo della derivata. Se $x < -3$ oppure $x > 1$ vale $f'(x) = \frac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x-3}} - 1 =$

$\frac{x+1-\sqrt{x^2+2x-3}}{\sqrt{x^2+2x-3}}$: con calcoli simili a quelli già fatti si ottiene che $f'(x) \geq 0$ per $x \geq \sqrt{2} - 1$, dunque f è

strettamente decrescente per $x < -3$ e strettamente crescente per $x > 1$. Invece, per $-3 < x < 1$ vale $f'(x) = \frac{-2x-2}{2\sqrt{3-2x-x^2}} - 1 = -\frac{x+1+\sqrt{3-2x-x^2}}{\sqrt{3-2x-x^2}}$, e si trova che $f'(x) \geq 0$ per $-3 < x \leq -\sqrt{2} - 1$: dunque

f è strettamente crescente per $-3 < x < -\sqrt{2} - 1$ e strettamente decrescente per $-\sqrt{2} - 1 < x < 1$, e il punto $x = -\sqrt{2} - 1$ è di massimo relativo con quota $f(-\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} + 1 \sim 3,8$. Da quanto detto, infine, i punti di passaggio $x = -3$ e $x = 1$ sono di minimo relativo; in essi la funzione è continua ma non derivabile, in quanto $\lim_{x \rightarrow -3^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \pm\infty$ (verificarlo): detto con altre parole, in tali punti il grafico assume pendenza infinita.

(k) [$f(x) = (x + 1)\arctg|x|$] Il dominio della funzione è tutto \mathbb{R} , ed in esso $f(x)$ è di classe C^∞ in tutti i punti diversi da 0; invece in $x = 0$, a causa di $|x|$, essa è continua ma probabilmente non derivabile. Limiti

notevoli: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = \mp\infty$. Vale $f(0) = 0$ e $f(x) = 0$ per $x = -1$ e $x = 0$; poiché $\arctg|x| > 0$ per ogni $\neq 0$, si ha $f(x) > 0$ per $x > -1$ ma $x \neq 0$. Per gli asintoti, vale $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{x+1}{x} \arctg|x| = \frac{\pi}{2}$, e $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} (f(x) - \frac{\pi}{2}x) = \lim_{x \rightarrow \mp\infty} (\frac{\arctg|x| - \pi/2}{1/x} + \arctg|x|) = \frac{\pi}{2} \pm 1$ (si può usare de l'Hôpital): dunque $y = x + \frac{\pi}{2} \pm 1$ è asintoto a $\mp\infty$. Quando $x \neq 0$, la derivata è $f'(x) = \arctg|x| + \frac{x+1}{x^2+1} \text{sign } x = (\text{sign } x)(\arctg x + \frac{x+1}{x^2+1})$. (Si noti subito che $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -1 = f'_-(0)$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1 = f'_+(0)$, dunque 0 è un punto angoloso.) Prepariamoci ad un confronto grafico tra $\arctg x$ e $\psi(x) = -\frac{x+1}{x^2+1}$. La funzione $\psi(x)$ si studia facilmente (definita su tutto \mathbb{R} ; nulla per $x = -1$ e positiva per $x < -1$; infinitesima a $\pm\infty$; la derivata è $\psi'(x) = \frac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2}$, dunque ψ è strettamente crescente per $x < -\sqrt{2} - 1 \sim -2,4$ e $x > \sqrt{2} - 1 \sim 0,4$, con massimo assoluto in $-\sqrt{2} - 1$ (che vale $f(-\sqrt{2} - 1) = \frac{1}{2}(\sqrt{2} - 1) \sim 0,2$) e minimo assoluto in $\sqrt{2} - 1$ (che vale $f(\sqrt{2} - 1) = \frac{1}{2}(-\sqrt{2} - 1) \sim -1,2$). È dunque chiaro che $\arctg x$ e $\psi(x)$ si incontrano se e solo se $x = a$ per un certo $-1 < a < 0$ (si ha $a \sim -0,46$). Perciò $f'(x) = 0$ per $x = a$, e $f'(x) > 0$ per $x < a$ oppure $x > 0$: in $x = a$ si avrà allora un punto di massimo locale (con $f(a) = -(a+1)\arctg a = (a+1)\frac{a+1}{a^2+1} = 1 + \frac{2a}{a^2+1} \sim 0,23$). Derivando ancora, sempre per $x \neq 0$ si ottiene $f''(x) = -2(\text{sign } x)\frac{x-1}{(x^2+1)^2}$: vale $f''(x) = 0$ per $x = 1$ e $f''(x) > 0$ (perciò f è strettamente convessa) per $0 < x < 1$, dunque 1 è un flesso (con $f(1) = \frac{\pi}{2}$ e $f'(1) = \frac{\pi}{4} + 1$).

(1) $[f(x) = (|x| - 1)e^{\frac{1}{x+1}}]$ Il dominio della funzione è $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. In esso, $f(x)$ è di classe \mathcal{C}^∞ in tutti i punti diversi da 0, mentre in $x = 0$ (a causa della presenza di $|x|$) essa è continua ma, probabilmente, non derivabile. I limiti notevoli sono $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = +\infty$ (si noti che $e^{\frac{1}{x+1}}$ tende a 1), $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0^+$ e $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ (si faccia attenzione ai segni; nel secondo caso la forma indeterminata $0 \cdot \infty$ del limite, che diventa $\lim_{x \rightarrow -1^+} (-x - 1)e^{\frac{1}{x+1}}$, si risolve col cambio $t = \frac{1}{x+1}$). Si ha $f(0) = -e$, $f(x) = 0$ per $x = 1$ (si ricordi che $x \neq -1$) e $f(x) > 0$ per $|x| > 1$, ovvero per $x < -1$ oppure $x > 1$. Si ha $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{x-1}{x} e^{\frac{1}{x+1}} = 1$, e $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x(e^{\frac{1}{x+1}} - 1) - e^{\frac{1}{x+1}}) = 0$ (si ponga $t = \frac{1}{x+1}$ e si ricordi che $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$), da cui l'asintoto $y = x + \infty$. In modo analogo, a $-\infty$ (notando che $|x| = -x$) si trova l'asintoto $y = -x - 2$. La derivata risulta $f'(x) = -\frac{x}{x+1} e^{\frac{1}{x+1}}$ (se $x < 0$, $x \neq -1$) e $f'(x) = \frac{x^2+x+2}{(x+1)^2} e^{\frac{1}{x+1}}$ (se $x > 0$): si noti che f' non si annulla mai (in 0 non è definita) e $f'(x) > 0$ (ovvero, f è strettamente crescente) se e solo se $-1 < x < 0$ oppure $x > 0$; si ha $f'_-(0) = 0$ e $f'_+(0) = 2$, dunque come previsto 0 è un punto angoloso. Derivando ulteriormente si ottiene infine $f''(x) = -\frac{1}{(x+1)^3} e^{\frac{1}{x+1}}$ (se $x < 0$, $x \neq -1$) e $f''(x) = -\frac{3x+5}{(x+1)^4} e^{\frac{1}{x+1}}$ (se $x > 0$): dunque f'' non si annulla mai e $f''(x) > 0$ (ovvero f è strettamente convessa) se e solo se $x < 1$.




Grafico di (a) $\frac{x-1}{x^2}$, (b) $\frac{x^4}{x^3+2}$, (c) $2 \cos x - \sin^2 x$.




Grafico di (d) $x^3 e^x$, (e) $\log |e^x - 3x|$, (f) $\operatorname{arctg} \frac{2x+1}{|x|-1}$.




Grafico di (g) $(x^2 + 2x) \log |x|$, (h) $e^{\frac{1}{\sin x}}$, (i) $|\operatorname{tg} x| - 2x$.




Grafico di (j) $\sqrt{|x^2 + 2x - 3|} - x$, (k) $(x+1) \operatorname{arctg} |x|$, (l) $(|x|-1) e^{\frac{1}{x+1}}$.