Equazioni non lineari: esempi.

- Risoluzione $f(x) = 0$ con $x \in [a, b] \subseteq \mathbb{R}$, $f \in C([a, b])$.

Equazioni non lineari: esempi.

- Risoluzione $f(x) = 0$ con $x \in [a, b] \subseteq \mathbb{R}$, $f \in C([a, b])$.
- Esempio 1: equazioni polinomiali $p_N(x) = 0$ con p_N polinomio di grado N. Possibili problemi (nessuna soluzione in $\mathbb{R}$, soluzioni multiple).

Equazioni non lineari: esempi.

- Risoluzione $f(x) = 0$ con $x \in [a, b] \subseteq \mathbb{R}$, $f \in C([a, b])$.
- Esempio 1: equazioni polinomiali $p_N(x) = 0$ con p_N polinomio di grado N. Possibili problemi (nessuna soluzione in $\mathbb{R}$, soluzioni multiple).
- Esempio 2: $f(x) = \sin(x) - x$. Soluzione unica poichè f decrescente (vedi derivata).

Equazioni non lineari: convergenza e ordine convergenza

- Metodo iterativo: genera successione $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ che si desidera convergere a x^* tale che $f(x^*) = 0$.

Equazioni non lineari: convergenza e ordine convergenza

- Metodo iterativo: genera successione $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ che si desidera convergere a x^* tale che $f(x^*) = 0$.
- **Ordine di convergenza** del metodo iterativo: sia $\{x_k\}$ una successione convergente ad x^* e sia $e_k = x_k - x^*$ l'errore al passo k. Se esiste un numero $p > 0$ e una costante $C \neq 0$ tale che

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = C$$

allora p è chiamato *ordine di convergenza* della successione e C è la *costante asintotica di errore*. Per $p = 1$ la convergenza di dice **lineare**, per $p = 2$ si dice **quadratica**.

Equazioni non lineari: esempio ordine di convergenza

Supponiamo

$$\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{1}{10},\ |e_0| = 1$$

o equivalentemente

$$|e_{k+1}| = \frac{1}{10}\,|e_k|^p,\ |e_0| = 1.$$

Il metodo ha ordine di convergenza p visto che

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{1}{10},$$

- $p = 1$: $e_0 = 1,\ e_1 = 1/10,\ e_2 = 1/100,\ e_3 = 1/1000,\ \ldots$.

Equazioni non lineari: esempio ordine di convergenza

Supponiamo

$$\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{1}{10},\ |e_0| = 1$$

o equivalentemente

$$|e_{k+1}| = \frac{1}{10}\,|e_k|^p,\ |e_0| = 1.$$

Il metodo ha ordine di convergenza p visto che

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = \frac{1}{10},$$

- $p = 1$: $e_0 = 1,\ e_1 = 1/10,\ e_2 = 1/100,\ e_3 = 1/1000,\ \ldots$.
- $p = 2$: $e_0 = 1,\ e_1 = 1/10,\ e_2 = 1/1000,\ e_3 = 1/10^7, \ldots$.

Equazioni non lineari: esempio ordine di convergenza



Figura: Grafico che illustra l'errore di un metodo con convergenza $p = 1$ (in rosso a rombi) e $p = 2$ (in nero a cerchietti), per $C = 1/10$ ed $e_0 = 1$.

Metodo bisezione: definizione

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua e supponiamo $f(a) \cdot f(b) < 0$. Il **metodo di bisezione** genera una successione di intervalli (a_k, b_k) con

- $f(a_k) \cdot f(b_k) < 0$,
- $[a_k, b_k] \subset [a_{k-1}, b_{k-1}]$,
- $|b_k - a_k| = \frac{1}{2}|b_{k-1} - a_{k-1}|$.

Fissate due tolleranze ϵ_1, ϵ_2 si arresta l'algoritmo quando

$$|b_k - a_k| \leq \epsilon_1 \text{ oppure } |f((a_k + b_k)/2)| \leq \epsilon_2.$$

Metodo bisezione: esempio

Operativamente dati $a \leq b$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$ calcola $c = (a+b)/2$. Se $f(a) \cdot f(c) > 0$ sostituisce c ad a, viceversa sostituisce c a b, fermandosi se le condizioni d'arresto sono verificate.

Studiamo $f(x) = 0$ con $f(x) = \sin(x) - x$. Osserviamo che se $x < 0$ allora $f(x) > 0$ altrimenti $f(x) \leq 0$.

1. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.40000000 \rightarrow \mathbf{c} = 0.05000000.$

Metodo bisezione: esempio

Operativamente dati $a \leq b$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$ calcola $c = (a+b)/2$. Se $f(a) \cdot f(c) > 0$ sostituisce c ad a, viceversa sostituisce c a b, fermandosi se le condizioni d'arresto sono verificate.

Studiamo $f(x) = 0$ con $f(x) = \sin(x) - x$. Osserviamo che se $x < 0$ allora $f(x) > 0$ altrimenti $f(x) \leq 0$.

1. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.40000000 \rightarrow \mathbf{c} = 0.05000000.$
2. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = -0.12500000$

Metodo bisezione: esempio

Operativamente dati $a \leq b$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$ calcola $c = (a+b)/2$. Se $f(a) \cdot f(c) > 0$ sostituisce c ad a, viceversa sostituisce c a b, fermandosi se le condizioni d'arresto sono verificate.

Studiamo $f(x) = 0$ con $f(x) = \sin(x) - x$. Osserviamo che se $x < 0$ allora $f(x) > 0$ altrimenti $f(x) \leq 0$.

1. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.40000000 \rightarrow \mathbf{c} = 0.05000000.$
2. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = -0.12500000$
3. $\mathbf{a} = -0.12500000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = -0.03750000$

Metodo bisezione: esempio

Operativamente dati $a \leq b$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$ calcola $c = (a+b)/2$. Se $f(a) \cdot f(c) > 0$ sostituisce c ad a, viceversa sostituisce c a b, fermandosi se le condizioni d'arresto sono verificate.

Studiamo $f(x) = 0$ con $f(x) = \sin(x) - x$. Osserviamo che se $x < 0$ allora $f(x) > 0$ altrimenti $f(x) \leq 0$.

1. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.40000000 \rightarrow \mathbf{c} = 0.05000000.$
2. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = -0.12500000$
3. $\mathbf{a} = -0.12500000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = -0.03750000$
4. $\mathbf{a} = -0.03750000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = 0.00625000$

Metodo bisezione: esempio

Operativamente dati $a \leq b$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$ calcola $c = (a+b)/2$. Se $f(a) \cdot f(c) > 0$ sostituisce c ad a, viceversa sostituisce c a b, fermandosi se le condizioni d'arresto sono verificate.

Studiamo $f(x) = 0$ con $f(x) = \sin(x) - x$. Osserviamo che se $x < 0$ allora $f(x) > 0$ altrimenti $f(x) \leq 0$.

1. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.40000000 \rightarrow \mathbf{c} = 0.05000000.$
2. $\mathbf{a} = -0.30000000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = -0.12500000$
3. $\mathbf{a} = -0.12500000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = -0.03750000$
4. $\mathbf{a} = -0.03750000,\ \mathbf{b} = 0.05000000 \rightarrow \mathbf{c} = 0.00625000$
5. ...

Metodo bisezione: alcuni fatti

- Non ha una velocità di convergenza nel senso della definizione sopra definita. Esempio: se applico bisezione per risolvere $\sin(x) - x = 0$, in $[a, b] = [-3, 2]$ la successione $|e_{n+1}/e_n|$ alterna valori 1.5 e $1/6$ e quindi non converge con ordine 1.

Metodo bisezione: alcuni fatti

- Non ha una velocità di convergenza nel senso della definizione sopra definita. Esempio: se applico bisezione per risolvere $\sin(x) - x = 0$, in $[a, b] = [-3, 2]$ la successione $|e_{n+1}/e_n|$ alterna valori 1.5 e $1/6$ e quindi non converge con ordine 1.
- Usa solo il segno della funzione.

Metodo bisezione: alcuni fatti

- Non ha una velocità di convergenza nel senso della definizione sopra definita. Esempio: se applico bisezione per risolvere $\sin(x) - x = 0$, in $[a, b] = [-3, 2]$ la successione $|e_{n+1}/e_n|$ alterna valori 1.5 e $1/6$ e quindi non converge con ordine 1.
- Usa solo il segno della funzione.
- Se $f(a) \cdot f(b) < 0$ e $f \in C([a, b])$ allora converge (sempre!!) a un x^* tale che $f(x^*) = 0$.

Metodo bisezione: alcuni fatti

- Non ha una velocità di convergenza nel senso della definizione sopra definita. Esempio: se applico bisezione per risolvere $\sin(x) - x = 0$, in $[a, b] = [-3, 2]$ la successione $|e_{n+1}/e_n|$ alterna valori 1.5 e $1/6$ e quindi non converge con ordine 1.
- Usa solo il segno della funzione.
- Se $f(a) \cdot f(b) < 0$ e $f \in C([a, b])$ allora converge (sempre!!) a un x^* tale che $f(x^*) = 0$.
- Il test del residuo può essere non adatto a funzioni *piatte* o con *picchi* intorno al punto cui converge.

Metodo bisezione: alcuni fatti

- Non ha una velocità di convergenza nel senso della definizione sopra definita. Esempio: se applico bisezione per risolvere $\sin(x) - x = 0$, in $[a, b] = [-3, 2]$ la successione $|e_{n+1}/e_n|$ alterna valori 1.5 e $1/6$ e quindi non converge con ordine 1.
- Usa solo il segno della funzione.
- Se $f(a) \cdot f(b) < 0$ e $f \in C([a, b])$ allora converge (sempre!!) a un x^* tale che $f(x^*) = 0$.
- Il test del residuo può essere non adatto a funzioni *piatte* o con *picchi* intorno al punto cui converge.
- Fissata una tolleranza ϵ, e due punti iniziali a, b tali che $f(a) \cdot f(b) < 0$ (con $f \in C([a, b])$) per avere un'errore assoluto $|x_n - x^*|$ sulla soluzione x^* inferiore ad ϵ necessitano al piú

$$n = \text{ttceil}\left(\frac{\log(b-a) - \log\epsilon}{\log 2}\right)$$

iterazioni del metodo.

Metodo Newton: interpretazione analitica

Il metodo di Newton richiede che

- f sia derivabile con continuità su un intervallo $[a, b]$ di $\mathbb{R}$;

Se $x_k \in [a, b]$ è l'ultima approssimazione del metodo, allora dalla formula di Taylor centrata in x_k abbiamo per $\xi_k \in \mathcal{I}(x^*, x_k)$

$$0 = f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + f''(\xi_k)(x^* - x_k)^2/2$$

Tralasciando i termini di ordine superiore

$$0 \approx f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k)$$

e quindi se $f^{(1)}(x_k) \neq 0$, dopo facili conti

$$x^* \approx x_{k+1} := x_k - f(x_k)/f^{(1)}(x_k).$$

Metodo Newton: interpretazione analitica

Il metodo di Newton richiede che

- f sia derivabile con continuità su un intervallo $[a, b]$ di $\mathbb{R}$;
- $f^{(1)}(x) \neq 0$ in $[a, b]$.

Se $x_k \in [a, b]$ è l'ultima approssimazione del metodo, allora dalla formula di Taylor centrata in x_k abbiamo per $\xi_k \in \mathcal{I}(x^*, x_k)$

$$0 = f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + f''(\xi_k)(x^* - x_k)^2/2$$

Tralasciando i termini di ordine superiore

$$0 \approx f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k)$$

e quindi se $f^{(1)}(x_k) \neq 0$, dopo facili conti

$$x^* \approx x_{k+1} := x_k - f(x_k)/f^{(1)}(x_k).$$

Metodo Newton: interpretazione geometrica

Se ben definito, il metodo di Newton genera una successione $\{x_k\}$ definita da

$$x_{k+1} := x_k - f(x_k)/f^{(1)}(x_k).$$

Sia **r** la retta tangente al grafico della funzione f nel punto $(x_k, f(x_k))$. Allora x_{k+1} è l'intersezione della retta **r** con l'asse delle ascisse, cioè la retta di equazione $y = 0$.

Metodo Newton: interpretazione geometrica



Figura: Grafico che illustra geometricamente le iterazioni del metodo Newton per il calcolo dello zero di $f(x) = x^2 - 2$.

Metodo Newton: convergenza

Nel caso del metodo di Newton la convergenza non è in generale garantita. Esistono degli esempi in cui il metodo produce una successione non convergente. Ciò nonostante esistono molti teoremi che illustrano quando si è certi che il metodo converga.

- Alcuni sono detti di **convergenza locale** e dicono che se x_0 è in un intorno $\mathcal{I}$ sufficientemente piccolo della soluzione x^* allora il metodo converge ad x_*. Usualmente non sono costruttivi e non permettono di definire chiaramente $\mathcal{I}$.

Metodo Newton: convergenza

Nel caso del metodo di Newton la convergenza non è in generale garantita. Esistono degli esempi in cui il metodo produce una successione non convergente. Ciò nonostante esistono molti teoremi che illustrano quando si è certi che il metodo converga.

- Alcuni sono detti di **convergenza locale** e dicono che se x_0 è in un intorno $\mathcal{I}$ sufficientemente piccolo della soluzione x^* allora il metodo converge ad x_*. Usualmente non sono costruttivi e non permettono di definire chiaramente $\mathcal{I}$.
- Altri sono detti di **convergenza globale** e dicono che se x_0 appartiene a un ben definito intorno $\mathcal{I}$ di x^* allora il metodo converge.

Metodo Newton: un teorema di convergenza locale

Uno zero x^* si dice **semplice** se $f(x^*) = 0$ e $f^{(1)}(x^*) \neq 0$.

Teorema. Sia $x^* \in (a, b)$ uno zero semplice di $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Si supponga inoltre $f \in C^2([a, b])$. Allora per $x_0 \in [a, b]$ sufficientemente vicino a x^* le iterazioni del metodo di Newton

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f^{(1)}(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

sono ben definite e convergono quadraticamente a x^*.

Metodo Newton: un teorema di convergenza locale (dim.)

Traccia della dimostrazione.

Sia I_1 intorno di x^* in cui $f^{(1)}$ ha segno costante (permanenza del segno).

1. Dalla formula di Taylor centrata in x^* e valutata in x_k abbiamo per $\xi_k \in \mathcal{I}(x^*, \xi_k)$, ricordando la succ. del metodo di Newton

$$\begin{aligned} 0 &= f(x^*) = f(x_k) + f^{(1)}(x_k)(x^* - x_k) + f^{(2)}(\xi_k)(x^* - x_k)^2/2 \\ &= f^{(1)}(x_k)(x^* - x_{k+1}) + f^{(2)}(\xi_k)(x^* - x_k)^2/2 \qquad (1) \end{aligned}$$

Posto $e_k = |x^* - x_k|$ ricaviamo per
$M = \max_{x,y \in I_1} |f^{(2)}(\xi_k)|/2 \cdot |f^{(1)}(x_k)|$

$$e_{k+1} = \frac{|f^{(2)}(\xi_k)|}{2 \cdot |f^{(1)}(x_k)|} e_k^2 \leq M {e_k}^2$$

Metodo Newton: un teorema di convergenza locale (dim.)

Sia $I_2 = [x^* - \delta, x^* + \delta] \subseteq I_1$ con $M\delta < 1$. Se $x_0 \in I_2$ allora $e_0 \leq \delta$ e

$$e_1 \leq M{e_0}^2 \leq M\delta^2 \leq \delta$$

da cui per induzione ogni $x_k \in I_2$. Inoltre

$$Me_k \leq M^2 {e_{k-1}}^2 = (Me_{k-1})^2 \leq \ldots \leq (Me_0)^{2^k}$$

e visto che $Me_0 \leq M\delta < 1$ abbiamo $e_k \to 0$, cioè il metodo di Newton converge quadraticamente. Infatti si vede facilmente che essendo $\xi_k \in \mathcal{I}(x^*, x_k)$ e $x_k \to x^*$ necessariamente $f \in C^{(2)}([a,b])$

$$\begin{aligned} \lim_k \frac{e_{k+1}}{e_k^2} &= \lim_k |f^{(2)}(\xi_k)|/(2 \cdot |f^{(1)}(x_k)|) \\ &= \lim_k |f^{(2)}(x^*)|/(2 \cdot |f^{(1)}(x^*)|) \neq 0 \end{aligned}$$

Metodo Newton: un teorema di convergenza

Teorema. Sia $f \in C^2([a,b])$, con $[a,b]$ intervallo chiuso e limitato. Se

1. $f(a) \cdot f(b) < 0$;
2. $f^{(1)}(x) > 0$, per ogni $x \in [a,b]$;
3. $f^{(2)}(x) > 0$

allora le iterate x_k fornite dal metodo di Newton sono strettamente decrescenti e convergono all'unica soluzione x^* in $[a,b]$, per $x_0 = b$.

Metodo Newton: un teorema di convergenza globale

Teorema.

Sia $f \in C^2([a,b])$, con $[a,b]$ intervallo chiuso e limitato. Se

1. $f(a) \cdot f(b) < 0$;
2. $f^{(1)}(x) \neq 0$, per ogni $x \in [a,b]$;
3. $f^{(2)}(x) \geq 0$ o $f^{(2)}(x) \leq 0$, per ogni $x \in [a,b]$;
4. $|f(a)/f^{(1)}(a)| < b-a$ e $|f(b)/f^{(1)}(b)| < b-a$,

allora il metodo di Newton converge all'unica soluzione x^* in $[a,b]$, per ogni $x_0 \in [a,b]$.

Metodo Newton: un teorema di convergenza globale (dim.)

Traccia della dimostrazione.

Supponiamo che

1. $f^{(2)}(x) \geq 0$ se $x \in (a, b)$.
2. $f^{(1)}(x) > 0$ se $x \in (a, b)$.

Allora:

1. La soluzione x^* è unica poichè f cambia segno ed è crescente.

Metodo Newton: un teorema di convergenza globale (dim.)

Traccia della dimostrazione.

Supponiamo che

1. $f^{(2)}(x) \geq 0$ se $x \in (a, b)$.
2. $f^{(1)}(x) > 0$ se $x \in (a, b)$.

Allora:

1. La soluzione x^* è unica poichè f cambia segno ed è crescente.
2. L'ultimo punto garantisce che $x_1 \in (a, b)$.

Metodo Newton: un teorema di convergenza globale (dim.)

Traccia della dimostrazione.

Supponiamo che

1. $f^{(2)}(x) \geq 0$ se $x \in (a, b)$.
2. $f^{(1)}(x) > 0$ se $x \in (a, b)$.

Allora:

1. La soluzione x^* è unica poichè f cambia segno ed è crescente.
2. L'ultimo punto garantisce che $x_1 \in (a, b)$.
3. Da hp. 2 e $f(x_k) + f^{(1)}(x_k)(x^* - x_k) = f^{(1)}(x_k)(x^* - x_{k+1})$:

$$\begin{aligned} 0 &= f(x^*) = f(x_k) + f^{(1)}(x_k)(x^* - x_k) + f^{(2)}(\xi_k)(x^* - x_k)^2/2 \\ &= f^{(1)}(x_k)(x^* - x_{k+1}) + f^{(2)}(\xi_k)(x^* - x_k)^2/2 \end{aligned}$$

e quindi $0 \geq f^{(1)}(x_k)(x^* - x_{k+1})$ cioè $x^* \leq x_{k+1}$.

Metodo Newton: un teorema di convergenza globale (dim.)

Traccia della dimostrazione.

Supponiamo che

1. $f^{(2)}(x) \geq 0$ se $x \in (a, b)$.
2. $f^{(1)}(x) > 0$ se $x \in (a, b)$.

Allora:

1. La soluzione x^* è unica poichè f cambia segno ed è crescente.
2. L'ultimo punto garantisce che $x_1 \in (a, b)$.
3. Da hp. 2 e $f(x_k) + f^{(1)}(x_k)(x^* - x_k) = f^{(1)}(x_k)(x^* - x_{k+1})$:

$$\begin{aligned} 0 &= f(x^*) = f(x_k) + f^{(1)}(x_k)(x^* - x_k) + f^{(2)}(\xi_k)(x^* - x_k)^2/2 \\ &= f^{(1)}(x_k)(x^* - x_{k+1}) + f^{(2)}(\xi_k)(x^* - x_k)^2/2 \end{aligned}$$

   e quindi $0 \geq f^{(1)}(x_k)(x^* - x_{k+1})$ cioè $x^* \leq x_{k+1}$.
4. La formula di Newton $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f^{(1)}(x_k)$ mostra che se $x_k > x^*$ allora $x_{k+1} < x_k$ (cioè $\{x_k\}_{k=1,\ldots}$ decrescente).

Metodo Newton: un teorema di convergenza globale (dim.)

Quindi, comunque sia scelto $x_0 \in [a, b]$, abbiamo che per $k \geq 1$ si ha $x_k \in [x^*, b]$ e $\{x_k\}_{k=1,\ldots}$ decrescente e quindi converge a un certo $L \in [x^*, b]$. Dalla formula del metodo di Newton, per continuità

$$\begin{aligned} L &= \lim_k x_{k+1} = \lim_k (x_k - f(x_k)/f^{(1)}(x_k)) \\ &= \lim_k x_k - \lim_k f(x_k)/f^{(1)}(x_k) \\ &= L - f(L)/f^{(1)}(L) \end{aligned}$$

da cui essendo $f^{(1)}(x) > 0$ per $x \in [a, b]$ abbiamo $F(L) = 0$. Ma x^* è l'unico zero di f per cui $x_k \to x^*$.

Metodo Newton: alcuni fatti

1. Il metodo di Newton non è sempre convergente.

Metodo Newton: alcuni fatti

1. Il metodo di Newton non è sempre convergente.
2. Se converge, non è detto che l'ordine di convergenza sia $p = 2$ (conv. quadratica).

Metodo Newton: alcuni fatti

1. Il metodo di Newton non è sempre convergente.
2. Se converge, non è detto che l'ordine di convergenza sia $p = 2$ (conv. quadratica).
3. Se uno zero x^* di f non è semplice allora la convergenza non è quadratica.

Metodi di punto fisso

Consideriamo i problemi di *punto fisso*

$$x = \phi(x)$$

in cui supponiamo che $\phi : \Omega \to \Omega$ sia una funzione continua in Ω sia un intervallo compatto di $\mathbb{R}$. Notiamo subito che ogni problema di tipo $f(x) = 0$ si può ovviamente riscrivere in questa forma, posto $\phi(x) = f(x) + x$. Nel metodo di punto fisso, si definisce la successione

$$x_{k+1} = \phi(x_k)$$

Teorema di punto fisso

Teorema. Si supponga che $\phi : \Omega \to \Omega$ e ϕ' siano funzione continue in $\Omega = [a, b]$. Inoltre sia $\lambda = \max_{x \in [a,b]} |\phi'(x)| < 1$. Allora:

1. Esiste uno ed un solo α tale che $\phi(\alpha) = \alpha$ in Ω;

Teorema di punto fisso

Teorema. Si supponga che $\phi : \Omega \to \Omega$ e ϕ' siano funzione continue in $\Omega = [a, b]$. Inoltre sia $\lambda = \max_{x \in [a,b]} |\phi'(x)| < 1$. Allora:

1. Esiste uno ed un solo α tale che $\phi(\alpha) = \alpha$ in Ω;
2. Per ogni punto iniziale $x_0 \in [a, b]$ le iterate $x_{n+1} = \phi(x_n)$ convergono ad α;

Teorema di punto fisso

Teorema. Si supponga che $\phi : \Omega \to \Omega$ e ϕ' siano funzione continue in $\Omega = [a, b]$. Inoltre sia $\lambda = \max_{x\in[a,b]} |\phi'(x)| < 1$. Allora:

1. Esiste uno ed un solo α tale che $\phi(\alpha) = \alpha$ in Ω;
2. Per ogni punto iniziale $x_0 \in [a, b]$ le iterate $x_{n+1} = \phi(x_n)$ convergono ad α;
3. Si ha

$$|\alpha - x_n| \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda}|x_0 - x_1|, \ \ n \geq 0;$$

Teorema di punto fisso

Teorema. Si supponga che $\phi : \Omega \to \Omega$ e ϕ' siano funzione continue in $\Omega = [a, b]$. Inoltre sia $\lambda = \max_{x\in[a,b]} |\phi'(x)| < 1$. Allora:

1. Esiste uno ed un solo α tale che $\phi(\alpha) = \alpha$ in Ω;
2. Per ogni punto iniziale $x_0 \in [a, b]$ le iterate $x_{n+1} = \phi(x_n)$ convergono ad α;
3. Si ha
$$|\alpha - x_n| \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda}|x_0 - x_1|, \ \ n \geq 0;$$
4. Infine
$$\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha - x_{n+1}}{\alpha - x_n} = \phi'(\alpha)$$

Metodi di punto fisso

Consideriamo un generico problema di punto fisso $x = \phi(x)$, e supponiamo

1. ϕ di classe $C^{(2)}$,
2. $\phi(\alpha) = \alpha$,
3. $\phi'(\alpha) = 0$, $\phi''(\alpha) \neq 0$,
4. $x_n \to \alpha$.

Allora per $\xi_n \in \mathcal{I}(\alpha, x_n)$,

$$\begin{aligned} x_{n+1} = \phi(x_n) &= \phi(\alpha) + \phi'(\alpha)(x_n - \alpha) + \phi''(\xi_n)(x_n - \alpha)^2/2 \\ &= \alpha + \phi''(\xi_n)(x_n - \alpha)^2/2 \end{aligned}$$

e quindi facilmente portando α a primo membro, per $e_n = |x_n - \alpha|$

$$e_{n+1} = |\phi''(\xi_n)| e_n^2/2 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} e_{n+1}/e_n^2 = \lim_k |\phi''(\xi_n)|/2 = |\phi''(\alpha)|/2$$

poichè $\xi_n \in \mathcal{I}(\alpha, x_n)$ e $x_n \to \alpha$, e $\phi'' \in C^2([a, b])$ per hp.1. Quindi la convergenza è quadratica.

Metodi di punto fisso e Newton

Il metodo di Newton è un particolare metodo di punto fisso. Infatti posto

$$\phi(x) = x - f(x)/f'(x)$$

abbiamo che $x_{k+1} = \phi(x_k) = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$. Osserviamo che se $f(\alpha) = 0$ e $f'(\alpha) = 0$ allora

$$\phi(\alpha) = \alpha - f(\alpha)/f'(\alpha) = \alpha$$

cioè lo zero della f è pure sol. del problema di pto fisso e viceversa. Quindi se $f \in C^2(\Omega)$, $f'(x) \neq 0$, $\phi : \Omega \to \Omega$ otteniamo

$$\phi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

e se $f'(\alpha) \neq 0$ (radice semplice) abbiamo $\phi'(\alpha) = 0$ da cui deduciamo nuovamente che la convergenza è quadratica.

Cenni alla risoluzione numerica di sistemi nonlineari

Problema. Data una funzione $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ si tratta di trovare gli $x^* \in \Omega$ tali che $F(x^*) = 0$.
Esempio:

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}\cos(y) = 0 \\ y - \frac{1}{2}\sin(x) = 0 \end{cases} \tag{2}$$

Soluzione (unica!):

$$x = 0.48640515466592, \;\; y = 0.23372550195872.$$

Generalizzazione punto fisso e Teorema di Banach

Teorema. Sia (X, d) uno spazio metrico completo ed M un sottoinsieme non vuoto e chiuso di X. Se $\phi : M \to M$ è L contrattiva cioè $d(\phi(\mathbf{x}), \phi(\mathbf{y})) \leq L d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ con $L < 1$ allora

1. l'equazione $\mathbf{x} = \phi(\mathbf{x})$ ha una ed una sola soluzione $\mathbf{x}^*$;
2. la successione $\mathbf{x_{k+1}} = \phi(\mathbf{x_k})$ (detta di Banach o di punto fisso) converge alla soluzione $\mathbf{x}^*$ per ogni scelta del punto iniziale $\mathbf{x_0}$;
3. per $k = 0, 1, 2, \ldots$ si ha

$$d(\mathbf{x_k}, \mathbf{x}^*) \leq L^k (1 - L)^{-1} d(\mathbf{x_0}, \mathbf{x_1}), \text{ a priori}$$

$$d(\mathbf{x_{k+1}}, \mathbf{x}^*) \leq L (1 - L)^{-1} d(\mathbf{x_{k+1}}, \mathbf{x_k}), \text{ a posteriori}$$

4. per $k = 0, 1, 2, \ldots$ si ha

$$d(\mathbf{x_{k+1}}, \mathbf{x}^*) \leq L d(\mathbf{x_k}, \mathbf{x}^*)$$

Punto fisso per sistemi e Teorema di Banach

Teorema. Sia $\mathbb{R}^d$ (dotato della norma euclidea $\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{d} x_k^d}$) ed M un sottoinsieme non vuoto e chiuso di $\mathbb{R}^d$. Se $\phi : M \to M$ è L contrattiva cioè $\|\phi(\mathbf{x}) - \phi(\mathbf{y}\| \leq L\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ con $L < 1$ allora

1. l'equazione $\mathbf{x} = \phi(\mathbf{x})$ ha una ed una sola soluzione $\mathbf{x}^*$;
2. la successione $\mathbf{x_{k+1}} = \phi(\mathbf{x_k})$ (detta di Banach o di punto fisso) converge alla soluzione $\mathbf{x}^*$ per ogni scelta del punto iniziale $\mathbf{x_0}$;
3. per $k = 0, 1, 2, \ldots$ si ha

$$\|\mathbf{x_k} - \mathbf{x}^*\| \leq L^k(1 - L)^{-1}\|\mathbf{x_0} - \mathbf{x_1}\|, \text{ a priori}$$

$$\|\mathbf{x_{k+1}} - \mathbf{x}^*\| \leq L(1 - L)^{-1}\|\mathbf{x_{k+1}} - \mathbf{x_k}\|, \text{ a posteriori}$$

4. per $k = 0, 1, 2, \ldots$ si ha

$$\|\mathbf{x_{k+1}} - \mathbf{x}^*\| \leq L\|\mathbf{x_k} - \mathbf{x}^*\|$$

Esempio punto fisso per sistemi

Esempio:

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}\cos(y) = 0 \\ y - \frac{1}{2}\sin(x) = 0 \end{cases} \tag{3}$$

si scrive come $\mathbf{v} = \phi(\mathbf{v})$ con $\mathbf{v} = (x, y)$ e

$$\phi(\mathbf{v}) = \left(\frac{1}{2}\cos(y), \frac{1}{2}\sin(x)\right).$$

Si dimostra che ϕ è L contrazione con $L = 1/2$.

Esempio punto fisso per sistemi

Successione punto fisso:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\cos(y_k), \quad y_{k+1} = \frac{1}{2}\sin(x_k)$$

0.00000000000000	0.00000000000000
0.50000000000000	0.00000000000000
0.50000000000000	0.23971276930210
0.48570310513698	0.23971276930210
0.48570310513698	0.23341513183103
0.48644107261515	0.23341513183103
...	...
0.48640515466592	0.23372550195872
0.48640515466592	0.23372550195872

Metodo Newton per sistemi

Supponiamo di dover risolvere $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ con $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$.

La successione di Newton viene descritta come

$$\begin{cases} f'(\mathbf{v}_k)) \cdot h_{k+1} = -f(\mathbf{v}_k), \\ \mathbf{v_{k+1}} := \mathbf{v_k} + h_{k+1} \end{cases} \tag{4}$$

dove f' è la matrice Jacobiana di f cioè se $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_d)$ allora

$$(f'(\mathbf{v}_k)))_{i,j} = \frac{\partial f_i(\mathbf{v})}{\partial v_j}.$$

Esempio Newton per sistemi

Consideriamo il precedente esempio, come $f(x) = 0$. Allora posto $\mathbf{v} = (x, y)$ si ha $f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y))$ con

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= x - \frac{1}{2}\cos(y) \\ f_2(x, y) &= y - \frac{1}{2}\sin(x) = 0 \end{aligned} \quad . \tag{5}$$

Inoltre

$$f'(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}\sin(y) \\ -\frac{1}{2}\cos(y) & 1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

Esempio Newton per sistemi

Successione Newton:

$$\begin{cases} f'(\mathbf{v}_k)) \cdot h_{k+1} = -f(\mathbf{v}_k), \\ \mathbf{v_{k+1}} := \mathbf{v_k} + h_{k+1} \end{cases} \tag{7}$$

0.000000000000000	0.000000000000000
0.500000000000000	0.250000000000000
0.486463513355199	0.233773076987732
0.486405155145713	0.233725502568820
0.486405154665921	0.233725501958721

Riferimenti bibliografici

- K. Atkinson, W. Han, *Elementary Numerical Analysis*, Wiley, (2004).
- A. Quarteroni, F. Saleri, *Introduzione al Calcolo Scientifico*, Springer, (2002).