

$$2) f(x) = \log\left(\frac{x+4}{(x+1)^2}\right)$$


(13/12/12)

1) dom f

$$\rightarrow \frac{x+4}{(x+1)^2} > 0$$

$$\rightarrow x+1 \neq 0$$

$$\begin{array}{lll} N \geq 0 & x+4 > 0 & x > -4 \\ D > 0 & (x+1)^2 > 0 & x \neq -1 \end{array}$$



$$\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R} : \frac{x+4}{(x+1)^2} > 0 \text{ e } x \neq -1\} =$$

$$= \{x \in \mathbb{R} : x > -4, x \neq -1\} =$$

$$= (-4, -1) \cup (-1, +\infty)$$

$$2) A = \{ \text{pti di accumulazione del dom } f \}$$

$$\forall x_0 \in A, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$A = [-4, -1] \cup [-1, +\infty) \cup \{+\infty\}$$

$$= [-4, +\infty) \cup \{+\infty\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = ?$$

$$\forall x_0 \in A$$

$$x_0 \in A \cap (\text{dom } f) = (-4, -1) \cup (-1, +\infty)$$

$$x_0 \in A \setminus (\text{dom } f) = \{-4\} \cup \{-1\} \cup \{+\infty\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \forall x_0 \in \text{dom } f (\cap A)$$

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} \log \left(\frac{x+4}{(x+1)^2} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \log \left(\frac{x+4}{(x+1)^2} \right) = +\infty$$

$\downarrow$
 $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{x+4}{(x+1)^2} \right) = -\infty$$

$\downarrow$
 0

3) determinare eventuali asintoti

verticali: $x = -4$, $x = -1$ sono asintoti verticali

orizzontali: non ce ne sono

obliqui: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \left(\frac{x+4}{(x+1)^2} \right)}{x} =$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \log \left(\frac{x+4}{(x+1)^2} \right) =$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 0 0
 $\rightarrow -\infty$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(x+1)^2}{x(x+4)} \right] \left[\frac{x+4}{(x+1)^2} \log \left(\frac{x+4}{(x+1)^2} \right) \right] = 0$$

$$\frac{x+4}{x+1} = t \quad ; \quad t \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} t \log t = 0$$

non ci sono asintoti obliqui!

4) Determinare l'insieme B dei punti nei quali f è derivabile e calcolare $f'(x)$, $\forall x \in B$.

Per il teorema sull'esistenza delle derivate e il teorema sulla composizione di funzioni derivabili

f è derivabile in x , $\forall x \in \text{dom } f$
 $\text{dom } f = B = (-4, -1) \cup (-1, +\infty)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x+1)^2}{x+4} \cdot \frac{(x+1)^2 - 2(x+4)(x+1)}{(x+1)^4} = \\ &= \frac{(x+1) - 2x - 8}{(x+4)(x+1)} \\ &= \frac{-x - 7}{(x+4)(x+1)} \end{aligned}$$

Calcolare $\lim_{x \rightarrow -1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-x - 7}{(x+4)(x+1)} = -\infty$

$\begin{matrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{matrix}$

5) Determinare gli intervalli di monotonia.

$$f'(x) = - \frac{(x+7)}{(x+4)(x+1)} > 0$$





$$\frac{(x+7)}{(x+4)(x+1)} < 0$$

$$(x+7) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -7$$

$$(x+4) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -4$$

$$(x+1) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -1$$



f è strettamente crescente $(-4, -1)$

f è strettamente decrescente $(-1, +\infty)$

6) Determinare eventuali punti di max/min rel e/o assoluto.


non ci sono max/min rel né assoluti

$$3) \quad f(x) = \frac{(x+2)}{x} e^{-\frac{1}{(x+2)}} \quad (19/12/11)$$

$$1) \text{ dom } f = \{x \in \mathbb{R}, x \neq 0, x+2 \neq 0\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R}: x \neq 0, x \neq -2\}$$

$$= (-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, +\infty)$$



$$2) \quad A = \{pti \text{ di acc. di dom } f\} =$$

$$= \{-\infty\} \cup (-\infty, -2] \cup [-2, 0] \cup [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$$

$$= \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad \forall x_0 \in A$$

$$*) \quad x_0 \in A \cap (\text{dom } f) = \text{dom } f = (-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, +\infty)$$

$$f \text{ e' continua in } x_0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$*) \quad x_0 \in A \setminus (\text{dom } f) = \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{-2\} \cup \{0\}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ -\infty}} \underbrace{\frac{(x+2)}{x}}_1 \cdot \underbrace{e^{-\frac{1}{(x+2)}}}_1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \underbrace{\frac{(x+2)}{x}}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{e^{-\frac{1}{(x+2)}}}_{\rightarrow \infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \underbrace{\frac{(x+2)}{x}}_0 \cdot \underbrace{e^{-\frac{1}{(x+2)}}}_{+\infty} =$$

$$\begin{matrix} t \rightarrow +\infty \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty \end{matrix}$$

$$\frac{x+2}{x} \left(-\frac{1}{x+2} \right) \frac{e^{-\frac{1}{x+2}}}{-\frac{1}{x+2}} = - \left[\frac{1}{x} \right] \frac{e^{-\frac{1}{x+2}}}{-\frac{1}{x+2}} \rightarrow +\infty$$

$$= +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{x+2}{x} e^{-\frac{1}{x+2}} = +\infty$$

3) Asintoti:

orizzontali: $y = 1$ sia $x \rightarrow +\infty$ che $x \rightarrow -\infty$

verticali: $x = 0$, $x = -2$

obliqui non ce ne sono (ci sono gli asintoti orizzontali)

4) Determinare $B = \{ \text{pt in dove } f \text{ è derivabile} \}$

e risolvere $f'(x)$, $\forall x \in B$.

$$f(x) = \frac{x+2}{x} e^{-\frac{1}{x+2}}$$

per il teo sull'algebra delle derivate
e sulla composizione di funzioni
derivabili $B = \text{dom } f$ e

$$f'(x) = \left[\frac{x - (x+2)}{x^2} \right] e^{-\frac{1}{x+2}} + \left[\frac{x+2}{x} \right] e^{-\frac{1}{x+2}} \left(\frac{1}{(x+2)^2} \right)$$

$$= e^{-\frac{1}{x+2}} \left[-\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x(x+2)} \right]$$

$$= e^{-\frac{1}{x+2}} \frac{-2x - 4 + x}{x^2(x+2)} =$$

$$= e^{-\frac{1}{x+2}} \frac{4+x}{x^2(x+2)}$$

5) Intervalli di monotonia

$$f'(x) = - e^{-\frac{1}{x+2}} \frac{4+x}{x^2(x+2)} > 0$$

$\Leftrightarrow$


$$\boxed{e^{-\frac{1}{x+2}} > 0} \cdot \frac{4+x}{x^2(x+2)} < 0$$

$\Downarrow$


$$\frac{4+x}{(x+2)} < 0$$

$$(4+x) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -4$$

$$(x+2) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -2$$



$$f'(x) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad -4 < x < -2$$



f è decrescente in $(-\infty, -4)$
in $(-2, 0)$
in $(0, +\infty)$

f è crescente in $(-4, -2)$

6) max/min.

$$f'(x) = 0 \quad \Delta = \Delta \quad x = -4$$

$x = -4$ è di min relativo

non assoluto $\left(\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \right)$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} - \underbrace{e^{-\frac{1}{x+2}}}_{0} \cdot \underbrace{\frac{4+x}{x^2(x+2)}}_{+\infty} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} - \frac{\frac{4+x}{x^2(x+2)}}{e^{\frac{1}{x+2}}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2^+} - \underbrace{\frac{4+x}{x^2}}_{\frac{1}{2}} \cdot \underbrace{\frac{\frac{1}{(x+2)}}{e^{\frac{1}{x+2}}}}_{t = \frac{1}{x+2}} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0$$

$$\begin{array}{l} x \rightarrow -2^- \\ t \rightarrow +\infty \end{array}$$