

# I APPELLO DI ANALISI MATEMATICA 1

Ing. Aerospaziale, dell'Energia e Meccanica (V Canale)

A.A. 2011/2012, 31 Gennaio 2012

Tema 1

COGNOME E NOME: .....

MATRICOLA: .....

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

--

**N.B.** *Gli esercizi n. 4,5,6 sono relativi alla* **SECONDA PROVA PARZIALE.**

**ESERCIZIO 1.** [4.5 punti] Calcolare il limite

$$\ell \doteq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-x} + x \ln x - 1}{(\cos x - 1)(\ln x)^2}.$$

Determinare lo sviluppo asintotico di  $x^{-x} + x \ln x - 1$  :

(Se esiste)

$$\ell =$$

**ESERCIZIO 2.** [4.5 punti] Studiare il carattere (la convergenza) della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 \left[ \left( \frac{1 + 8n^\alpha}{n^\alpha} \right)^{1/3} - 2 \right]$$

al variare del parametro  $\alpha \in \mathbb{R}$ , specificando i criteri usati e le argomentazioni principali.

**ESERCIZIO 3.** [9 punti] Si consideri la funzione definita da

$$f(x) = \arctan(|2x^2 - 7x - 4|).$$

(i) Determinare il dominio della funzione.

$$\text{Dom}(f) =$$

(ii) Determinare eventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.

(iii) Calcolare la derivata prima della funzione

$$f'(x) =$$

e stabilire in quali intervalli la funzione è monotona crescente, ed in quali intervalli è monotona decrescente.

(iv) Determinare eventuali punti di massimo o di minimo relativo ed assoluto di  $f$ .

(v) Determinare l'immagine di  $f$  :

$$\text{Im}(f) =$$

e tracciare il grafico probabile della funzione.

**ESERCIZIO 4.** [7 punti] Si consideri la funzione definita da  $f(x) = \int_0^{x|x^2-1|} \frac{e^t}{1+|t|} dt$ .

(i) Determinare l'insieme dei punti di derivabilità di  $f$

(ii) Calcolare la derivata prima della funzione

$$f'(x) =$$

(iii) Determinare eventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.

**ESERCIZIO 5.** [6 punti] Si consideri l'equazione differenziale lineare

$$\dot{y} - \frac{xy}{\sqrt{1-x^2}} = xe^{-\sqrt{1-x^2}}. \quad (1)$$

(i) Determinare l'integrale generale (l'insieme delle soluzioni)  $x \mapsto \varphi_c(x)$ ,  $c \in \mathbb{R}$ , dell'equazione differenziale lineare omogenea associata a (1)

$$\varphi_c(x) =$$

(ii) Determinare l'integrale generale (l'insieme delle soluzioni)  $x \mapsto \psi_c(x)$ ,  $c \in \mathbb{R}$ , dell'equazione completa (1)

$$\psi_c(x) =$$

(iii) Determinare la soluzione  $x \mapsto \psi(x)$  del problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{y} - \frac{xy}{\sqrt{1-x^2}} = xe^{-\sqrt{1-x^2}}, \\ y(0) = -1/2, \end{cases}$$

$$\psi(x) =$$

**ESERCIZIO 6.** [6 punti] Studiare la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\sin x} |\ln x|^\alpha}$$

al variare del parametro  $\alpha \in \mathbb{R}$ , specificando i criteri usati e le argomentazioni principali.