

ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

PROF. F. BOTTACIN, N. RODINÒ

3° Appello — 12 settembre 2012

Esercizio 1. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale di equazioni $3x_2 + x_3 - x_4 = 0$ e $x_2 - 2x_3 + x_4 = 0$, e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il più piccolo sottospazio che contiene il vettore $(1, 1, 0, 0)$ e i vettori $(0, t, t + 1, t + 2)$, per ogni $t \in \mathbb{Z}$.

- Si determini la dimensione e una base di U .
- Si determinino le equazioni cartesiane e una base di W .
- Si determinino delle basi di $U \cap W$ e $U + W$.
- Si dica se esiste un sottospazio non nullo $L \subset \mathbb{R}^4$ che sia in somma diretta sia con U che con W . Se un tale L esiste, se ne determini una base. Si determini inoltre (se esiste) un sottospazio $L' \subset \mathbb{R}^4$ tale che $(U \oplus L) \oplus L' = \mathbb{R}^4$.

Esercizio 2. Sia f un endomorfismo di \mathbb{R}^3 con le seguenti proprietà: (i) il polinomio caratteristico di f è $x^2(x - 2)$, (ii) il vettore $v_1 = (1, -1, 2)$ è una base del nucleo di f , (iii) $v_2 = (0, 2, -1)$ è il generatore dell'autospazio relativo all'unico autovalore non nullo di f , (iv) $f(v_3) = v_1$, ove $v_3 = (1, 0, 2)$.

- Si scriva la matrice A di f rispetto alla base $\{v_1, v_2, v_3\}$.
- Si scriva la matrice B di f rispetto alla base canonica.
- Si stabilisca se la matrice B è diagonalizzabile.
- Al variare di $t \in \mathbb{R}$ si determini $f^{-1}(t, 3, 0)$.

Esercizio 3. Sia V il sottospazio vettoriale di \mathbb{R}^5 di equazione $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0$, dotato del prodotto scalare usuale. Sia $U \subset V$ il sottospazio generato dai vettori $u_1 = (2, -1, 0, -1, 0)$, $u_2 = (1, 3, 0, 0, -4)$ e sia $U^\perp \subset V$ l'ortogonale di U in V .

- Si determini una base ortogonale di U .
- Si determini una base di U^\perp .
- Dato il vettore $v = (4, 3, -4, 0, -3) \in V$ si determinino le proiezioni ortogonali di v su U e U^\perp .
- Si stabilisca se esiste un sottospazio vettoriale non nullo $L \subset \mathbb{R}^5$ che sia ortogonale sia a U che a U^\perp . Se un tale sottospazio esiste, se ne determini una base e si dica se esso è unico.

Esercizio 4. Nello spazio affine euclideo tridimensionale, sono date le rette

$$r : \begin{cases} x - z - 3 = 0 \\ x - y + z - 1 = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x + 2z - 2 = 0 \\ x + y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

- Si dica se r e s sono incidenti, parallele o sghembe.
- Si determini la retta ℓ parallela al vettore $u = (8, -6, -6)$ e incidente le rette r e s .
- Si determini l'equazione del piano π contenente la retta r e ortogonale al vettore $(3, -1, -1)$.
- Si determinino le proiezioni ortogonali del punto $P = (1, 1, 2)$ sul piano π e sulla retta s .

ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

PROF. F. BOTTACIN, N. RODINÒ

3° Appello — 12 settembre 2012

Esercizio 1. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale di equazioni $3x_1 - 2x_3 - x_4 = 0$ e $x_1 - 6x_3 - x_4 = 0$, e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il più piccolo sottospazio che contiene il vettore $(0, 1, 1, -1)$ e i vettori $(t, 0, t - 1, t + 2)$, per ogni $t \in \mathbb{Z}$.

- Si determini la dimensione e una base di U .
- Si determinino le equazioni cartesiane e una base di W .
- Si determinino delle basi di $U \cap W$ e $U + W$.
- Si dica se esiste un sottospazio non nullo $L \subset \mathbb{R}^4$ che sia in somma diretta sia con U che con W . Se un tale L esiste, se ne determini una base. Si determini inoltre (se esiste) un sottospazio $L' \subset \mathbb{R}^4$ tale che $(U \oplus L) \oplus L' = \mathbb{R}^4$.

Esercizio 2. Sia f un endomorfismo di \mathbb{R}^3 con le seguenti proprietà: (i) il polinomio caratteristico di f è $x^2(x + 3)$, (ii) il vettore $v_1 = (1, 0, 2)$ è una base del nucleo di f , (iii) $v_2 = (1, -1, 2)$ è il generatore dell'autospazio relativo all'unico autovalore non nullo di f , (iv) $f(v_3) = v_1$, ove $v_3 = (0, 2, -1)$.

- Si scriva la matrice A di f rispetto alla base $\{v_1, v_2, v_3\}$.
- Si scriva la matrice B di f rispetto alla base canonica.
- Si stabilisca se la matrice B è diagonalizzabile.
- Al variare di $t \in \mathbb{R}$ si determini $f^{-1}(3, -2, t)$.

Esercizio 3. Sia V il sottospazio vettoriale di \mathbb{R}^5 di equazione $x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 0$, dotato del prodotto scalare usuale. Sia $U \subset V$ il sottospazio generato dai vettori $u_1 = (1, 2, 0, 3, 0)$, $u_2 = (1, 1, 0, 0, -2)$ e sia $U^\perp \subset V$ l'ortogonale di U in V .

- Si determini una base ortogonale di U .
- Si determini una base di U^\perp .
- Dato il vettore $v = (1, 2, -4, 4, -3) \in V$ si determinino le proiezioni ortogonali di v su U e U^\perp .
- Si stabilisca se esiste un sottospazio vettoriale non nullo $L \subset \mathbb{R}^5$ che sia ortogonale sia a U che a U^\perp . Se un tale sottospazio esiste, se ne determini una base e si dica se esso è unico.

Esercizio 4. Nello spazio affine euclideo tridimensionale, sono date le rette

$$r : \begin{cases} x - 2y - 4 = 0 \\ x + y - z + 3 = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} 2x + y + 4 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

- Si dica se r e s sono incidenti, parallele o sghembe.
- Si determini la retta ℓ parallela al vettore $u = (4, -4, -2)$ e incidente le rette r e s .
- Si determini l'equazione del piano π contenente la retta r e ortogonale al vettore $(2, -1, -1)$.
- Si determinino le proiezioni ortogonali del punto $P = (2, 1, 1)$ sul piano π e sulla retta s .

ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

PROF. F. BOTTACIN, N. RODINÒ

3° Appello — 12 settembre 2012

Esercizio 1. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale di equazioni $x_1 - 2x_2 - x_4 = 0$ e $2x_1 - x_2 + 7x_4 = 0$, e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il più piccolo sottospazio che contiene il vettore $(0, 0, 1, 1)$ e i vettori $(t + 2, t + 1, 0, t - 1)$, per ogni $t \in \mathbb{Z}$.

- Si determini la dimensione e una base di U .
- Si determinino le equazioni cartesiane e una base di W .
- Si determinino delle basi di $U \cap W$ e $U + W$.
- Si dica se esiste un sottospazio non nullo $L \subset \mathbb{R}^4$ che sia in somma diretta sia con U che con W . Se un tale L esiste, se ne determini una base. Si determini inoltre (se esiste) un sottospazio $L' \subset \mathbb{R}^4$ tale che $(U \oplus L) \oplus L' = \mathbb{R}^4$.

Esercizio 2. Sia f un endomorfismo di \mathbb{R}^3 con le seguenti proprietà: (i) il polinomio caratteristico di f è $x^2(x - 1)$, (ii) il vettore $v_1 = (1, -1, 2)$ è una base del nucleo di f , (iii) $v_2 = (1, 0, 2)$ è il generatore dell'autospazio relativo all'unico autovalore non nullo di f , (iv) $f(v_3) = -v_1$, ove $v_3 = (0, 2, -1)$.

- Si scriva la matrice A di f rispetto alla base $\{v_1, v_2, v_3\}$.
- Si scriva la matrice B di f rispetto alla base canonica.
- Si stabilisca se la matrice B è diagonalizzabile.
- Al variare di $t \in \mathbb{R}$ si determini $f^{-1}(t, -1, 8)$.

Esercizio 3. Sia V il sottospazio vettoriale di \mathbb{R}^5 di equazione $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0$, dotato del prodotto scalare usuale. Sia $U \subset V$ il sottospazio generato dai vettori $u_1 = (2, 1, 0, 1, 0)$, $u_2 = (1, 3, 0, 0, 2)$ e sia $U^\perp \subset V$ l'ortogonale di U in V .

- Si determini una base ortogonale di U .
- Si determini una base di U^\perp .
- Dato il vettore $v = (4, 3, -4, 0, 3) \in V$ si determinino le proiezioni ortogonali di v su U e U^\perp .
- Si stabilisca se esiste un sottospazio vettoriale non nullo $L \subset \mathbb{R}^5$ che sia ortogonale sia a U che a U^\perp . Se un tale sottospazio esiste, se ne determini una base e si dica se esso è unico.

Esercizio 4. Nello spazio affine euclideo tridimensionale, sono date le rette

$$r : \begin{cases} x + 2y - 4 = 0 \\ x - 2y + 2z - 2 = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} 3x - y + 3 = 0 \\ 2x - y - z + 4 = 0 \end{cases}$$

- Si dica se r e s sono incidenti, parallele o sghembe.
- Si determini la retta ℓ parallela al vettore $u = (8, -6, -4)$ e incidente le rette r e s .
- Si determini l'equazione del piano π contenente la retta r e ortogonale al vettore $(3, 4, 1)$.
- Si determinino le proiezioni ortogonali del punto $P = (1, 1, 1)$ sul piano π e sulla retta s .

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____

ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

PROF. F. BOTTACIN, N. RODINÒ

3° Appello — 12 settembre 2012

Esercizio 1. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale di equazioni $2x_1 + x_2 - x_3 = 0$ e $3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$, e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il più piccolo sottospazio che contiene il vettore $(1, 0, 0, 1)$ e i vettori $(t, t + 2, t + 3, 0)$, per ogni $t \in \mathbb{Z}$.

- (a) Si determini la dimensione e una base di U .
- (b) Si determinino le equazioni cartesiane e una base di W .
- (c) Si determinino delle basi di $U \cap W$ e $U + W$.
- (d) Si dica se esiste un sottospazio non nullo $L \subset \mathbb{R}^4$ che sia in somma diretta sia con U che con W . Se un tale L esiste, se ne determini una base. Si determini inoltre (se esiste) un sottospazio $L' \subset \mathbb{R}^4$ tale che $(U \oplus L) \oplus L' = \mathbb{R}^4$.

Esercizio 2. Sia f un endomorfismo di \mathbb{R}^3 con le seguenti proprietà: (i) il polinomio caratteristico di f è $x^2(x - 3)$, (ii) il vettore $v_1 = (0, 2, -1)$ è una base del nucleo di f , (iii) $v_2 = (1, 0, 2)$ è il generatore dell'autospazio relativo all'unico autovalore non nullo di f , (iv) $f(v_3) = -v_1$, ove $v_3 = (1, -1, 2)$.

- (a) Si scriva la matrice A di f rispetto alla base $\{v_1, v_2, v_3\}$.
- (b) Si scriva la matrice B di f rispetto alla base canonica.
- (c) Si stabilisca se la matrice B è diagonalizzabile.
- (d) Al variare di $t \in \mathbb{R}$ si determini $f^{-1}(3, -4, t)$.

Esercizio 3. Sia V il sottospazio vettoriale di \mathbb{R}^5 di equazione $x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 0$, dotato del prodotto scalare usuale. Sia $U \subset V$ il sottospazio generato dai vettori $u_1 = (1, 3, 0, -2, 0)$, $u_2 = (2, -1, 0, 0, -3)$ e sia $U^\perp \subset V$ l'ortogonale di U in V .

- (a) Si determini una base ortogonale di U .
- (b) Si determini una base di U^\perp .
- (c) Dato il vettore $v = (1, 2, 8, -4, 5) \in V$ si determinino le proiezioni ortogonali di v su U e U^\perp .
- (d) Si stabilisca se esiste un sottospazio vettoriale non nullo $L \subset \mathbb{R}^5$ che sia ortogonale sia a U che a U^\perp . Se un tale sottospazio esiste, se ne determini una base e si dica se esso è unico.

Esercizio 4. Nello spazio affine euclideo tridimensionale, sono date le rette

$$r : \begin{cases} y + 2z + 3 = 0 \\ 2x - y + 2z - 5 = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x - 3y - 3 = 0 \\ x - y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

- (a) Si dica se r e s sono incidenti, parallele o sghembe.
- (b) Si determini la retta ℓ parallela al vettore $u = (4, 6, 2)$ e incidente le rette r e s .
- (c) Si determini l'equazione del piano π contenente la retta r e ortogonale al vettore $(2, -1, 2)$.
- (d) Si determinino le proiezioni ortogonali del punto $P = (1, 2, 1)$ sul piano π e sulla retta s .