

Esercizio 1. In $\mathbb{R}^4$ sia U il sottospazio di equazioni

$$U : \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \\ 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_3 + tx_4 = 0 \end{cases}$$

- Trovare il valore di t per cui U ha dimensione 2 e, per tale valore di t , scrivere una base di U .
- Applicando il procedimento di Gram-Schmidt alla base trovata al punto (a) ottenere una base ortogonale di U .
- Per il valore di t trovato al punto (a) scrivere una base del sottospazio $U^\perp$.
- Dato $v = (3, 2, 2, -2) \in \mathbb{R}^4$ scrivere l'equazione cartesiana di un sottospazio W di dimensione 3 tale che la proiezione ortogonale di v su W sia il vettore $w = (1, 2, 1, 1)$.

Esercizio 2. Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la seguente funzione lineare:

$$f(x, y, z) = (x - y + 2z, -2x + 3y - z, y + 3z, -x + 3y + tz)$$

- Determinare la dimensione dell'immagine di f al variare del parametro $t \in \mathbb{R}$.
- Esistono dei valori di t per cui f è suriettiva? Se sì, quali sono? Esistono dei valori di t per cui f è iniettiva? Se sì, quali sono?
- Per il valore di t per cui f ha rango 2 scrivere una base di $\text{Ker } f$ e una base di $\text{Im } f$.
- Esistono dei valori di t per i quali il vettore $w = (1, 1, 0, 1)$ appartiene all'immagine di f ?
- Ora poniamo $t = 0$. Esiste una funzione lineare $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che la funzione composta $g \circ f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sia l'identità? (La risposta deve essere motivata e **NON** è richiesto di trovare la funzione g)

Esercizio 3. Consideriamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

- Per quale valore di $t \in \mathbb{R}$ la matrice A **non** è invertibile?
- Determinare gli autovalori di A e dire per quali $t \in \mathbb{R}$ tutti gli autovalori sono reali.
- Determinare per quali $t \in \mathbb{R}$ ci sono autovalori con molteplicità > 1 .
- Per ciascuno dei valori di t trovati al punto (c) scrivere una base degli autospazi corrispondenti agli autovalori con molteplicità > 1 e dire se A è diagonalizzabile.

Esercizio 4. Nello spazio affine $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ sono assegnati i punti $A = (6, -1, -4)$, $B = (1, 1, -1)$ e il piano $\pi: 2x - y - 2z = 3$.

- Sia C la proiezione ortogonale di A sul piano π . Determinare il punto C , verificare che $B \in \pi$ e calcolare l'area del triangolo $\triangle ABC$.
- Scrivere l'equazione cartesiana del piano contenente il triangolo $\triangle ABC$.
- Scrivere le equazioni parametriche della retta s passante per il punto B , contenuta nel piano π e ortogonale alla retta per A e B .
- Determinare il valore del parametro t affinché la retta $r_t: \begin{cases} tx - y + 2 = 0 \\ x + z + 1 = 0 \end{cases}$ sia parallela al piano π .

Esercizio 1. In $\mathbb{R}^4$ sia U il sottospazio di equazioni

$$U : \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + tx_4 = 0 \end{cases}$$

- Trovare il valore di t per cui U ha dimensione 2 e, per tale valore di t , scrivere una base di U .
- Applicando il procedimento di Gram-Schmidt alla base trovata al punto (a) ottenere una base ortogonale di U .
- Per il valore di t trovato al punto (a) scrivere una base del sottospazio $U^\perp$.
- Dato $v = (0, -2, 4, 3) \in \mathbb{R}^4$ scrivere l'equazione cartesiana di un sottospazio W di dimensione 3 tale che la proiezione ortogonale di v su W sia il vettore $w = (-1, 1, 2, 3)$.

Esercizio 2. Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la seguente funzione lineare:

$$f(x, y, z) = (x + 2y - 2z, 3x + y - 2z, -5y + 4z, -3x + 4y + tz)$$

- Determinare la dimensione dell'immagine di f al variare del parametro $t \in \mathbb{R}$.
- Esistono dei valori di t per cui f è suriettiva? Se sì, quali sono? Esistono dei valori di t per cui f è iniettiva? Se sì, quali sono?
- Per il valore di t per cui f ha rango 2 scrivere una base di $\text{Ker } f$ e una base di $\text{Im } f$.
- Esistono dei valori di t per i quali il vettore $w = (-1, 1, 0, 1)$ appartiene all'immagine di f ?
- Ora poniamo $t = 0$. Esiste una funzione lineare $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che la funzione composta $g \circ f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sia l'identità? (La risposta deve essere motivata e **NON** è richiesto di trovare la funzione g)

Esercizio 3. Consideriamo la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & t \\ 1 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

- Per quale valore di $t \in \mathbb{R}$ la matrice A **non** è invertibile?
- Determinare gli autovalori di A e dire per quali $t \in \mathbb{R}$ tutti gli autovalori sono reali.
- Determinare per quali $t \in \mathbb{R}$ ci sono autovalori con molteplicità > 1 .
- Per ciascuno dei valori di t trovati al punto (c) scrivere una base degli autospazi corrispondenti agli autovalori con molteplicità > 1 e dire se A è diagonalizzabile.

Esercizio 4. Nello spazio affine $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ sono assegnati i punti $A = (0, 6, -4)$, $B = (-2, 1, -1)$ e il piano $\pi: x + 2y - 2z = 2$.

- Sia C la proiezione ortogonale di A sul piano π . Determinare il punto C , verificare che $B \in \pi$ e calcolare l'area del triangolo $\triangle ABC$.
- Scrivere l'equazione cartesiana del piano contenente il triangolo $\triangle ABC$.
- Scrivere le equazioni parametriche della retta s passante per il punto B , contenuta nel piano π e ortogonale alla retta per A e B .
- Determinare il valore del parametro t affinché la retta $r_t: \begin{cases} tx + 2y - 2 = 0 \\ x + z + 1 = 0 \end{cases}$ sia parallela al piano π .

Esercizio 1. In $\mathbb{R}^4$ sia U il sottospazio di equazioni

$$U : \begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_4 = 0 \\ 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + tx_4 = 0 \end{cases}$$

- Trovare il valore di t per cui U ha dimensione 2 e, per tale valore di t , scrivere una base di U .
- Applicando il procedimento di Gram-Schmidt alla base trovata al punto (a) ottenere una base ortogonale di U .
- Per il valore di t trovato al punto (a) scrivere una base del sottospazio $U^\perp$.
- Dato $v = (2, 1, 3, 5) \in \mathbb{R}^4$ scrivere l'equazione cartesiana di un sottospazio W di dimensione 3 tale che la proiezione ortogonale di v su W sia il vettore $w = (2, -1, 4, 2)$.

Esercizio 2. Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la seguente funzione lineare:

$$f(x, y, z) = (x - 3y - z, -3x + 4y + 2z, -5y - z, 3x + y + tz)$$

- Determinare la dimensione dell'immagine di f al variare del parametro $t \in \mathbb{R}$.
- Esistono dei valori di t per cui f è suriettiva? Se sì, quali sono? Esistono dei valori di t per cui f è iniettiva? Se sì, quali sono?
- Per il valore di t per cui f ha rango 2 scrivere una base di $\text{Ker } f$ e una base di $\text{Im } f$.
- Esistono dei valori di t per i quali il vettore $w = (1, 2, 0, 1)$ appartiene all'immagine di f ?
- Ora poniamo $t = 0$. Esiste una funzione lineare $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che la funzione composta $g \circ f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sia l'identità? (La risposta deve essere motivata e **NON** è richiesto di trovare la funzione g)

Esercizio 3. Consideriamo la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & t \\ 2 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- Per quale valore di $t \in \mathbb{R}$ la matrice A **non** è invertibile?
- Determinare gli autovalori di A e dire per quali $t \in \mathbb{R}$ tutti gli autovalori sono reali.
- Determinare per quali $t \in \mathbb{R}$ ci sono autovalori con molteplicità > 1 .
- Per ciascuno dei valori di t trovati al punto (c) scrivere una base degli autospazi corrispondenti agli autovalori con molteplicità > 1 e dire se A è diagonalizzabile.

Esercizio 4. Nello spazio affine $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ sono assegnati i punti $A = (-2, 4, -1)$, $B = (1, -1, 1)$ e il piano $\pi: 2x - 2y + z = 5$.

- Sia C la proiezione ortogonale di A sul piano π . Determinare il punto C , verificare che $B \in \pi$ e calcolare l'area del triangolo $\triangle ABC$.
- Scrivere l'equazione cartesiana del piano contenente il triangolo $\triangle ABC$.
- Scrivere le equazioni parametriche della retta s passante per il punto B , contenuta nel piano π e ortogonale alla retta per A e B .
- Determinare il valore del parametro t affinché la retta $r_t: \begin{cases} tx - y + 3 = 0 \\ 2x - z - 1 = 0 \end{cases}$ sia parallela al piano π .

Esercizio 1. In $\mathbb{R}^4$ sia U il sottospazio di equazioni

$$U : \begin{cases} x_1 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + tx_4 = 0 \end{cases}$$

- Trovare il valore di t per cui U ha dimensione 2 e, per tale valore di t , scrivere una base di U .
- Applicando il procedimento di Gram–Schmidt alla base trovata al punto (a) ottenere una base ortogonale di U .
- Per il valore di t trovato al punto (a) scrivere una base del sottospazio $U^\perp$.
- Dato $v = (2, 3, 2, -3) \in \mathbb{R}^4$ scrivere l'equazione cartesiana di un sottospazio W di dimensione 3 tale che la proiezione ortogonale di v su W sia il vettore $w = (-1, 3, 1, -1)$.

Esercizio 2. Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la seguente funzione lineare:

$$f(x, y, z) = (x + y - 2z, 2x + y - 3z, -y + z, 4x + y + tz)$$

- Determinare la dimensione dell'immagine di f al variare del parametro $t \in \mathbb{R}$.
- Esistono dei valori di t per cui f è suriettiva? Se sì, quali sono? Esistono dei valori di t per cui f è iniettiva? Se sì, quali sono?
- Per il valore di t per cui f ha rango 2 scrivere una base di $\text{Ker } f$ e una base di $\text{Im } f$.
- Esistono dei valori di t per i quali il vettore $w = (2, 1, 0, 1)$ appartiene all'immagine di f ?
- Ora poniamo $t = 0$. Esiste una funzione lineare $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che la funzione composta $g \circ f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sia l'identità? (La risposta deve essere motivata e **NON** è richiesto di trovare la funzione g)

Esercizio 3. Consideriamo la matrice $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & t \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

- Per quale valore di $t \in \mathbb{R}$ la matrice A **non** è invertibile?
- Determinare gli autovalori di A e dire per quali $t \in \mathbb{R}$ tutti gli autovalori sono reali.
- Determinare per quali $t \in \mathbb{R}$ ci sono autovalori con molteplicità > 1 .
- Per ciascuno dei valori di t trovati al punto (c) scrivere una base degli autospazi corrispondenti agli autovalori con molteplicità > 1 e dire se A è diagonalizzabile.

Esercizio 4. Nello spazio affine $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ sono assegnati i punti $A = (0, 4, 3)$, $B = (2, 1, -2)$ e il piano $\pi: x - 2y - 2z = 4$.

- Sia C la proiezione ortogonale di A sul piano π . Determinare il punto C , verificare che $B \in \pi$ e calcolare l'area del triangolo $\triangle ABC$.
- Scrivere l'equazione cartesiana del piano contenente il triangolo $\triangle ABC$.
- Scrivere le equazioni parametriche della retta s passante per il punto B , contenuta nel piano π e ortogonale alla retta per A e B .
- Determinare il valore del parametro t affinché la retta $r_t: \begin{cases} tx - 2y + 4 = 0 \\ 3x - 2z + 2 = 0 \end{cases}$ sia parallela al piano π .