

Esercizio 1. Calcolare z^{-1} , w^{-1} , zw , zw^{-1} , $z^{-1}w$, z^2 , z^3 , z^4 , le radici quadrate di z e le radici cubiche di z per le seguenti coppie di numeri:

- (a) $z = 1 - i$, $w = 2 + i$;
- (b) $z = 1 + i$, $w = 1 - 2i$;
- (c) $z = 3e^{i\pi/3}$, $w = 2e^{i\pi/4}$
- (d) $z = \cos \frac{-\pi}{4} + i \sin \frac{-\pi}{4}$, $w = -i$
- (e) $z = \cos \theta + i \sin \theta$, $w = \pm 2i$

Esercizio 2. Verificare le seguenti relazioni:

$$\frac{1+i}{1-i} = i, \quad (1-2i)^4 = (2+i)^4, \quad z + \bar{z} = 2\Re z, \quad i\bar{z} - iz = 2\Im z, \quad \frac{z}{\bar{z}} = e^{2i\arg z}.$$

Esercizio 3. Si studino le proprietà di iniettività, suriettività, eventuali inverse destre e sinistre per le seguenti funzioni $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$:

- (a) $f_1(z) = z^2 + i$;
- (b) $f_2(z) = (z+i)^2$;
- (c) $f_3(z) = z - \bar{z}$;
- (d) $f_4(z) = z/|z|$ se $z \neq 0$, $f_4(0) = 0$.
- (e) $f_5(z) = z/\bar{z}$ se $z \neq 0$, $f_5(0) = 0$.

Per ogni $w \in \mathbb{C}$, si determini la sua controimmagine per ciascuna delle funzioni date.

Esercizio 4. Si determinino gli elementi degli insiemi

$$A = \{ z \in \mathbb{C} \mid z^3 - i = 0 \}, \quad B = \{ z \in \mathbb{C} \mid z^3 + 1 = 0 \},$$

- (a) Si disegnino sul piano di Gauss gli insiemi A , B e $C = \{ z \in \mathbb{C} \mid \Re z > 0 < \Im z \}$.
- (b) Siano $\{\zeta_1\} = A \cap C$ e $\{\zeta_2\} = B \cap C$. È vero che $(\zeta_1 + \zeta_2)(\zeta_1 - \zeta_2)$ è un numero reale e $\frac{\zeta_1 + \zeta_2}{\zeta_1 - \zeta_2}$ è un numero immaginario? (calcolarli)
- (c) Nel piano di Gauss, si disegni il parallelogramma di vertici 0 , ζ_1 , ζ_2 , $\zeta_1 + \zeta_2$.
- (d) Si dia una condizione necessaria e sufficiente sui numeri complessi $z_1 \neq z_2$, affinché $\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2}$ sia un numero immaginario.

Esercizio 5. Si consideri il polinomio $P(X) = X^2 - 2iX - 5 \in \mathbb{C}[X]$.

- (a) Si determinino i numeri complessi, z_1 e z_2 , tali che $P(z_1) = 0 = P(z_2)$, sapendo che $\Re z_1 \geq \Re z_2$.
- (b) Si disegni nel piano di Gauss l'insieme, D_2 , formato dai punti, $z \in \mathbb{C}$, la cui distanza da z_1 è maggiore del doppio della distanza da z_2 .
- (c) Al variare di α tra i numeri reali positivi, si determini l'insieme D_α , formato dai punti, z , la cui distanza da z_1 è maggiore di α volte la distanza di z da z_2 . È vero che, per ogni α , l'insieme D_α è delimitato da una circonferenza del piano di Gauss? Che dire di raggio e centro di queste circonferenze?

Esercizio 6. Si consideri l'insieme $\{z^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ per un fissato $z \in \mathbb{C}$; trovare condizioni necessarie e sufficienti affinché:

- (a) l'insieme sia finito;
- (b) l'insieme ammetta una infinità di elementi tra loro allineati;
- (c) l'insieme sia tutto contenuto nel cerchio unitario;
- (d) l'insieme sia tutto esterno al cerchio unitario.

Esercizio 7. Definiamo $\mathbb{S}^1 = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1 \}$ (circolo unitario o circonferenza unitaria) e $R(1) = \{ z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1 \text{ per qualche } n \in \mathbb{N} \}$ (radici dell'unità). Mostrare che $R(1) \subseteq \mathbb{S}^1$ e che l'inclusione è stretta. Come si caratterizzano gli elementi di $R(1)$ in termini dell'argomento? Sia ζ una soluzione dell'equazione $X^k - 1 = 0$. Si mostri che $1 + \zeta + \zeta^2 + \dots + \zeta^{k-1} = 0$.

Esercizio 8. Scrivere (e disegnare sul piano di Gauss) le radici n -esime di $-i$, $1 + i$, $3 - 4i$ per $n = 2, 3, 4, 5, 6$.

Esercizio 9. Determinare $\cos(5t)$, $\cos(8t)$, $\sin(6t)$, $\sin(9t)$ in termini delle funzioni trigonometriche di argomento t (e loro potenze).

Esercizio 10. Dare l'interpretazione geometrica nel piano di Gauss della inversione dei numeri complessi: se $z = \rho e^{i\theta}$ allora $z^{-1} = \rho^{-1} e^{-i\theta}$.

Esercizio 11. Sia $w = 1 + i\sqrt{3}$. Determinare $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tali che $0, w, z_1, z_2$ formino un quadrato nel piano di Gauss e $\Re(z_1) < 0$. Mostrare che $(w + z_2)(w - z_2) = 2w^2$ e $2wz_2 = z_1^2$.

Esercizio 12. Se $|z| = 1$, è vero che le radici n esime di z si ottengono ruotando opportunamente (e di quanto?) le radici n -esime dell'unità?

Esercizio 13. Mostrare che la funzione $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ che manda (ξ, ρ) nel prodotto $\xi\rho$ è una biiezione. Scrivere la funzione inversa.

Esercizio 14. Si determinino le soluzioni dell'equazione $z^2 - 2z + 1 + 2i = 0$.

(a) Si disegnino nel piano di Gauss le soluzioni, z_1 e z_2 , dell'equazione.

(b) Si determinino $\alpha \in \mathbb{C}$ e $c \in \mathbb{R}$ tali che la retta $r : \alpha z + \bar{\alpha} \bar{z} + c = 0$ passi per z_1 e z_2 .

(c) Si determinino centro e raggio della circonferenza del piano di Gauss che si ottiene per riflessione della retta r rispetto alla circonferenza unitaria ($|z| = 1$).

Esercizio 15. Siano z_1, z_2, z_3 , le radici cubiche del numero complesso $-8i$.

(a) Si scrivano in forma algebrica z_1, z_2, z_3 e si disegni nel piano di Gauss il triangolo avente i tre punti come vertici.

(b) Si determinino, nelle coordinate z e \bar{z} , le equazioni delle rette che formano i lati del triangolo avente come vertici z_1, z_2, z_3 .

(c) Si determinino e si disegnino i cerchi che si ottengono riflettendo nella circonferenza unitaria i lati del triangolo $z_1 z_2 z_3$. Si disegni, in particolare, il triangolo che ha come vertici i centri di tali circonferenze.

Esercizio 16 (Formula di Cardano). Si consideri l'equazione generale di terzo grado, della forma $aX^3 + bX^2 + cX + d = 0$, con $a \neq 0$.

(a) Si verifichi che, posto $X = Y - \frac{b}{3a}$, si ottiene $aX^3 + bX^2 + cX + d = a(Y^3 + pY + q)$, con $p = \frac{3ac - b^2}{3a^2}$ e $q = \frac{27a^2d + 2b^3 - 9abc}{27a^3}$.

(b) Si mostri che la sostituzione di Viète, $Y = W - \frac{p}{3W}$, porta l'equazione $Y^3 + pY + q = 0$ nella forma $W^3 - \frac{p^3}{27W^3} + q = 0$. Infine, la moltiplicazione per W^3 e la posizione $W^3 = T$, riporta il problema alla risoluzione dell'equazione di secondo grado $T^2 + qT - \frac{p^3}{27} = 0$ ed all'estrazione delle radici terze delle soluzioni.

(c) Si osservi che, se w_1 è una soluzione dell'equazione $W^3 - \frac{p^3}{27W^3} + q = 0$, allora anche $w_2 = -\frac{p}{3w_1}$ è una soluzione della stessa equazione e che $w_1 - \frac{p}{3w_1} = w_2 - \frac{p}{3w_2}$. Si concluda che dai 6 possibili valori per le radici di $W^3 - \frac{p^3}{27W^3} + q = 0$, si ottengono al più tre valori distinti per le radici di $Y^3 + pY + q = 0$.

Esercizio 17 (Formule di Ferrari e Del Ferro). Si consideri l'equazione generale di quarto grado, della forma $aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e = 0$, con $a \neq 0$.

(a) Si verifichi che, posto $X = Y - \frac{b}{4a}$, si ottiene $aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e = a(Y^4 + pY^2 + qY + r)$, per opportuni valori di p, q ed r .

(b) Si mostri che, introducendo una variabile ausiliaria, U , si ha

$$Y^4 + pY^2 + qY + r = (Y^2 + \frac{U}{2})^2 - \left[(U - p)Y^2 - qY + (\frac{U^2}{4} - r) \right].$$

(c) Si osservi che, se u è una radice dell'equazione $q^2 - (U - p)(U^2 - 4r) = 0$, sostituendo u ad U nel termine di destra dell'identità nel punto precedente, si ottiene la differenza tra i quadrati di due polinomi nella Y , che è uguale al prodotto di due polinomi di secondo grado nella Y .

(d) Si concluda che il metodo precedente riconduce la risoluzione di un'equazione di quarto grado alla risoluzione di equazioni di terzo e secondo grado.

Esercizio 18. Si utilizzino i procedimenti descritti negli esercizi precedenti per trovare le radici dei seguenti polinomi

$$X^3 + 3iX - (1 + i), \quad X^3 + \frac{3(1+i)}{\sqrt{2}}X^2 + (\sqrt{2} - 1)(1 + i), \quad X^4 + 2iX^2 - (1 - 2i)X + 2i.$$