

Esercizio 1. Si considerino i vettori $u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ nello spazio \mathbb{Q}^3 .

- (a) Si verifichi che $\mathcal{U} = \{u_1, u_2, u_3\}$ è una base di \mathbb{Q}^3 .
- (b) Si trasformi \mathcal{U} nella base canonica $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3\}$ tramite operazioni elementari.
- (c) Si scrivano i vettori della base canonica come combinazione lineare dei vettori della base \mathcal{U} .

Esercizio 2. Si considerino i vettori $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, nello spazio \mathbb{R}^4 .

- (a) Si verifichi che $\mathcal{U} = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ è una base di \mathbb{R}^4 .
- (b) Si trasformi \mathcal{U} nella base canonica $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ tramite operazioni elementari.
- (c) Si scrivano i vettori della base canonica come combinazione lineare dei vettori della base \mathcal{U} .

Esercizio 3. Si considerino nello spazio vettoriale \mathbb{R}^3 il sottospazio $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid x_1 - x_3 = 0 \right\}$ ed il vettore $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Si verifichi che $\mathbb{R}^3 = U \oplus \langle v \rangle$.
- (b) Sia $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione che ad ogni vettore $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ di \mathbb{R}^3 associa quell'unico vettore $\pi(x) \in U$, tale che $x = \pi(x) + \alpha v$, per qualche $\alpha \in \mathbb{R}$. Si scrivano esplicitamente le coordinate del vettore $\pi(x)$ in funzione delle coordinate di x e si verifi che che si tratta di un'applicazione lineare.
- (c) Si determinino nucleo ed immagine di π .

Esercizio 4. Sia $C[X]$ lo spazio vettoriale di tutti i polinomi a coefficienti nel corpo C

- (a) Si verifichi che l'applicazione $\mu : P(X) \mapsto XP(X)$, che ad ogni polinomio $P(X)$ associa il suo prodotto con X è un'applicazione lineare.
- (b) Si verifichi che l'applicazione, $\delta : C[X] \rightarrow C[X]$, che associa al polinomio $P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n$, la sua derivata rispetto ad X , ovvero $P'(X) = a_1 + 2a_2X + \cdots + na_nX^{n-1}$, è un'applicazione lineare.
- (c) Si determinino nucleo ed immagine per le due applicazioni ai punti precedenti
- (d) Si determini l'immagine di un polinomio, $P(X)$, tramite l'applicazione $\delta \circ \mu - \mu \circ \delta$.

Esercizio 5. Si considerino gli spazi vettoriali \mathbb{R}^3 ed \mathbb{R}^2 e la base canonica, $\{e_1, e_2, e_3\}$, di \mathbb{R}^3 . Detta $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'applicazione lineare che manda i vettori della base canonica ordinatamente sui vettori $u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$; si scrivano esplicitamente le coordinate (in base canonica) dell'immagine di un generico vettore $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ di \mathbb{R}^3 .

Esercizio 6. Dimostrare che se $f : V \rightarrow W$ è una applicazione lineare allora l'immagine di un sottospazio di V è ancora un sottospazio di W e l'antiimmagine di un sottospazio di W è un sottospazio di V .

Esercizio 7. Si consideri l'applicazione lineare di $f : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che

$$f(t(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)) = (t(x_1 + x_2 - 2x_3, 3x_1 + 3x_2 - x_4, -2x_2 + 2x_5)).$$

- (a) Determinarne nucleo ed immagine. Chi è l'antiimmagine del vettore $t(1, 0, 1)$? E l'antiimmagine di $t(0, 0, 0)$ a quale sottospazio corrisponde?
- (b) Si dica se f è suriettiva e, in caso affermativo, si determinino tutte le possibili inverse destre di f .

Esercizio 8. Si considerino gli spazi vettoriali reali V e W con le rispettive basi: $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_4\}$ e $\mathcal{W} = \{w_1, \dots, w_3\}$.

- (a) Si determini l'applicazione lineare $\phi : V \rightarrow W$, così definita dalle condizioni:

$$\begin{aligned} \phi(v_1) &= w_1 - w_2, & \phi(v_2) &= 2w_2 - 6w_3, \\ \phi(v_3) &= -2w_1 + 2w_2, & \phi(v_4) &= w_2 - 3w_3. \end{aligned}$$

- (b) Si determinino le dimensioni dei sottospazi $\ker \phi$ ed $\text{im } \phi$ e si scrivano delle basi per tali sottospazi.
(c) È vero o falso che $w_1 + w_2 + w_3 \in \text{im } \phi$?

Esercizio 9. Dopo aver identificato il piano \mathbb{C} dei numeri complessi con lo spazio vettoriale \mathbb{R}^2 , si dimostri che la moltiplicazione di $z = x + iy$ con il numero complesso $e^{i\pi/4} = \sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$ è una applicazione lineare di $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$. Determinarne la matrice rispetto alla base canonica $\{1, i\}$. Geometricamente a cosa corrisponde?

Esercizio 10. Si indichi con $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_4\}$ la base canonica di $V = \mathbb{C}^4$ e si considerino i seguenti sottospazi (complessi) di V

$$E = \langle e_1, e_2 \rangle \quad \text{e} \quad D = \langle e_3 - (1+3i)e_1, e_4 - 2ie_2 \rangle.$$

- (a) Si dimostri che $V = E \oplus D$.
(b) Si indichino con $\pi: E \oplus D \rightarrow E$ la proiezione ($d + e \mapsto e$) e con L il sottospazio reale di V generato dalla base canonica. Si dimostri che la restrizione di π ad L è un isomorfismo di spazi vettoriali reali.
(c) Si osservi che, tramite l'isomorfismo del punto precedente, la moltiplicazione per i dei vettori del sottospazio E diviene un'applicazione \mathbb{R} -lineare dello spazio L in sé. Si scriva la matrice J di tale endomorfismo rispetto alla base $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ di L .

Esercizio 11. Siano V e W due spazi vettoriali sul campo C ed indichiamo con $\text{Hom}_C(V, W)$ l'insieme delle applicazioni C -lineari di V su W .

- (a) Si mostri che $\text{Hom}_C(V, W)$ è uno spazio vettoriale su C con le consuete operazioni tra funzioni: $(\phi + \psi)(v) = \phi(v) + \psi(v)$ e $(c\phi)(v) = c\phi(v)$ per ogni $v \in V$.
(b) Siano fissate una base $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$ di V ed una base $\mathcal{W} = \{w_1, \dots, w_m\}$ di W . Fissati due indici, i_0 e j_0 , si definisca l'applicazione lineare $\psi_{i_0, j_0}: V \rightarrow W$, ponendo, per $i = 1, \dots, n$,

$$\psi_{i_0, j_0}(v_i) = \begin{cases} w_{j_0} & \text{se } i = i_0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Si mostri che ogni applicazione lineare si scrive in modo unico come combinazione lineare delle $\psi_{i,j}$, per $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m$.

Esercizio 12. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n sul campo C . Siano U ed E due sottospazi di V di dimensioni k ed $n-k$ rispettivamente, tali che $V = U \oplus E$. Fissato comunque $\psi \in \text{Hom}_C(U, E)$ si consideri il sottoinsieme di V

$$U_\psi = \{u + \psi(u) \mid u \in U\}.$$

- (a) Si mostri che U_ψ è un sottospazio di V di dimensione k e che $V = U_\psi \oplus E$.
(b) Si mostri che la corrispondenza $\psi \mapsto U_\psi$ induce una biiezione tra $\text{Hom}_C(U, E)$ e l'insieme S_E dei sottospazi X di V tali che $V = X \oplus E$.

Esercizio 13. Sia V uno spazio vettoriale sul campo C . Quali sono le proiezioni e le simmetrie associate alla decomposizione $V = \langle 0 \rangle \oplus V$?

Esercizio 14. Nello spazio vettoriale \mathbb{Q}^4 siano dati i vettori

$$w_1 = e_1 - e_3 + 2e_4, \quad w_2 = e_1 + e_2 - 2e_4, \quad w_3 = 3e_4 - e_1 - 2e_2 - e_3, \quad w_4 = 2e_1 + e_2 - e_3,$$

ove $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_4\}$ indica la base canonica.

- (a) Si scriva, in tutti i modi possibili, il vettore $e_1 + e_2 - e_4$ come combinazione lineare di w_1, \dots, w_4 .
(b) Indicata con $\phi: \mathbb{Q}^4 \rightarrow \mathbb{Q}^4$ l'applicazione lineare che manda la base canonica ordinatamente su w_1, \dots, w_4 , si determinino una base del nucleo e dell'immagine di ϕ e di $\ker \phi \cap \text{im } \phi$.

Esercizio 15. Siano V uno spazio vettoriale ed U, W , due suoi sottospazi tali che $V = U \oplus W$.

- (a) Indicata con π una qualunque delle due proiezioni associate alla decomposizione di V , si verifichi che $\pi \circ \pi = \pi$, ovvero che, per ogni vettore $x \in V$, si ha $\pi(\pi(x)) = \pi(x)$.
(b) Indicata con σ una qualunque delle due simmetrie associate alla decomposizione di V , si verifichi che $\sigma \circ \sigma = 1$, ovvero che, per ogni vettore $x \in V$, si ha $\sigma(\sigma(x)) = x$.

- (c) Si determinino nucleo ed immagine di π_U , π_W , σ_U e σ_W . Inoltre, per ciascuna delle applicazioni, si determini l'insieme dei vettori uniti.

Esercizio 16. Sia $\phi: V \rightarrow V$ un'applicazione lineare tale che $\phi \circ \phi = \phi$. Si mostri che ϕ è la proiezione su $\text{im } \phi$, parallelamente a $\ker \phi$.

Esercizio 17. Sia V uno spazio vettoriale sul campo C , di caratteristica diversa da 2, e sia $\psi: V \rightarrow V$ un'applicazione lineare tale che $\psi \circ \psi = \text{id}_V \neq \psi$. Si mostri che ψ è una simmetria. Qual è l'asse e quale la direzione di simmetria?

Esercizio 18. Sia C un campo di caratteristica 2 ($1 + 1 = 0$ in C).

- (a) Sia $V = U \oplus W$ uno spazio vettoriale su C . Si dimostri che le simmetrie associate alla decomposizione di V coincidono con l'identità $\text{id}: V \rightarrow V$, qualunque sia la decomposizione dello spazio.
- (b) Si consideri l'endomorfismo $\phi: C^2 \rightarrow C^2$, definito da $\phi(e_1) = e_1$ e $\phi(e_2) = e_1 + e_2$. Si verifichi che $\phi(\phi(v)) = v$ per ogni $v \in C^2$ (...ma non è una simmetria di C^2).

Esercizio 19. Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione 2 e sia $\cdot: V \times V \rightarrow V$ un prodotto, compatibile con la moltiplicazione per scalari, che renda V un campo. Detto u_0 l'elemento neutro per questo prodotto, si mostri che esiste un elemento $v_0 \in V$ tale che $v_0^2 = -u_0$. Si conclude che $V \cong \mathbb{C}$.

Esercizio 20. Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione 2 e sia $\cdot: V \times V \rightarrow V$ un prodotto, compatibile con la moltiplicazione per scalari, che renda V un anello. Allora si ha una e una sola tra le seguenti possibilità:

- V è isomorfo al campo \mathbb{C} dei numeri complessi;
- V è isomorfo al prodotto diretto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (prodotto $(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1 x_2, y_1 y_2)$);
- V è isomorfo all'anello dei *numeri duali*, $\mathbb{R}(\varepsilon) = \mathbb{R}[X]/(X^2)$.

Esercizio 21. Siano V e W due spazi vettoriali sul campo C . Si mostri che il prodotto cartesiano $V \times W$ con le operazioni $(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2)$ e $c(v, w) = (cv, cw)$ è uno spazio vettoriale su C . Supponendo che V e W abbiano dimensioni n ed m , rispettivamente e si calcoli la dimensione di $V \times W$.

Esercizio 22. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione numerabile sul campo C (ovvero esista una base $\{v_n \mid n \in \mathbb{N}\}$). Sia $V \times V$ il prodotto cartesiano di V con sé stesso. Si definisca un isomorfismo di V con $V \times V$.

Esercizio 23. Sia C un campo e si considerino gli spazi vettoriali di polinomi $C[X]$ e $C[X, Y]$. Si mostri che esiste un isomorfismo di spazi vettoriali $C[X] \rightarrow C[X, Y]$. Si deduca che esiste un isomorfismo di spazi vettoriali tra $C[X]$ e $C[X_1, \dots, X_n]$, per ogni intero $n \geq 1$. Potrebbero esistere isomorfismi di anelli tra i due spazi?