

Esercizio 1. Si mostri che un endomorfismo ϕ di uno spazio vettoriale V , di dimensione n , è nilpotente se, e solo se, 0 è l'unico autovalore di ϕ .

Esercizio 2. Si consideri l'endomorfismo $\phi: \mathbb{Q}^4 \rightarrow \mathbb{Q}^4$, avente matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

rispetto alla base canonica. Si determinino il polinomio caratteristico ed il polinomio minimo di ϕ , una matrice di Jordan J di ϕ ed una matrice invertibile $P \in \mathrm{GL}_4(\mathbb{Q})$ tale che $J = P^{-1}AP$.

Esercizio 3. Si determini il polinomio caratteristico, il polinomio minimo e la forma di Jordan degli endomorfismi di \mathbb{Q}^n aventi le seguenti matrici rispetto alla base canonica. Per ciascuno degli endomorfismi si determini una matrice invertibile, P , tale che $P^{-1}AP$ sia una matrice di Jordan.

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 3 & -3 \\ 3 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 3 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 3 \\ -3 & 6 & -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 9 & -5 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 4. Siano V uno spazio vettoriale di dimensione n sul campo \mathbb{C} , $\phi: V \rightarrow V$ un endomorfismo il cui polinomio caratteristico sia $p_\phi(X) = (X - a_1)^{m_1} \cdots (X - a_r)^{m_r}$ con a_1, \dots, a_r a due a due distinti. Posto $W_j = \ker(\phi - a_j)^{m_j}$, per $j = 1, \dots, r$, si indichino con $\delta_j: W_j \rightarrow W_j$ la moltiplicazione per lo scalare a_j e con $\nu_j: W_j \rightarrow W_j$ la restrizione di $\phi - a_j$ a W_j , per $j = 1, \dots, r$.

- (a) Si verifichi che ν_j è un endomorfismo nilpotente e che δ_j commuta con ν_j .
- (b) Si considerino gli endomorfismi $\nu: V \rightarrow V$ e $\delta: V \rightarrow V$, definiti dalle condizioni $\nu|_{W_j} = \nu_j$ e $\delta|_{W_j} = \delta_j$, per $j = 1, \dots, r$. Si mostri che $\phi = \delta + \nu$ e che $\delta \circ \nu = \nu \circ \delta$ (ovvero: ogni endomorfismo di uno spazio vettoriale di dimensione finita su \mathbb{C} è somma di un endomorfismo diagonalizzabile e di un endomorfismo nilpotente che commutano tra loro)

Esercizio 5. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione 10 sul corpo \mathbb{Q} dei numeri razionali. Si determinino il polinomio caratteristico, il polinomio minimo e la matrice di Jordan di tutti gli endomorfismi ϕ di V soddisfacenti alle condizioni:

$$\begin{aligned} \dim \ker(\phi - 5) &= 2 < \dim \ker(\phi - 5)^2 < \dim \ker(\phi - 5)^3 = 4, \\ \dim \ker(\phi + 2) &= 2 < \dim \ker(\phi + 2)^4 = 4, \quad \dim \mathrm{im} \phi = 8. \end{aligned}$$

Esercizio 6. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione 3 sul corpo \mathbb{Q} e si consideri un endomorfismo $\phi: V \rightarrow V$, di polinomio minimo $(X - 2)^2(X + 3)$. Si determinino il polinomio caratteristico, il polinomio minimo e la matrice di Jordan dell'endomorfismo $L_\phi: \mathrm{Hom}_\mathbb{Q}(V, V) \rightarrow \mathrm{Hom}_\mathbb{Q}(V, V)$, definito ponendo $L_\phi(\psi) := \phi \circ \psi$.

Esercizio 7. Siano V uno spazio vettoriale sul corpo C , $\psi: V \rightarrow V$ un endomorfismo nilpotente e q è il minimo intero positivo tale che $\psi^q(v) = 0$ per ogni $v \in V$. Si mostri che esiste una famiglia di sottospazi, H_1, \dots, H_q , di V , soddisfacenti alle condizioni seguenti.

- (a) $\ker \psi = H_1$ e $\ker \psi^j = H_j \oplus \ker \psi^{j-1}$ per $j = 2, \dots, q$;
- (b) $\psi(H_j) \subseteq H_{j-1}$ e la restrizione di ψ ad H_j è iniettiva, per $j = 2, \dots, q$;
- (c) $V = H_1 \oplus \dots \oplus H_q$.

Esercizio 8. Siano V uno spazio vettoriale sul corpo C , $\psi: V \rightarrow V$ un endomorfismo nilpotente ed H_1, \dots, H_q una famiglia di sottospazi di V soddisfacenti alle condizioni dell'esercizio precedente, ove q è il minimo intero tale che $\psi^q(v) = 0$ per ogni $v \in V$.

- (a) Fissata una base di v_1, \dots, v_s di H_q , si verifichi che i vettori

$$v_1, \psi(v_1), \dots, \psi^{q-1}(v_1), v_2, \psi(v_2), \dots, \psi^{q-1}(v_s)$$

sono linearmente indipendenti.

- (b) Sia j il minimo intero positivo tale che $\psi^j(v_1), \dots, \psi^j(v_s)$ non siano una base di H_{q-j} e si prendano dei vettori w_1, \dots, w_t che completino i vettori dati ad una base di H_{q-j} . Si mostri che i vettori

$$w_1, \psi(w_1), \dots, \psi^{q-j-1}(w_1), w_2, \psi(w_2), \dots, \psi^{q-j-1}(w_t), \\ v_1, \psi(v_1), \dots, \psi^{q-1}(v_1), v_2, \psi(v_2), \dots, \psi^{q-1}(v_s)$$

sono linearmente indipendenti.

- (c) Si prosegua analogamente a quanto fatto nel punto (b) per tutti gli indici minori di j , e si dimostri che con questa tecnica si determina una base di $V = H_1 \oplus \dots \oplus H_q$ rispetto a cui ψ ha matrice di Jordan.

Esercizio 9. Sia V uno spazio vettoriale su \mathbb{Q} e sia $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_5\}$ una sua base. Sia dato inoltre, l'endomorfismo $\psi: V \rightarrow V$, avente matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & -3 & -2 & 2 \\ -5 & 9 & -7 & -5 & 4 \\ 3 & -5 & 4 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

rispetto alla base \mathcal{V} .

- (a) Si mostri che ψ è nilpotente e si determini il minimo intero positivo q tale che $\psi^q = 0$ (il *periodo* di ψ).
- (b) Si determini una decomposizione $V = H_1 \oplus \dots \oplus H_q$ del tipo descritto nell'esercizio ??.

Esercizio 10. Siano V uno spazio vettoriale di dimensione finita sul campo C e $\phi: V \rightarrow V$ un endomorfismo. Inoltre siano dati dei sottospazi W_1, \dots, W_r , di dimensione positiva, tali che ϕ induca un endomorfismo su ciascuno di tali spazi e $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_r$.

Si dimostri, che il polinomio minimo di ϕ è il minimo comune multiplo dei polinomi minimi delle restrizioni $\phi|_{W_i}$ per $i = 1, \dots, r$.

Esercizio 11. Sia A una matrice quadrata, di ordine n , ad elementi nel corpo C .

- (a) Sia $C = \mathbb{R}$. Si mostri che una matrice simmetrica A è nilpotente se, e solo se, $\text{tr}(A^2) = 0$.
- (b) Sia $C = \mathbb{C}$. Si dia l'esempio di una matrice simmetrica B , non nilpotente, e tale che $\text{tr}(B^2) = 0$.
- (c) Sia $C = \mathbb{C}$. Si mostri che A è nilpotente se, e solo se, $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^2) = \dots = \text{tr}(A^n) = 0$.

Esercizio 12. Sia A una matrice reale antisimmetrica (${}^t A = -A$).

- (a) Si mostri che gli autovalori di A sono immaginari puri.
- (b) Si mostri che $\mathbf{1} + A$ è una matrice invertibile.
- (c) Si mostri che $P = (\mathbf{1} - A)(\mathbf{1} + A)^{-1}$ è una matrice ortogonale.

Esercizio 13. Sia A una matrice quadrata ad elementi in \mathbb{C} .

- (a) Si determini una condizione necessaria e sufficiente affinché si abbia $\text{tr} A^k = (\text{tr} A)^k$ per ogni intero positivo k .
- (b) È possibile caratterizzare l'insieme delle matrici $A \in M_n(\mathbb{C})$ soddisfacenti alla condizione del punto (a) tramite equazioni lineari omogenee sulle entrate della matrice? E tramite equazioni algebriche?

Esercizio 14. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione N sul corpo \mathbb{Q} dei numeri razionali e sia $\phi: V \rightarrow V$ un endomorfismo avente tutti gli autovalori reali e soddisfacente alla condizione $\phi^k = \mathbf{1}_V$ per qualche intero positivo k . Si mostri che ϕ è diagonalizzabile e $\phi^2 = \mathbf{1}_V$.

Esercizio 15. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione 15 sul corpo \mathbb{Q} dei numeri razionali e sia $\phi: V \rightarrow V$ un endomorfismo tale che

$$\text{rk}(\phi) = 10, \quad \text{rk}(\phi^2) = 7, \quad \text{rk}(\phi^3) = 4, \quad \text{rk}(\phi^4) = 2, \quad \text{rk}(\phi^5) = 0.$$

Si scriva una matrice di Jordan di ϕ .

Esercizio 16. Si consideri una matrice di Jordan di ordine n , con $(J - \alpha \mathbf{1})^n = \mathbf{0} \neq (J - \alpha \mathbf{1})^{n-1}$, ovvero

$$J = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & 1 & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & \alpha & 1 \\ 0 & \dots & 0 & & \alpha \end{pmatrix}.$$

Si mostri che J è simile alla sua trasposta e si determini una matrice invertibile P tale che $P^{-1}JP = {}^tJ$.
Sia $A \in M_n(\mathbb{C})$. È vero o falso che A è simile a tA ?