CdL Ingegneria Meccanica

Prova scritta di Analisi Matematica 1

Padova, 8 luglio 2024

Si svolgano i seguenti esercizi facendo attenzione a **giustificare** le risposte.
Delle affermazioni non motivate e giustificate non si terrà conto nella valutazione.
Non è consentito l'uso di alcun dispositivo elettronico, di appunti o di libri.

1. Si studino i seguenti integrali impropri ($\alpha, \beta > 0$):

$$\int_0^1 \frac{1}{\log x} dx, \quad \int_0^1 \frac{(3 - 2x - x^2)^\alpha}{|\log x|^\beta} dx.$$

2. Si studi in dettaglio la funzione f definita dall'espressione

$$f(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \frac{1}{1-x}.$$

Dopodiché si dica, al variare di $\lambda \in \mathbf{R}$, quante soluzioni ha l'equazione

$$f(x) = \lambda.$$

3. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{x^3 + x + 1}{x^2 + 1} \operatorname{arctg} x dx.$$

4. Si calcoli il seguente limite al variare di $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x+x^2+x^3} + \sqrt{1 - \alpha x - \alpha x^2} - 2}{\sqrt{1 + x^{3/2}} + \cos x^{3/4} - 2}.$$

Soluzioni

1. Il problema, in entrambi gli integrali, è dato dal fatto che il denominatore si annulla in 1. Poiché

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\log x}{x-1} = 1$$

si ha che il primo integrale diverge (negativamente) poiché ha lo stesso carattere di

$$\int_0^1 \frac{1}{x-1} dx.$$

Per quanto riguarda il secondo, poiché

$$3 - 2x - x^2 = (1-x)(3+x)$$

si ha che l'integranda nel secondo integrale è asintotica nel punto 1 a

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{(3-2x-x^2)^\alpha}{|\log x|^\beta}}{\frac{1}{(1-x)^{\beta-\alpha}}} = 1$$

e quindi converge se e solo se $\beta - \alpha < 1$.

2. La funzione non è definita per $x = 1$, quindi il dominio naturale (per ora) è $\mathbf{R} \setminus \{1\}$.

Svolgendo i limiti agli estremi del dominio si ottiene

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= +\infty \end{aligned}$$

e per questo motivo si può estendere la funzione f ad una funzione definita anche nel punto 1 definendola uguale a 0. Chiameremo per semplicità ancora f la nuova funzione che, a questo punto, ha come dominio $\mathbf{R}$.

Vediamo di studiarne la derivata prima. Si ha

$$f'(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \frac{1}{(1-x)^2} \left[1 + \frac{1}{1-x} \right] = e^{\frac{1}{1-x}} \frac{1}{(1-x)^2} \left[\frac{2-x}{1-x} \right].$$

Per studiare il segno di f' è sufficiente studiare il segno della quantità $(2-x)/(1-x)$ visto che $e^{\frac{1}{1-x}} \frac{1}{(1-x)^2}$ è positivo per ogni $x \neq 2$:

$$\frac{2-x}{1-x} \begin{cases} = 0 & \text{per } x = 2 \\ < 0 & \text{per } x \in (1, 2) \\ > 0 & \text{per } x \in (-\infty, 1) \cup (2, +\infty) \end{cases}$$

per cui

$$f'(x) \begin{cases} = 0 & \text{per } x = 2 \\ < 0 & \text{per } x \in (1, 2) \\ > 0 & \text{per } x \in (-\infty, 1) \cup (2, +\infty). \end{cases}$$

Si osservi che

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 0.$$

Studiamo la derivata seconda. Scrivendo

$$f'(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \frac{2-x}{(1-x)^3}$$

si ha

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^{\frac{1}{1-x}} \frac{2-x}{(1-x)^5} + e^{\frac{1}{1-x}} \frac{3(2-x)(1-x)^2 - (1-x)^3}{(1-x)^6} = \\ &= e^{\frac{1}{1-x}} \left[\frac{2-x}{(1-x)^5} + \frac{3(2-x)(1-x) - (1-x)^2}{(1-x)^5} \right] = \\ &= e^{\frac{1}{1-x}} \left[\frac{2-x+2x^2-7x+5}{(1-x)^5} \right] = \\ &= e^{\frac{1}{1-x}} \frac{1}{(1-x)^4} \left[\frac{2x^2-8x+7}{1-x} \right] \end{aligned}$$

per cui studiare il segno della derivata seconda si riduce a studiare il segno di $(2x^2 - 7x + 5)/(1-x)$. Si ha che

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8x + 7 > 0 &\iff x \in (-\infty, 1) \cup \left(1, 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(2 + \frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right), \\ 1 - x > 0 &\iff x \in (-\infty, 1) \end{aligned}$$

per cui

$$f''(x) \begin{cases} = 0 & \text{per } x = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \vee x = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ < 0 & \text{per } x \in \left(1, 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(2 + \frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right) \\ > 0 & \text{per } x \in (-\infty, 1) \cup \left(2 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{cases}$$

Questi dati forniscono informazioni riguardo la convessità della funzione f .

Il punto $x = 2$, stazionario, è punto di minimo locale, visto che in un intorno di 2 $f'' > 0$. La stessa conclusione si trae dallo studio del segno di f' , essendo $x = 2$ l'unico punto stazionario, f negativa per $x > 1$, decrescente per $x \in (1, 2)$, crescente

per $x > 2$. Inoltre f è positiva per $x < 1$, quindi il punto $x = 2$ è anche di minimo assoluto. Il minimo assoluto è

$$f(2) = -\frac{1}{e}.$$

La funzione non ammette massimo (assoluto) poiché è illimitata. Il grafico è riportato nella figura che segue:

Il numero di soluzioni all'equazione richiesta $f = \lambda$ è:

$$\begin{aligned} 0 & \text{ per } \lambda < -\frac{1}{e}, \\ 1 & \text{ per } \lambda = -\frac{1}{e}, \\ 2 & \text{ per } -\frac{1}{e} < \lambda < 0, \\ 1 & \text{ per } \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

3. Prima di tutto dividiamo il polinomio a numeratore per il polinomio a denominatore, ottenendo

$$x^3 + x + 1 = (x^2 + 1)x + 1.$$

Di conseguenza

$$\int \frac{x^3 + x + 1}{x^2 + 1} \operatorname{arctg} x \, dx = \int x \operatorname{arctg} x \, dx + \int \frac{1}{x^2 + 1} \operatorname{arctg} x \, dx.$$

Integriamo il primo (per parti):

$$\begin{aligned}\int x \operatorname{arctg} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{1+x^2} \, dx = \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) \, dx = \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} (x - \operatorname{arctg} x) + c_1.\end{aligned}$$

con $c_1 \in \mathbf{R}$. Il secondo è immediato e risulta

$$\int \frac{1}{x^2+1} \operatorname{arctg} x \, dx = \frac{1}{2} (\operatorname{arctg} x)^2 + c_2 \quad (c_2 \in \mathbf{R}).$$

Sommando si conclude.

4. Lo sviluppo di Taylor in 0 al terzo ordine di $f(x) = e^{x+x^2+x^3}$ è

$$\begin{aligned}f(x) &= 1 + x + x^2 + x^3 + \frac{1}{2}(x + x^2 + x^3)^2 + \frac{1}{6}(x + x^2 + x^3)^3 + o((x + x^2 + x^3)^3) = \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + \frac{1}{2}(x^2 + 2x^3) + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) = \\ &= 1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{13}{6}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

Lo sviluppo di Taylor in 0 al terzo ordine di $g(x) = \sqrt{1 - \alpha x - \alpha x^2}$ è (supponendo $\alpha \neq 0$)

$$\begin{aligned}g(x) &= 1 + \frac{1}{2}(-\alpha x - \alpha x^2) - \frac{1}{8}(-\alpha x - \alpha x^2)^2 + \frac{1}{16}(-\alpha x - \alpha x^2)^3 + o(x^3) = \\ &= 1 - \frac{\alpha}{2}x - \frac{\alpha}{2}x^2 - \frac{\alpha^2}{8}x^2 - \frac{\alpha^2}{4}x^3 - \frac{1}{16}\alpha^3x^3 + o(x^3)\end{aligned}$$

per cui a numeratore otteniamo

$$\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)x + \left(\frac{3}{2} - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha^2}{8}\right)x^2 + \left(\frac{13}{6} - \frac{\alpha^2}{4} - \frac{1}{16}\alpha^3\right)x^3 + o(x^3).$$

Per quanto riguarda il denominatore si ha

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x^3/2} &= 1 + \frac{1}{2}x^{3/2} - \frac{1}{8}x^3 + o(x^3) \\ \cos x^{3/4} &= 1 - \frac{x^{3/2}}{2} + \frac{x^3}{12} + o(x^3)\end{aligned}$$

da cui il denominatore si riduce a

$$-\frac{1}{8}x^3 + \frac{x^3}{12} + o(x^3) = -\frac{1}{24}x^3 + o(x^3).$$

Raccogliendo opportunamente e passando al limite facendo attenzione agli o piccoli si ottiene che il valore del limite quindi è:

$$\frac{\frac{13}{6} - 1 - \frac{1}{2}}{-\frac{1}{24}} = -16 \quad \text{per } \alpha = 2,$$

mentre

$$\begin{aligned} \text{per } \alpha \neq 2: \quad & \text{se } 1 - \frac{\alpha}{2} > 0 \ (\alpha < 2) \text{ il limite è } -\infty, \\ & \text{se } 1 - \frac{\alpha}{2} < 0 \ (\alpha > 2) \text{ il limite è } +\infty, \end{aligned}$$

infatti in questo caso il numeratore è

$$\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)x + \left(\frac{3}{2} - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha^2}{8}\right)x^2 + \left(\frac{13}{6} - \frac{\alpha^2}{4} - \frac{1}{16}\alpha^3\right)x^3 + o(x^3) = \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)x + o(x),$$

e il limite si riduce a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)x + o(x)}{-\frac{1}{24}x^3 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \left(1 - \frac{\alpha}{2} + \frac{o(x)}{x}\right)}{-x^3 \left(\frac{1}{24} + \frac{o(x^3)}{x^3}\right)} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \frac{1 - \frac{\alpha}{2} + \frac{o(x)}{x}}{\frac{1}{24} + \frac{o(x^3)}{x^3}}.$$