- ① D_1 : dominio interno al cilindro $x^2 + y^2 - 2x = 0$, tra il piano $z = 0$ e la superficie $z = x + 1$;
 ② D_2 : dominio del I ottante al di sotto della superficie $z = 1 - x^2 - y^2$.

$$\left[\textcircled{1} \frac{14128}{1575}; \textcircled{2} \frac{1}{240} \right]$$

- 25 Calcolare i seguenti integrali tripli:

$$\textcircled{1} \iiint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz; \quad \textcircled{2} \iiint_{D_2} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz;$$

- ① D_1 : interno della superficie sferica di equazione $x^2 + y^2 + z^2 - y = 0$;
 ② D_2 : interno della superficie sferica di equazione $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, al di sopra del piano $z = 0$.

$$\left[\textcircled{1} \frac{\pi}{10}; \textcircled{2} \frac{128}{15}\pi \right]$$

- 26 Calcolare la massa e le coordinate del baricentro dei seguenti solidi:

- ① parallelepipedo $\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 3\}$, avente densità di massa $\delta(x, y, z) = x + y + z$;
 ② interno della superficie sferica di equazione $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, al di sopra del piano $z = 0$, sapendo che la densità nel punto P è uguale alla distanza di P dall'origine.

$$\left[\textcircled{1} M = 18, x_B = \frac{19}{36}, y_B = \frac{10}{9}, z_B = \frac{7}{4}; \textcircled{2} M = 8\pi, x_B = y_B = 0, z_B = \frac{4}{5} \right]$$

4

Curve e superfici

4.1 Esercizi svolti e richiami di teoria

4.1.1 Curve

Esercizio 4.1 — Rappresentazione parametrica

Scrivere una rappresentazione parametrica delle seguenti curve:

- ① $\mathcal{L}_1$: segmento del piano xy , da $A(3, -1)$ a $B(-1, 9)$;
 ② $\mathcal{L}_2$: segmento del piano xy , da $B(-1, 9)$ a $A(3, -1)$;
 ③ $\mathcal{L}_3$: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$, percorsa in senso orario a partire da $(5, 1)$;
 ④ $\mathcal{L}_4$: $(bx)^2 + (ay)^2 = (ab)^2$, con $a > 0, b > 0$, percorsa in senso antiorario a partire da $(0, b)$;
 ⑤ $\mathcal{L}_5$: ramo con $x > 0$ dell'iperbole $x^2 - y^2 = 1$, percorso nel verso delle y crescenti;
 ⑥ $\mathcal{L}_6$: segmento da $A(1, 2, 5)$ a $B(3, 1, 0)$.

Soluzione

Data una curva $\mathcal{L}$, la scrittura

$$\mathcal{L}: \mathbf{r}(t) = [x(t)]\mathbf{i} + [y(t)]\mathbf{j} + [z(t)]\mathbf{k}, \quad t \in [a, b]$$

prende il nome di *rappresentazione parametrica* di $\mathcal{L}$, in essa il vettore $\mathbf{r}(t)$ che dall'origine indica il punto $P(x(t), y(t), z(t))$ della curva, corrispondente al valore t del parametro è scritto a partire dalle sue componenti $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$:

notiamo che una curva può avere infinite rappresentazioni parametriche, da queste dipende anche il verso di percorrenza, ossia la direzione con cui, al crescere del parametro t , il punto $P(x(t), y(t), z(t))$ si muove lungo la curva stessa.

- ① $\mathcal{L}_1$ è il segmento che unisce $A(3, -1)$ e $B(-1, 9)$, quindi, detto $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = -4\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$, i suoi punti appartengono alla retta

$$\mathbf{r} : \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

e corrispondono ai valori di t compresi tra $t = 0$ (il punto A) e $t = 1$ (il punto B); in definitiva

$$\mathcal{L}_1 : \mathbf{r}(t) = [3 - 4t]\mathbf{i} + [-1 + 10t]\mathbf{j}, \quad t \in [0, 1].$$

- ② $\mathcal{L}_2$ è la stessa curva del punto precedente, cambia il verso di percorrenza; per ottenere la sua rappresentazione parametrica possiamo ragionare in modo analogo al punto ①, ma possiamo anche usare la seguente tecnica, più generale: se una curva ha la rappresentazione

$$\mathbf{r}(t) = [x(t)]\mathbf{i} + [y(t)]\mathbf{j} + [z(t)]\mathbf{k}, \quad t \in [a, b],$$

la stessa curva, parametrizzata con verso di percorrenza opposto, è

$$\mathbf{r}(t) = [x(b + a - t)]\mathbf{i} + [y(b + a - t)]\mathbf{j} + [z(b + a - t)]\mathbf{k}, \quad t \in [a, b]$$

(ove naturalmente $x(\cdot)$, $y(\cdot)$ e $z(\cdot)$ sono le stesse funzioni della precedente rappresentazione). Nel nostro caso, allora, la rappresentazione di $\mathcal{L}_2$ è:

$$\mathcal{L}_2 : \mathbf{r}(t) = [3 - 4(1 - t)]\mathbf{i} + [-1 + 10(1 - t)]\mathbf{j}, \quad t \in [0, 1],$$

e cioè

$$\mathcal{L}_2 : \mathbf{r}(t) = [-1 + 4t]\mathbf{i} + [9 - 10t]\mathbf{j}, \quad t \in [0, 1].$$

- ③ L'equazione $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ è l'equazione di una circonferenza, sappiamo che i punti della generica circonferenza avente centro in (x_0, y_0) e raggio R possono essere descritti dalle equazioni

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cos \alpha \\ y = y_0 + R \sin \alpha \end{cases}$$

se $\alpha \in [0, 2\pi]$ la circonferenza verrà percorsa in senso antiorario a partire dal punto di ascissa massima, se invece $\alpha \in [-\pi, \pi]$ la circonferenza verrà percorsa, sempre in senso antiorario, a partire dal punto di ascissa minima. Nel nostro caso $(x_0, y_0) = (2, 1)$ e $R = 3$, inoltre a partire dal punto $(5, 1)$ (ossia dal punto di ascissa massima) dobbiamo percorrere la circonferenza in

senso orario; possiamo, come nel punto precedente, sostituire α con $2\pi - \alpha$ nella parametrizzazione

$$\begin{cases} x = 2 + 3 \cos(2\pi - \alpha) \\ y = 1 + 3 \sin(2\pi - \alpha) \end{cases}$$

e poiché $\cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$ e $\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha$ otteniamo

$$\mathcal{L}_3 : \mathbf{r}(\alpha) = [2 + 3 \cos \alpha]\mathbf{i} + [1 - 3 \sin \alpha]\mathbf{j}, \quad \alpha \in [0, 2\pi].$$

In alternativa, avremmo potuto osservare che sarebbe stato sufficiente cambiare il segno a $\sin \alpha$.

- ④ L'equazione $(bx)^2 + (ay)^2 = (ab)^2$ (con $a > 0, b > 0$) si può riscrivere come

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

e questa è l'equazione di un'ellisse con centro nell'origine e assi orizzontale e verticale uguali a a e b rispettivamente:

la parametrizzazione di questa ellisse è in genere

$$\begin{cases} x = a \cos \alpha \\ y = b \sin \alpha \end{cases}$$

e α ha gli stessi limiti visti più sopra per la circonferenza. Nel nostro caso, dobbiamo percorrere l'ellisse in senso antiorario, però a partire dal punto $(0, b)$, possiamo allora sommare $\frac{\pi}{2}$ a α , ottenendo

$$\mathcal{L}_4 : \mathbf{r}(\alpha) = \left[a \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) \right] \mathbf{i} + \left[b \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right) \right] \mathbf{j}, \quad \alpha \in [0, 2\pi];$$

oppure, osservando che $\cos(\alpha + \frac{\pi}{2}) = -\sin \alpha$ e $\sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) = \cos \alpha$,

$$\mathcal{L}_4 : \mathbf{r}(\vartheta) = [-a \sin \alpha] \mathbf{i} + [b \cos \alpha] \mathbf{j}, \quad \alpha \in [0, 2\pi].$$

- ⑤ È sufficiente esprimere x in funzione di y : poiché $x > 0$ abbiamo $x = \sqrt{1 + y^2}$, scegliamo allora y come parametro (cioè $t = y$) e, poiché y può assumere qualsiasi valore reale, otteniamo

$$\mathcal{L}_5 : \mathbf{r}(t) = [\sqrt{1 + t^2}] \mathbf{i} + t \mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

- ⑥ La procedura da seguire è la stessa del punto ①, occorre solo considerare anche le componenti in z : poiché $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ abbiamo

$$\mathcal{L}_6: \mathbf{r}(t) = [1 + 2t]\mathbf{i} + [2 - t]\mathbf{j} + [5 - 5t]\mathbf{k}, \quad t \in [0, 1].$$

Esercizio 4.2 — Nomenclatura

Stabilire se ciascuna delle seguenti curve è chiusa, semplice, regolare:

- ① $\mathcal{L}_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t \in [0, 4];$
 ② $\mathcal{L}_2: \mathbf{r}(t) = [\cos t]\mathbf{i} + [\pi - |t|]\mathbf{j} + [\sin t]\mathbf{k}, \quad t \in [-\pi, \pi];$
 ③ $\mathcal{L}_3: \mathbf{r}(t) = [\cos t]\mathbf{i} + [\sin 2t]\mathbf{j}, \quad t \in [0, 2\pi];$
 ④ $\mathcal{L}_4: \mathbf{r}(t) = [t^2 \operatorname{Sh} t]\mathbf{i} + [e^{-t^2}]\mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R};$
 ⑤ $\mathcal{L}_5: \mathbf{r}(t) = [\cos t]\mathbf{i} + [\sin t]\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t \in [0, 2\pi]$ (elica cilindrica).

Soluzione

Una curva

$$\mathcal{L}: \mathbf{r}(t) = [x(t)]\mathbf{i} + [y(t)]\mathbf{j} + [z(t)]\mathbf{k}, \quad t \in [a, b]$$

si dice *chiusa* se il punto iniziale e il punto finale coincidono: $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$;
 si dice *semplice* se non passa più volte per uno stesso punto (fatta eccezione, eventualmente, per il punto iniziale e finale nel caso di una curva chiusa):

$$\mathbf{r}(t_1) \neq \mathbf{r}(t_2), \quad \forall t_1, t_2 \in (a, b);$$

si dice *regolare* se $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$ sono derivabili e

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 \neq 0, \quad \forall t \in (a, b).$$

Controllare se una curva sia chiusa e regolare è immediato, controllare che sia semplice può essere più difficile.

- ① Osserviamo che

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{r}(4) = 4\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 16\mathbf{k},$$

quindi la curva non è chiusa, inoltre

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 = 1 + 4 + 4t^2 \neq 0 \quad \forall t \in (0, 4),$$

quindi la curva è regolare; per mostrare che la curva è semplice possiamo ad esempio notare che la componente in x , ossia $x(t) = t$, è una funzione *strettamente crescente* del parametro t , pertanto due valori diversi di t non possono corrispondere a punti aventi la stessa ascissa, e quindi non possono corrispondere allo stesso punto.

- ② Osserviamo che

$$\mathbf{r}(-\pi) = -\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(\pi) = -\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k},$$

quindi $\mathcal{L}_2$ è chiusa; $\mathcal{L}_2$ non è regolare, infatti $y(t) = \pi - |t|$ non è derivabile in $(-\pi, \pi)$, poiché però l'unico punto di non derivabilità corrisponde a $t = 0$, per $t \neq 0$ abbiamo

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 = \sin^2 t + 1 + \cos^2 t = 2 \quad \forall t \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi);$$

poiché l'intervallo in cui $\mathcal{L}_2$ non è regolare è stato scomposto in due intervalli ove invece essa è regolare, si dice che $\mathcal{L}_2$ è *regolare a tratti*. Per controllare se $\mathcal{L}_2$ è semplice, cominciamo col vedere se una delle sue componenti può assumere lo stesso valore con diversi valori di t , in corrispondenza dei valori trovati controlleremo poi le componenti restanti; $\cos(t_1) = \cos(t_2)$ se e solo se $t_2 = -t_1$; pensiamo allora che $t_1 = \gamma$ sia positivo, o meglio $0 < \gamma < \pi$ (γ dev'essere diverso da π perché $\gamma = \pi$ indica il punto finale, e dev'essere diverso da 0, perché altrimenti $t_2 = -t_1 = 0$), ponendo $t_2 = -\gamma$ nella rappresentazione di $\mathcal{L}_2$ troviamo

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(\gamma) &= [\cos \gamma]\mathbf{i} + [\pi - \gamma]\mathbf{j} + [\sin \gamma]\mathbf{k} \\ \mathbf{r}(-\gamma) &= [\cos(-\gamma)]\mathbf{i} + [\pi - |-\gamma|]\mathbf{j} + [\sin(-\gamma)]\mathbf{k} \\ &= [\cos \gamma]\mathbf{i} + [\pi - \gamma]\mathbf{j} + [-\sin \gamma]\mathbf{k} \end{aligned}$$

la prima e la seconda componente sono uguali, mentre per ogni $\gamma \in (0, \pi)$ abbiamo $\sin(\gamma) \neq -\sin(\gamma)$, quindi $\mathcal{L}_2$ è semplice.

- ③ Osserviamo che $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}(2\pi) = \mathbf{i} + 0\mathbf{j}$, quindi la curva è chiusa, inoltre $\forall t \in (0, 2\pi)$

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 = \sin^2 t + 4\cos^2(2t) = 4 - 15\sin^2 t + 16\sin^4 t > 0,$$

quindi $\mathcal{L}_3$ è regolare. Per controllare se $\mathcal{L}_3$ è semplice, serviamoci della stessa tecnica del punto precedente, poiché $t \in (0, 2\pi)$, $\cos(t_1) = \cos(t_2)$ se e solo se $t_2 = 2\pi - t_1$, quindi ponendo rispettivamente $t = \gamma$ e $t = 2\pi - \gamma$ troviamo (osservando che $\sin(4\pi - 2\gamma) = -\sin 2\gamma$)

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(\gamma) &= [\cos \gamma]\mathbf{i} + [\sin 2\gamma]\mathbf{j} \\ \mathbf{r}(2\pi - \gamma) &= [\cos(2\pi - \gamma)]\mathbf{i} + [\sin 2(2\pi - \gamma)]\mathbf{j} \\ &= [\cos \gamma]\mathbf{i} + [-\sin 2\gamma]\mathbf{j} \end{aligned}$$

L'equazione $\sin(2\gamma) = -\sin(2\gamma)$ implica $\sin(2\gamma) = 0$ e per $\gamma \in (0, 2\pi)$ ammette come soluzioni $\gamma = \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, ricordando che $t_1 = \gamma, t_2 = 2\pi - \gamma$ abbiamo

$$\gamma = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{\pi}{2} \\ t_2 = \frac{3\pi}{2} \end{cases}, \quad \gamma = \pi \Rightarrow \begin{cases} t_1 = \pi \\ t_2 = \pi \end{cases}, \quad \gamma = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{3\pi}{2} \\ t_2 = \frac{\pi}{2} \end{cases};$$

nel primo caso leggiamo che $\mathbf{r}(\frac{\pi}{2}) = \mathbf{r}(\frac{3}{2}\pi)$, nel secondo caso $t_1 = t_2$, quindi non corrisponde ad alcun punto doppio, il terzo caso corrisponde al primo, concludendo, la curva ha un punto doppio: $\mathbf{r}(\frac{\pi}{2}) = \mathbf{r}(\frac{3}{2}\pi) = \mathbf{0}$. Il grafico di $\mathcal{L}_3$ è il seguente:

④ Poiché t varia in $\mathbb{R}$, la curva non è chiusa, inoltre

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 = (2t\text{Sh } t + t^2\text{Ch } t)^2 + (-2te^{-t^2})^2,$$

ossia, raccogliendo t^2 ,

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 = t^2 [4e^{-2t^2} + (2\text{Sh } t + t\text{Ch } t)^2] = 0 \Leftrightarrow t = 0;$$

ne segue che $\mathcal{L}_4$ è regolare a tratti, su $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Inoltre $\mathcal{L}_4$ è semplice, infatti $e^{-t_1^2} = e^{-t_2^2}$ se e solo se, posto $t_1 = \tau$, $t_2 = -\tau$, ma $(-\tau)^2\text{Sh } (-\tau) = -\tau^2\text{Sh } \tau$ e

$$(-\tau)^2\text{Sh } (-\tau) = -\tau^2\text{Sh } \tau \Rightarrow \tau = 0.$$

⑤ Osserviamo che $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i}$ mentre $\mathbf{r}(2\pi) = \mathbf{i} + 2\pi\mathbf{k}$, quindi $\mathcal{L}_5$ non è chiusa, inoltre

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 = \sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 2 \quad \forall t \in (0, 2\pi),$$

quindi $\mathcal{L}_5$ è regolare. Infine, la sua componente rispetto a z : $z(t) = t$ è monotona crescente, quindi $\mathcal{L}_5$ è semplice.

Esercizio 4.3 — Curve piane — Rappresentazione cartesiana

Scrivere una rappresentazione parametrica delle seguenti curve:

① $\mathcal{L}_1$: ramo di parabola $y = x^2 - 1$, $x \in [-2, 4]$;

② $\mathcal{L}_2$: semicirconferenza $y = \sqrt{1 - x^2}$, $x \in [-1, 1]$;

date le seguenti curve in forma parametrica, scriverne (ove possibile) la rappresentazione cartesiana, altrimenti spiegare perché non è possibile:

③ $\mathcal{L}_3$: $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + [\cos 2t]\mathbf{j}$, $t \in [0, 2\pi]$;

④ $\mathcal{L}_4$: $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + [\sin 2t]\mathbf{j}$, $t \in [-2\pi, 2\pi]$;

⑤ $\mathcal{L}_5$: $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + [\cos 2t]\mathbf{j}$, $t \in [0, \pi]$;

⑥ $\mathcal{L}_6$: $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + [\sin 2t]\mathbf{j}$, $t \in [-\pi, \pi]$.

Soluzione

Una curva piana è detta in forma cartesiana se è descritta come $y = f(x)$, con $x \in [a, b]$, ovviamente una curva in forma cartesiana può essere sempre riscritta in forma parametrica, ponendo $x(t) = t$ e $y(t) = f(t)$. Viceversa, una curva in forma parametrica non sempre può essere scritta in forma cartesiana, dev'essere possibile esprimere $y(t)$ in funzione di $x(t)$.

① ② Ponendo $x = t$, abbiamo immediatamente:

$$\mathcal{L}_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + [t^2 - 1]\mathbf{j}, \quad t \in [-2, 4];$$

$$\mathcal{L}_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + [\sqrt{1 - t^2}]\mathbf{j}, \quad t \in [-1, 1].$$

③ Esprimendo t in funzione di x , ricaviamo

$$\begin{cases} x = t^3 \\ t \in [0, 2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \sqrt[3]{x} \\ x \in [0, 8\pi^3] \end{cases};$$

pertanto $y(t) = \cos 2t$ diventa $y(t(x)) = f(x) = \cos 2\sqrt[3]{x}$, e l'espressione cartesiana cercata è

$$\mathcal{L}_3: y = \cos 2\sqrt[3]{x}, \quad x \in [0, 8\pi^3].$$

④ Ci troviamo nella stessa situazione del punto precedente, l'unica differenza consiste nel campo di variazione della x : da $x = t^3$ con $t \in [-2\pi, 2\pi]$ troviamo $t = \sqrt[3]{x}$ con $x \in [-8\pi^3, 8\pi^3]$, pertanto l'espressione cartesiana è

$$\mathcal{L}_4: y = \sin 2\sqrt[3]{x}, \quad x \in [-8\pi^3, 8\pi^3].$$

- ⑤ Anche in questo caso possiamo seguire la strada degli esempi precedenti: da $x = t^2$ con $t \in [0, \pi]$ ricaviamo $t = \sqrt{x}$ con $x \in [0, \pi^2]$, pertanto l'espressione cartesiana è

$$\mathcal{L}_5 : y = \cos 2\sqrt{x}, \quad x \in [0, \pi^2].$$

- ⑥ In questo caso, l'espressione $x = t^2$ con $t \in [-\pi, \pi]$ non è invertibile, e quindi non v'è modo di esprimere la curva $\mathcal{L}_6$ in forma cartesiana. In effetti il suo grafico non è il grafico di alcuna funzione:

Esercizio 4.4 — Curve piane — Rappresentazione polare

Scrivere una rappresentazione parametrica delle seguenti curve:

- ① $\mathcal{L}_1 : \rho = k\vartheta$ $\vartheta \in [0, 4\pi]$, (spirale di Archimede);
 ② $\mathcal{L}_2 : \rho = \vartheta(2\pi - \vartheta)$, $\vartheta \in [0, 2\pi]$;

date le seguenti curve in forma parametrica, scriverne (ove possibile) la rappresentazione polare, altrimenti spiegare perché non è possibile:

- ③ $\mathcal{L}_3 : \mathbf{r}(t) = [2 \cos^2 t] \mathbf{i} + [\sin 2t] \mathbf{j}$, $t \in [0, \pi]$;
 ④ $\mathcal{L}_4 : \mathbf{r}(t) = [t\sqrt{1-t^2}] \mathbf{i} + [t^2] \mathbf{j}$, $t \in [0, 1]$;
 ⑤ $\mathcal{L}_5 : \mathbf{r}(t) = [\cos^3 t] \mathbf{i} + [\sin^3 t] \mathbf{j}$, $t \in [0, 2\pi]$ (astroide).

Soluzione

Si dice rappresentazione *polare* di una curva $\mathcal{L}$ una scrittura della forma $\rho = f(\vartheta)$ ($\vartheta \in [\alpha, \beta]$), ove ρ e ϑ sono le coordinate polari del piano. Il legame tra coordinate cartesiane e polari $x = \rho \cos \vartheta$, $y = \rho \sin \vartheta$, consente, nel caso di una curva in forma polare, di scriverne immediatamente la forma parametrica:

$$\begin{aligned} \rho &= f(\vartheta), \\ \Downarrow \\ \mathbf{r}(\vartheta) &= [f(\vartheta) \cos \vartheta] \mathbf{i} + [f(\vartheta) \sin \vartheta] \mathbf{j}, \quad \vartheta \in [\alpha, \beta]. \end{aligned}$$

Invece, data una curva in forma parametrica, è possibile scriverne la forma polare unicamente se le espressioni $x(t)$ e $y(t)$ si possono fattorizzare come il prodotto della stessa funzione $f(t)$ rispettivamente per $\cos t$ e $\sin t$.

- ① Ponendo $f(\vartheta) = k\vartheta$, abbiamo immediatamente:

$$\mathcal{L}_1 : \mathbf{r}(\vartheta) = [k\vartheta \cos \vartheta] \mathbf{i} + [k\vartheta \sin \vartheta] \mathbf{j}, \quad \vartheta \in [0, 4\pi].$$

- ② Ponendo $f(\vartheta) = \vartheta(2\pi - \vartheta)$, abbiamo immediatamente:

$$\mathcal{L}_2 : \mathbf{r}(\vartheta) = [\vartheta(2\pi - \vartheta) \cos \vartheta] \mathbf{i} + [\vartheta(2\pi - \vartheta) \sin \vartheta] \mathbf{j}, \quad \vartheta \in [0, 2\pi].$$

- ③ La curva $\mathcal{L}_3$ è esprimibile in forma polare se è possibile scrivere le sue componenti nella forma

$$[f(\vartheta) \cos \vartheta], \quad [f(\vartheta) \sin \vartheta];$$

poiché $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$, raccogliendo $2 \cos t$ possiamo scrivere:

$$[2 \cos^2 t] \mathbf{i} + [\sin 2t] \mathbf{j} = 2 \cos t [\cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}],$$

e quindi l'equazione polare di $\mathcal{L}_3$ è $\rho = 2 \cos t$, con $t \in [0, \pi]$.

- ④ $\mathcal{L}_4$ è esprimibile in coordinate polari, se infatti raccogliamo t nella sua espressione ricaviamo

$$[t\sqrt{1-t^2}] \mathbf{i} + [t^2] \mathbf{j} = t [\sqrt{1-t^2} \mathbf{i} + t \mathbf{j}],$$

ponendo $t = \sin \vartheta$ e quindi $\sqrt{1-t^2} = \cos \vartheta$, se $t \in [0, 1]$ allora $\vartheta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ e quindi

$$\mathcal{L}_4 : \mathbf{r}(\vartheta) = \sin \vartheta [\cos \vartheta \mathbf{i} + \sin \vartheta \mathbf{j}], \quad \vartheta \in [0, \frac{\pi}{2}];$$

e l'equazione polare cercata è $\rho = \sin \vartheta$, con $\vartheta \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

- ⑤ La curva $\mathcal{L}_5$ non è immediatamente esprimibile in forma polare: infatti raccogliendo $\cos t$ nella prima componente e $\sin t$ nella seconda non rimane la stessa funzione. Tuttavia, il grafico di $\mathcal{L}_5$ è il seguente:

e, sebbene sia evidente che ad ogni $\vartheta \in [0, 2\pi]$ corrisponda un solo valore di ρ , questo legame non è di immediata scrittura.

Esercizio 4.5 — Curve intersezione di due superfici

Scrivere una rappresentazione parametrica delle seguenti curve:

- ① $\mathcal{L}_1$: intersezione del piano $5x - 2y + z = 4$ con il cilindro $x^2 + y^2 = 1$;
 ② $\mathcal{L}_2$: intersezione del piano $2x - z = 3$ con la superficie $z^3 - 2x^2 - y^3 + xz = 0$;

- ③ $\mathcal{L}_3$: intersezione del cilindro $x^2 + y^2 - x = 0$ con la sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (curva di Viviani).

Soluzione

Per trovare una rappresentazione parametrica di una curva intersezione di due superfici, può essere utile incominciare a identificare un parametro, del quale servirsi poi per descrivere la curva.

- ① L'intersezione del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con il piano $5x - 2y + z = 4$ è un'ellisse, i suoi punti sono in corrispondenza biunivoca con i punti della circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ nel piano xy , parametrizziamo allora questa circonferenza con $(\cos \vartheta, \sin \vartheta)$, al punto sulla circonferenza, di coordinate $x = \cos \vartheta, y = \sin \vartheta$ corrisponde sul piano (e quindi sull'intersezione di piano e cilindro) il punto di quota $z = 4 - 5x + 2y = 4 - 5 \cos \vartheta + 2 \sin \vartheta$, pertanto un'espressione parametrica di $\mathcal{L}_1$ è

$$\mathcal{L}_1: \mathbf{r}(\vartheta) = [\cos \vartheta] \mathbf{i} + [\sin \vartheta] \mathbf{j} + [4 - 5 \cos \vartheta + 2 \sin \vartheta] \mathbf{k}, \quad \vartheta \in [0, 2\pi].$$

- ② Anche in questo caso, iniziamo a identificare un possibile parametro: dall'equazione del piano possiamo esprimere z in funzione di x : $z = 2x - 3$, poiché poi l'equazione della superficie permette di esprimere tutto in funzione di y : $y^3 = z^3 - x^2 + xz$ ossia $y = \sqrt[3]{z^3 - x^2 + xz}$, possiamo porre direttamente $x = t$, con $t \in \mathbb{R}$ e scrivere

$$\mathcal{L}_2: \mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \left[\sqrt[3]{(2t-3)^3 - t^2 + t(2t-3)} \right] \mathbf{j} + [2t-3] \mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

- ③ L'intersezione del cilindro, avente asse verticale in corrispondenza del punto $(\frac{1}{2}, 0)$ e raggio $\frac{1}{2}$, con la sfera di raggio unitario centrata nell'origine è rappresentata da una curva "a otto" che si depona per metà sull'emisfero superiore e per l'altra metà sull'emisfero inferiore.

Per descriverla tutta, è necessario effettuare due interi giri sulla circonferenza di base del cilindro, se per questa circonferenza usiamo la parametrizzazione usuale:

$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \alpha, \quad y = \frac{1}{2} \sin \alpha$$

possiamo porre $\alpha \in [0, 4\pi]$: per $\alpha = 0, 2\pi, 4\pi$ ci troviamo in corrispondenza dell'incrocio, stabiliamo allora che se $\alpha \in [0, 2\pi]$ percorriamo l'anello superiore, mentre se $\alpha \in [2\pi, 4\pi]$ percorriamo l'anello inferiore. Osserviamo che, poiché la metà superiore della sfera ha equazione $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ mentre la metà inferiore ha equazione $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$, la parametrizzazione di $\mathcal{L}_3$ sarà allora

$$\mathcal{L}_3: \mathbf{r}(\alpha) = \begin{cases} \left[\frac{1+\cos \alpha}{2} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\sin \alpha}{2} \right] \mathbf{j} + \left[\sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}} \right] \mathbf{k} & \alpha \in [0, 2\pi] \\ \left[\frac{1+\cos \alpha}{2} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\sin \alpha}{2} \right] \mathbf{j} + \left[-\sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}} \right] \mathbf{k} & \alpha \in (2\pi, 4\pi] \end{cases}$$

grazie alle formule di bisezione^a, possiamo allora scrivere un'espressione più agevole:

$$\mathcal{L}_3: \mathbf{r}(\alpha) = \left[\frac{1+\cos \alpha}{2} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{\sin \alpha}{2} \right] \mathbf{j} + \left[\sin \frac{\alpha}{2} \right] \mathbf{k}, \quad \alpha \in [0, 4\pi].$$

Esercizio 4.6 — Vettore tangente a un curva

Scrivere l'equazione della retta tangente alle curve qui sotto elencate, nel punto indicato:

- ① $\mathcal{L}_1: \mathbf{r}(t) = 2e^t \mathbf{i} - [t^2 + \log t] \mathbf{j}$, $P_1(2e^2, -4 - \log 2)$;
 ② $\mathcal{L}_2: \rho = 2\vartheta$, $P_2(0, \pi)$;
 ③ $\mathcal{L}_3: \mathbf{r}(t) = [2 \cos t] \mathbf{i} + [t \sin t] \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$, $P_3\left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{12}, \frac{\pi^2}{36}\right)$.

Soluzione

Data la curva $\mathcal{L}: \mathbf{r}(t)$, il vettore tangente a essa in corrispondenza del generico valore di t è dato da^b

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t) \mathbf{i} + y'(t) \mathbf{j} + z'(t) \mathbf{k}.$$

Per scrivere l'equazione della retta tangente a $\mathcal{L}$ in un certo punto $\vec{P}$, è sufficiente conoscere il valore di $\mathbf{r}'(\bar{t})$ (ove $\bar{t}$ è il valore del parametro corrispondente al punto $\vec{P}$).

^aInfatti

$$\sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}} = \begin{cases} \sin \frac{\alpha}{2} & \alpha \in [0, 2\pi] \\ -\sin \frac{\alpha}{2} & \alpha \in (2\pi, 4\pi] \end{cases}$$

^bPossiamo allora reinterpretare la definizione di curva regolare in (a, b) : la curva $\mathcal{L}$ è regolare in (a, b) se $|\mathbf{r}'(t)| \neq 0$ per ogni $t \in (a, b)$.

- ① Il punto $P_1(2e^2, -4 - \log 2)$ corrisponde al valore $t = 2$, infatti dalla prima componente abbiamo $2e^t = 2e^2$, pertanto $t = 2$, controllando nella seconda componente:

$$-t^2 - \log t \stackrel{t=2}{=} -4 - \log 2;$$

inoltre, poiché

$$\mathbf{r}'(t) = 2e^t \mathbf{i} - \left[2t + \frac{1}{t}\right] \mathbf{j}, \quad \Rightarrow \quad \mathbf{r}'(2) = 2e^2 \mathbf{i} - \left[\frac{9}{2}\right] \mathbf{j};$$

pertanto la retta cercata è

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^2 \\ -4 - \log 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 4e^2 \\ -9 \end{bmatrix}.$$

- ② Esprimiamo innanzitutto $\mathcal{L}_2$ in forma parametrica:

$$\mathcal{L}_2 : \mathbf{r}(t) = [2\vartheta \cos \vartheta] \mathbf{i} + [2\vartheta \sin \vartheta] \mathbf{j},$$

operando come sopra, osserviamo che P_2 corrisponde a $\vartheta = \frac{\pi}{2}$; inoltre

$$\mathbf{r}'(t) = [2 \cos \vartheta - 2\vartheta \sin \vartheta] \mathbf{i} + [2 \sin \vartheta + 2\vartheta \cos \vartheta] \mathbf{j}, \quad \Rightarrow \quad \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\pi \mathbf{i} + 2\mathbf{j};$$

e pertanto la retta cercata è

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \pi \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -\pi \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- ③ Osserviamo che P_3 corrisponde a $t = \frac{\pi}{6}$. Dopodiché

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= [-2 \sin t] \mathbf{i} + [\sin t + t \cos t] \mathbf{j} + 2t \mathbf{k}, \\ \Rightarrow \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{6}\right) &= -\sqrt{3} \mathbf{i} + \left[\frac{\pi + 4\sqrt{3}}{12}\right] \mathbf{j} + \frac{\pi}{3} \mathbf{k}; \end{aligned}$$

e pertanto la retta tangente è (moltiplicando $\mathbf{r}'(\frac{\pi}{6})$ per 12)

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ \pi/12 \\ \pi^2/36 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -12\sqrt{3} \\ \pi + 4\sqrt{3} \\ 4\pi \end{bmatrix}.$$

Esercizio 4.7 — Curvatura Cerchio osculatore — Piano osculatore

Per ciascuna delle curve qui sotto elencate, determinare il raggio di curvatura nel punto indicato:

$$\textcircled{1} \mathcal{L}_1 : \mathbf{r}(t) = [3t + t^3] \mathbf{i} + [2t^2 + t^4] \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad P_1(4, 3, 1);$$

$$\textcircled{2} \mathcal{L}_2 : \text{parabola } y = x^2, \quad P_2(1, 1);$$

$$\textcircled{3} \mathcal{L}_3 : \varrho = (1 + \cos \vartheta), \quad P_3\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\sqrt{3}\right).$$

per la curva $\mathcal{L}_1$ scrivere l'equazione del piano osculatore, per le curve $\mathcal{L}_2$ e $\mathcal{L}_3$, scrivere l'equazione del cerchio osculatore.

Soluzione

Data $\mathcal{L} : \mathbf{r}(t)$, dalla teoria sappiamo che la curvatura $\kappa(t)$ di $\mathcal{L}$ nel punto corrispondente al generico t è data da

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \wedge \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}.$$

Sappiamo inoltre che $\mathbf{r}''(t)$ punta verso l'“interno” della curva $\mathcal{L}$, ossia dalla parte da cui si trova il *cerchio osculatore*, il cui raggio (*raggio di curvatura*) è dato da $R = \frac{1}{\kappa(t)}$; inoltre, se $\mathcal{L} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{r}'(t)$ e $\mathbf{r}''(t)$ individuano il *piano osculatore* della curva nel punto corrispondente a t .

- ① P_1 corrisponde a $t = 1$, inoltre

$$\mathbf{r}'(t) = [3 + 3t^2] \mathbf{i} + [4t + 4t^3] \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}''(t) = 6t \mathbf{i} + [4 + 12t^2] \mathbf{j};$$

pertanto $\mathbf{r}'(1) = 6\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + \mathbf{k}$ e $\mathbf{r}''(1) = 6\mathbf{i} + 16\mathbf{j}$. Nel punto P_1 la curvatura e il raggio di curvatura sono dati da

$$\kappa = \frac{|-16\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 48\mathbf{k}|}{|6\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + \mathbf{k}|^3} = \sqrt{\frac{2596}{101^3}}, \quad R = \sqrt{\frac{101^3}{2596}}.$$

Il piano osculatore di $\mathcal{L}_1$ nel punto P_1 ha come vettore perpendicolare $\mathbf{r}'(t) \wedge \mathbf{r}''(t)$, ossia $-16\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 48\mathbf{k}$, la sua equazione è pertanto

$$-16x + 6y + 48z = 2, \quad \text{ossia } 8x - 3y - 24z = -1.$$

- ② Parametizziamo la parabola $\mathcal{L}_2 : \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, poiché $P_2(1, 1)$ corrisponde a $t = 1$ troviamo che

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}''(t) = 2\mathbf{j} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{r}'(1) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}''(1) = 2\mathbf{j};$$

pertanto la curvatura e il raggio di curvatura quando $t = 1$ valgono^c

$$\kappa = \frac{|2\mathbf{k}|}{|\mathbf{i} + 2\mathbf{j}|^3} = \frac{2}{25}\sqrt{5}, \quad R = \frac{5}{2}\sqrt{5}.$$

Il cerchio osculatore di $\mathcal{L}_2$ ha raggio R , il suo centro si trova a distanza $\frac{5}{2}\sqrt{5}$ da P_2 nella direzione perpendicolare alla retta tangente, ossia nella direzione perpendicolare a $\mathbf{r}'$, nel verso delle y (crescenti in accordo con il verso di $\mathbf{r}''$), questa direzione è individuata dal vettore $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j}$; per trovare il centro è sufficiente aggiungere alle coordinate di P_2 un vettore come $\mathbf{v}$, di lunghezza pari a R :

$$[x_C, y_C] = [1, 1] + \frac{5}{2}\sqrt{5} \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \left[-4, \frac{7}{2}\right]$$

il cerchio osculatore ha quindi centro in $(-4, \frac{7}{2})$ e raggio $R = \frac{5}{2}\sqrt{5}$, l'equazione è

$$(x+4)^2 + \left(y - \frac{7}{2}\right)^2 = \left(\frac{5}{2}\sqrt{5}\right)^2 \Rightarrow x^2 + y^2 + 8x - 7y = 3.$$

③ Esprimiamo $\mathcal{L}_3$ in forma parametrica

$$\mathbf{r}(t) = (1 + \cos t)[\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}],$$

e osserviamo che P_3 corrisponde a $t = \frac{\pi}{3}$, poiché

$$\mathbf{r}'(t) = [-\sin t - 2\cos t \sin t]\mathbf{i} + [\cos t + \cos^2 t - \sin^2 t]\mathbf{j},$$

$$\mathbf{r}''(t) = [-\cos t - 2\cos^2 t + 2\sin^2 t]\mathbf{i} + [-\sin t - 4\cos t \sin t]\mathbf{j},$$

e quindi

$$\mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}\mathbf{i} \quad \mathbf{r}''\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{3\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}; \quad \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{3}\right) \wedge \mathbf{r}''\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{9}{2}\mathbf{k},$$

pertanto la curvatura e il raggio di curvatura quando $t = \frac{\pi}{3}$ valgono

$$\kappa = \frac{|\frac{9}{2}\mathbf{k}|}{|-\sqrt{3}\mathbf{i}|^3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad R = \frac{2}{3}\sqrt{3}.$$

^cSi può dimostrare che, se la curva $\mathcal{L}$ è data in forma cartesiana, allora la curvatura nel punto $(x, y(x))$ è data da

$$\kappa = \frac{|y''(x)|}{|1 + [y'(x)]^2|^{3/2}}.$$

Il centro del cerchio osculatore è pertanto posto sulla verticale del punto P_3 , verso il basso (concordemente con $\mathbf{r}''$) a distanza $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ da P_3 , e cioè nel punto

$$(x_C, y_C) = \left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\sqrt{3} - \frac{2}{3}\sqrt{3}\right) = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{12}\right),$$

e la sua equazione è

$$\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{3}}{12}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\sqrt{3}\right)^2,$$

ossia $12x^2 + 12y^2 - 18x - 2\sqrt{3}y = 9$.

Osservazione importante: *Cerchi osculatori nello spazio*

Anche in $\mathbb{R}^3$ è possibile parlare di cerchi osculatori; tuttavia, a differenza di quanto accade nel piano, la loro equazione si può scrivere sotto forma di intersezione tra il piano osculatore e la sfera che ha lo stesso centro e lo stesso raggio del cerchio osculatore.

Esercizio 4.8 — Terna intrinseca

Data la linea

$$\mathcal{L}: \mathbf{r}(t) = [t^2 + 1]\mathbf{i} + [t^3 - 2]\mathbf{j} + [2t]\mathbf{k},$$

scrivere la terna intrinseca relativa al punto $P(5, 6, 4)$.

Soluzione

Data la generica linea regolare $\mathcal{L}: \mathbf{r}(t)$, è detta *terna intrinseca* nel punto $P \in \mathcal{L}$ la terna di versori $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ ove

- $\mathbf{T}$ è il *versore tangente* a $\mathcal{L}$ in P , diretto come $\mathbf{r}'(t)$ e di lunghezza unitaria, pertanto

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|};$$

- $\mathbf{N}$ è il *versore normale* a $\mathcal{L}$ in P , $\mathbf{N}$ punta nella direzione del centro del cerchio osculatore a $\mathcal{L}$ in P , pertanto $\mathbf{T}$ e $\mathbf{N}$ individuano il piano osculatore, inoltre

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{|\mathbf{T}'(t)|};$$

- $\mathbf{B}$ è il *versore binormale* a $\mathcal{L}$ in P , forma con $\mathbf{T}$ e $\mathbf{N}$ una terna destrorsa, quindi

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \wedge \mathbf{N}(t).$$

Osserviamo che, se la linea $\mathcal{L}$ ha una generica parametrizzazione in t , una volta calcolato $\mathbf{T}$ è più comodo calcolare $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{B}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t) \wedge \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \wedge \mathbf{r}''(t)|},$$

e da questo ricavare $\mathbf{N} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{T}$ (sfruttando le proprietà della terna destrorsa). Nel nostro caso, P corrisponde a $t = 2$. Poiché

$$\mathbf{r}'(t) = [2t]\mathbf{i} + [3t^2]\mathbf{j} + [2]\mathbf{k}, \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{9t^4 + 4t^2 + 4},$$

troviamo che

$$\mathbf{T}(t) = \frac{[2t]\mathbf{i} + [3t^2]\mathbf{j} + [2]\mathbf{k}}{\sqrt{9t^4 + 4t^2 + 4}}, \quad \mathbf{T}(2) = \frac{4\mathbf{i} + 12\mathbf{j} + 2\mathbf{k}}{\sqrt{164}} = \frac{2}{\sqrt{41}}\mathbf{i} + \frac{6}{\sqrt{41}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{41}}\mathbf{k};$$

inoltre $\mathbf{r}''(t) = 2\mathbf{i} + 6t\mathbf{j}$, pertanto $\mathbf{r}'(t) \wedge \mathbf{r}''(t) = [-12t]\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6t^2\mathbf{k}$, e

$$\mathbf{B}(t) = \frac{[-12t]\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6t^2\mathbf{k}}{\sqrt{36t^4 + 144t^2 + 16}}, \quad \mathbf{B}(2) = -\frac{6}{\sqrt{73}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{73}}\mathbf{j} + \frac{6}{\sqrt{73}}\mathbf{k}.$$

Infine, $\mathbf{N} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{T}$ e quindi

$$\mathbf{N}(2) = -\frac{35}{\sqrt{2993}}\mathbf{i} + \frac{18}{\sqrt{2993}}\mathbf{j} - \frac{38}{\sqrt{2993}}\mathbf{k}.$$

Esercizio 4.9 — Lunghezza di una curva

Calcolare la lunghezza delle seguenti curve:

$$\textcircled{1} \mathcal{L}_1: \mathbf{r}(t) = \left[t^3 + \frac{1}{t} + 2 \right] \mathbf{i} + [3 + 2\sqrt{3}t] \mathbf{j}, \quad t \in [1, 4];$$

$$\textcircled{2} \mathcal{L}_2: \text{parabola } y = x^2, \quad x \in [-1, 1];$$

$$\textcircled{3} \mathcal{L}_3: \varrho = e^\vartheta, \quad \vartheta \in [0, \pi];$$

$$\textcircled{4} \mathcal{L}_4: \mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + e^{-t} \mathbf{j} - \sqrt{2}t \mathbf{k}, \quad t \in [0, 2].$$

Soluzione

Data una curva $\mathcal{L}: \mathbf{r}(t)$ con $t \in [a, b]$, la lunghezza di $\mathcal{L}$ è data dalla formula

$$\text{lunghezza}(\mathcal{L}) = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

Si può osservare che, nel caso di una curva scritta in forma cartesiana $y = f(x)$ ($x \in [a, b]$) e nel caso di una curva scritta in forma polare $\varrho = g(\vartheta)$ ($\vartheta \in [\alpha, \beta]$), l'espressione $|\mathbf{r}'(t)|$ diventa

$$|\mathbf{r}'(t)| dt = \begin{cases} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx & \text{in forma cartesiana} \\ \sqrt{[g(\vartheta)]^2 + [g'(\vartheta)]^2} d\vartheta & \text{in forma polare} \end{cases};$$

e quindi, nei due casi, l'integrale diventa

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx, \quad \int_\alpha^\beta \sqrt{[g(\vartheta)]^2 + [g'(\vartheta)]^2} d\vartheta.$$

① Abbiamo

$$\mathbf{r}'(t) = \left[3t^2 - \frac{1}{t^2} \right] \mathbf{i} + [2\sqrt{3}] \mathbf{j}$$

da cui

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'(t)| &= \sqrt{\left(3t^2 - \frac{1}{t^2} \right)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{9t^4 - 6 + \frac{1}{t^4} + 12} \\ &= \sqrt{\left(3t^2 + \frac{1}{t^2} \right)^2} = 3t^2 + \frac{1}{t^2} \end{aligned}$$

pertanto

$$\text{lunghezza}(\mathcal{L}_1) = \int_1^4 \left(3t^2 + \frac{1}{t^2} \right) dt = 64 - \frac{1}{4}.$$

② Usando la formula più sopra citata, abbiamo $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + 4x^2}$ e pertanto

$$\text{lunghezza}(\mathcal{L}_2) = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx = 2 \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx,$$

quest'integrale si calcola per sostituzione^d:

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx &= \left[\begin{matrix} 2x = \text{Sh } t \\ dx = \text{Ch } t dt \end{matrix} \right] = \int_0^{\bar{t}} \sqrt{1 + \text{Sh}^2 t} \text{Ch } t dt \\ &= \int_0^{\bar{t}} \text{Ch}^2 t dt = \frac{1}{4} \int_0^{\bar{t}} (e^t + e^{-t})^2 dt = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} e^{2t} + 2t - \frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^{\log[2+\sqrt{5}]} \end{aligned}$$

in definitiva

$$\text{lunghezza}(\mathcal{L}_2) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} e^{2t} + 2t - \frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^{\log[2+\sqrt{5}]} = \sqrt{5} + \frac{\log[2 + \sqrt{5}]}{2}.$$

③ Usando anche in questo caso la formula scritta sopra, poiché $g(\vartheta) = g'(\vartheta) = e^\vartheta$ abbiamo $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{[e^\vartheta]^2 + [e^\vartheta]^2} = \sqrt{2}e^\vartheta$, e quindi

$$\text{lunghezza}(\mathcal{L}_3) = \int_0^\pi \sqrt{2}e^\vartheta d\vartheta = \sqrt{2}(e^\pi - 1).$$

^dDa $2 = \text{Sh } \bar{t}$ si ricava $\bar{t} = \log[2 + \sqrt{5}]$.

④ In questo caso $\mathbf{r}'(t) = e^t \mathbf{i} - e^{-t} \mathbf{j} - \sqrt{2} \mathbf{k}$ e quindi

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{e^{2t} + e^{-2t} + 2} = \sqrt{(e^t + e^{-t})^2} = e^t + e^{-t},$$

pertanto

$$\text{lunghezza}(\mathcal{L}_4) = \int_0^2 (e^t + e^{-t}) dt = e^2 - e^{-2} = 2\text{Sh}2.$$

Esercizio 4.10 — Ascissa curvilinea

Determinare la parametrizzazione in termini dell'ascissa curvilinea s della curva seguente (cicloide):

$$\mathcal{L}: \mathbf{r}(t) = [t - \sin t] \mathbf{i} + [1 - \cos t] \mathbf{j}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Soluzione

Data $\mathcal{L}: \mathbf{r}(t)$ con $t \in [a, b]$, l'ascissa curvilinea $s(t)$ rappresenta la lunghezza dell'arco compreso tra $\mathbf{r}(a)$ e $\mathbf{r}(t)$, ossia

$$s(t) = \int_a^t |\mathbf{r}'(\tau)| d\tau.$$

Per riparametrizzare $\mathcal{L}$ in termini di s , è necessario^e determinare t in funzione di s e scrivere $\mathbf{r}$ in funzione di s .

Poiché

$$\mathbf{r}'(t) = [1 - \cos t] \mathbf{i} + [\sin t] \mathbf{j}$$

e quindi $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2 - 2 \cos t}$, usando le formule di bisezione ($t \in [0, 2\pi]$), quindi $\frac{t}{2} \in [0, \pi]$ abbiamo

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2 - 2 \cos t} = 2 \sqrt{\frac{1 - \cos t}{2}} = 2 \sin \frac{t}{2},$$

^eDal punto di vista teorico ciò è sempre possibile, infatti s è una funzione crescente in t ; non è sempre possibile effettuare esplicitamente questa trasformazione nei casi particolari.

pertanto

$$s(t) = \int_0^t 2 \sin \frac{\tau}{2} d\tau = 4 \left(1 - \cos \frac{t}{2} \right);$$

quindi

$$s = s(t) = 4 \left(1 - \cos \frac{t}{2} \right) \Leftrightarrow t = t(s) = 2 \arccos \frac{4-s}{4}.$$

La riparametrizzazione cercata è allora

$$\begin{aligned} \mathcal{L}: \mathbf{r}(s) = & \left[2 \arccos \frac{4-s}{4} - \sin \left(2 \arccos \frac{4-s}{4} \right) \right] \mathbf{i} \\ & + \left[1 - \cos \left(2 \arccos \frac{4-s}{4} \right) \right] \mathbf{j}, \end{aligned}$$

con $s \in [0, 8]$.

Esercizio 4.11 — Integrali di linea di prima specie

Calcolare i seguenti integrali di linea:

$$\textcircled{1} \int_{\mathcal{L}_1} \frac{x}{y} ds, \quad \mathcal{L}_1: \mathbf{r}(t) = [e^{3t}] \mathbf{i} + [e^{4t}] \mathbf{j}, \quad t \in [0, 1];$$

$$\textcircled{2} \int_{\mathcal{L}_2} x ds, \quad \mathcal{L}_2: \text{parabola } y = x^2, \quad x \in [0, 3];$$

$$\textcircled{3} \int_{\mathcal{L}_3} \frac{yz}{2x+1} ds, \quad \mathcal{L}_3: \mathbf{r}(t) = [t^2] \mathbf{i} + [2t] \mathbf{j} + [\log t] \mathbf{k}, \quad t \in [1, e].$$

Soluzione

Data la curva

$$\mathcal{L}: \mathbf{r}(t) = [x(t)] \mathbf{i} + [y(t)] \mathbf{j} + [z(t)] \mathbf{k}, \quad t \in [a, b];$$

e data una funzione $f(x, y, z)$ definita in tutti i punti di $\mathcal{L}$, l'integrale di f lungo $\mathcal{L}$ si calcola trasformando x, y, z e anche s in funzione di t :

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt \Rightarrow \int_{\mathcal{L}} f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

Questa tipologia di integrali è detta *integrali di linea di prima specie*, si distinguono dagli integrali di seconda specie, di cui parleremo più avanti, per la variabile d'integrazione: nel caso degli integrali di prima specie, la variabile è l'ascissa curvilinea s , nel caso degli integrali di seconda specie le variabili d'integrazione sono le coordinate x, y e z .

① Abbiamo

$$\mathbf{r}'(t) = 3e^{3t}\mathbf{i} + 4e^{4t}\mathbf{j}, \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{9e^{6t} + 16e^{8t}} = e^{3t}\sqrt{9 + 16e^{2t}},$$

inoltre

$$\frac{x}{y} = \frac{e^{3t}}{e^{4t}} = \frac{1}{e^t};$$

pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{L}_1} \frac{x}{y} ds &= \int_0^1 \frac{1}{e^t} e^{3t} \sqrt{9 + 16e^{2t}} dt = \int_0^1 e^{2t} \sqrt{9 + 16e^{2t}} dt \\ &= \left[\begin{array}{l} e^{2t} = u \\ 2e^{2t} dt = du \end{array} \right] = \frac{1}{2} \int_0^{e^2} \sqrt{16u + 9} du = \dots = \frac{\sqrt{(16e^2 + 9)^3} - 27}{48}. \end{aligned}$$

② In questo caso, poiché anche $|\mathbf{r}'| = \sqrt{1 + 4x^2}$ può essere scritto in funzione di x , scriviamo tutto l'integrale in funzione di x :

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{L}_2} x ds &= \int_0^3 x \sqrt{1 + 4x^2} dx = \left[\begin{array}{l} 4x^2 = u \\ 8x dx = du \end{array} \right] \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{36} \sqrt{1 + u} du = \frac{1}{12} \left[\sqrt{(1 + u)^3} \right]_0^{36} = \frac{\sqrt{37^3} - 1}{12}. \end{aligned}$$

③ Calcoliamo $\mathbf{r}'$:

$$\mathbf{r}'(t) = 2t\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \frac{1}{t}\mathbf{k}, \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{4t^2 + 4 + \frac{1}{t^2}} = \sqrt{\left(2t + \frac{1}{t}\right)^2},$$

 $t \in [1, e]$ implica $2t + \frac{1}{t} > 0$, quindi

$$|\mathbf{r}'(t)| = 2t + \frac{1}{t} = \frac{2t^2 + 1}{t};$$

infine

$$\frac{yz}{2x + 1} = \frac{2t \log t}{2t^2 + 1},$$

pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{L}_3} \frac{yz}{2x + 1} ds &= \int_1^e \frac{2t \log t}{2t^2 + 1} \frac{2t^2 + 1}{t} dt = 2 \int_1^e \log t dt \\ &= 2[t \log t - t]_1^e = 2. \end{aligned}$$

**Esercizio 4.12 — Integrali di linea di prima specie
Interpretazione fisica**Calcolare la massa e le coordinate del baricentro della linea $\mathcal{L}: \mathbf{r}(t) = 3t^2\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $t \in [1, 4]$, la cui densità lineare vale

$$\delta(x, y, z) = \frac{x + z}{3y}.$$

SoluzioneSe si interpreta la curva $\mathcal{L}$ come un filo avente densità lineare $\delta(x, y, z)$, allora la massa M e l'ascissa del baricentro sono date dagli integrali di linea^f

$$M = \int_{\mathcal{L}} \delta(x, y, z) ds, \quad x_B = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{L}} x \delta(x, y, z) ds.$$

Nel nostro caso $\mathbf{r}'(t) = 6t\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}$, quindi

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{36t^2 + 36 + 9t^4} = \sqrt{9(t^2 + 2)^2} = 3(t^2 + 2);$$

inoltre

$$\delta(x(t), y(t), z(t)) = \frac{x + z}{3y} = \frac{3t^2 + t^3}{18t} = \frac{1}{18}(3t + t^2),$$

pertanto

$$M = \int_1^4 \frac{1}{18} (3t + t^2) 3(t^2 + 2) dt = \frac{3219}{40}.$$

inoltre

$$\begin{aligned} x_B &= \frac{1}{M} \int_1^4 \frac{1}{18} 3t^2 (3t + t^2) 3(t^2 + 2) dt = \frac{40}{3219} \cdot \frac{181287}{70} = \frac{241716}{7511}; \\ y_B &= \frac{1}{M} \int_1^4 \frac{1}{18} 6t (3t + t^2) 3(t^2 + 2) dt = \frac{40}{3219} \cdot \frac{7749}{5} = \frac{20664}{1073}; \\ z_B &= \frac{1}{M} \int_1^4 \frac{1}{18} t^3 (3t + t^2) 3(t^2 + 2) dt = \frac{40}{3219} \cdot \frac{1661871}{560} = \frac{553957}{15022}. \end{aligned}$$

**Esercizio 4.13 — Integrali di linea di prima specie
Interpretazione geometrica**Calcolare l'area A della superficie a generatrici parallele all'asse z compresa tra la linea $\mathcal{L}: y = \sin x$, $x \in [0, \pi]$ e la superficie di equazione $z = f(x, y) = x\sqrt{2 - y^2}$.^fValgono ovviamente formule analoghe per ordinata e quota del baricentro:

$$y_B = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{L}} y \delta(x, y, z) ds, \quad z_B = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{L}} z \delta(x, y, z) ds.$$

Soluzione

Data una linea $\mathcal{L}$ nel piano xy e data una funzione $f(x, y)$ definita e non negativa in corrispondenza dei punti di $\mathcal{L}$, l'integrale

$$\int_{\mathcal{L}} f(x, y) ds$$

può essere visto come l'area della superficie verticale compresa tra la linea $\mathcal{L}$ nel piano xy e la superficie $z = f(x, y)$:

Nel nostro caso, (usando direttamente la parametrizzazione in x)

$$|\mathbf{r}'| = \sqrt{1 + \cos^2 x}, \quad f(x, \sin x) = x\sqrt{2 - \sin^2 x},$$

pertanto

$$A = \int_{\mathcal{L}} f(x, y) ds = \int_0^{\pi} x\sqrt{2 - \sin^2 x} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} x(1 + \cos^2 x) dx$$

e, usando le formule di bisezione,

$$\int_0^{\pi} x(1 + \cos^2 x) dx = \int_0^{\pi} x \left(1 + \frac{1 + \cos 2x}{2}\right) dx = \dots = \frac{3}{2}\pi^2.$$

Esercizio 4.14 — Integrali di linea di seconda specie

Calcolare i seguenti integrali di linea:

$$\textcircled{1} \int_{\mathcal{L}_1} [xy dx + dy], \quad \mathcal{L}_1: \begin{cases} \mathbf{r}(t) = [e^{-t}]\mathbf{i} + [te^{2t}]\mathbf{j} \\ \text{percorsa da } (1, 0) \text{ a } (e^{-1}, e^2) \end{cases};$$

$$\textcircled{2} \int_{\mathcal{L}_2} \left[x dx + \frac{y+1}{x+2} dy \right], \quad \mathcal{L}_2: \begin{cases} \text{parabola } y = x^2, \\ \text{percorsa da } (0, 0) \text{ a } (2, 4) \end{cases};$$

$$\textcircled{3} \int_{\mathcal{L}_3} [xyz dx - xz dz], \quad \mathcal{L}_3: \begin{cases} \mathbf{r}(t) = [t^2]\mathbf{i} + [2t]\mathbf{j} + [\log t]\mathbf{k}, \\ \text{percorsa da } (e^2, 2e, 1) \text{ a } (1, 2, 0). \end{cases}$$

Soluzione

Come per gli integrali di prima specie, anche per gli integrali di seconda specie le variabili che compaiono nell'integrale vengono trasformate nel parametro della linea $\mathcal{L}$; mentre nel caso degli integrali di prima specie ds diventava $|\mathbf{r}'(t)| dt$, ora negli integrali compaiono dx , dy e dz , che diventano rispettivamente

$$dx = x'(t) dt, \quad dy = y'(t) dt, \quad dz = z'(t) dt.$$

① Osserviamo innanzitutto che nella parametrizzazione data per $\mathcal{L}_1$ il parametro t varia da $t = 0$ a $t = 1$, inoltre

$$dx = -e^{-t} dt, \quad dy = (e^{2t} + 2te^{2t}) dt;$$

pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{L}_1} [xy dx + dy] &= \int_0^1 [te^t(-e^{-t}) dt + (e^{2t} + 2te^{2t}) dt] \\ &= \int_0^1 [-t + e^{2t} + 2te^{2t}] dt = \left[-\frac{1}{2}t^2 + te^{2t} \right]_0^1 = e^2 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

② Usando x come parametro, x varia da $x = 0$ a $x = 2$, inoltre $dy = d(x^2) = 2x dx$, pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{L}_2} \left[x dx + \frac{y+1}{x+2} dy \right] &= \int_0^2 \left[x dx + \frac{x^2+1}{x+2} 2x dx \right] \\ &= \int_0^2 \left[x + \frac{x^2+1}{x+2} 2x \right] dx = \int_0^2 \left[\frac{2x^3 + x^2 + 4x}{x+2} \right] dx \\ &= \int_0^2 \left[2x^2 - 3x + 10 - \frac{20}{x+2} \right] dx = \dots = \frac{58}{3} - 20 \log 2. \end{aligned}$$

③ Osserviamo innanzitutto che nella parametrizzazione data per $\mathcal{L}_3$, concordemente al verso di percorrenza prescelto, il parametro t varia da $t = e$ a $t = 1$, inoltre (dy non compare nella formula)

$$dx = 2t dt, \quad dz = \frac{1}{t} dt;$$

pertanto (attenzione agli estremi d'integrazione...)

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{L}_3} [xyz dx - xz dz] &= \int_e^1 \left[2t^3 \log t \cdot (2t) dt - t^2 \log t \cdot \frac{1}{t} dt \right] \\ &= - \int_1^e [4t^4 - t] \log t dt = \text{integrando per parti} = \frac{9 + 25e^2 - 64e^5}{100}. \end{aligned}$$