Allo stesso risultato si sarebbe arrivati integrando prima rispetto alla x e poi rispetto alla y . Si ha infatti

$$E = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{1-y^2}\},$$

da cui

$$\int_E x e^y dx dy = \int_0^1 e^y dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-y^2) e^y dy,$$

e l'ultimo integrale è uguale a

$$e^y \left[y - \frac{1+y^2}{2} \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \blacksquare$$

Esercizi

Calcolare i seguenti integrali:

$$16. \int_E y \arcsin x dx dy \quad 17. \int_E x \sin y dx dy$$

$$18. \int_E \arcsin y dx dy \quad 19. \int_E xy \ln xy dx dy$$

$$20. \int_E x \sqrt{1-y^2} dx dy \quad 21. \int_E x \sqrt{y} dx dy$$

dove E è l'insieme dell'Esempio 4.1.

$$22. \int_E \frac{y}{2+x} dx dy \quad 23. \int_E \frac{x^2}{3+y} dx dy$$

$$24. \int_E x^2 \sqrt{y} dx dy \quad 25. \int_E \frac{y}{4x^2+y^2} dx dy$$

$$26. \int_E \frac{1+x^2}{1+2y} dx dy \quad 27. \int_E (2y+1) \ln(1+x^2) dx dy$$

in cui E è la porzione del piano limitata dalla parabola $y = 1 - x^2$ e dall'asse delle x .

$$28. \int_E x e^y dx dy \quad 29. \int_E x \sin xy dx dy$$

$$30. \int_E x \cos(1-y) dx dy \quad 31. \int_E \arcsin x dx dy$$

nei quali si è posto

$$E = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 - 1 \leq y \leq 1 - x^2\}.$$

$$32. \int_E (y - x^2) dx dy \quad 33. \int_E (y+1) dx dy$$

$$34. \int_E \frac{1}{1+y} dx dy \quad 35. \int_E (2-y) e^x dx dy$$

dove

$$E = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 - \sqrt{1-x^2}\}.$$

$$36. \int_E \frac{x}{1+y^2} dx dy \quad 37. \int_E \ln(1+x+2y) dx dy$$

$$38. \int_E \frac{xy}{x+y} dx dy \quad 39. \int_E y \arcsin x dx dy$$

$$40. \int_E x \sin y dx dy \quad 41. \int_E x y e^y dx dy$$

nei quali E è l'insieme delimitato dalla parabola $x = y^2$ e dalle rette $y = 0$ e $x = 1$.

$$42. \int_E \frac{y}{1+x+y} dx dy \quad 43. \int_E (1+y) e^x dx dy$$

$$44. \int_E (x+y) \ln(1+x) dx dy \quad 45. \int_E \frac{y}{\sqrt{1+x^2}} dx dy$$

$$46. \int_E x \arcsin y dx dy \quad 47. \int_E x \operatorname{arctg} xy dx dy$$

$$48. \int_E \sqrt{4x^2 - y^2} dx dy$$

dove E è il triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 1)$.

$$49. \int_E \sin \frac{\pi}{2}(x+y) dx dy \quad 50. \int_E (x^2 - y^2) dx dy$$

$$51. \int_E x \arcsin y dx dy$$

quando E è il parallelogrammo di vertici $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ e $(2, 1)$.

$$52. \int_E \ln(x+2y) \, dx \, dy$$

dove E è il triangolo di vertici $(0,0)$, $(1,1)$ e $(2,0)$.

$$53. \int_T \frac{2xy}{x^2+y^2} \, dx \, dy$$

con

$$T = \left\{ (x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, \sqrt{1-\frac{x^2}{4}} \leq y \leq \sqrt{4-x^2} \right\}.$$

$$54. \int_E x^2 y \, dx \, dy$$

$$55. \int_E \frac{x}{1+y^2} \, dx \, dy$$

$$56. \int_E \frac{x}{1+xy} \, dx \, dy$$

$$57. \int_E x \operatorname{arctg} y \, dx \, dy$$

$$58. \int_E x \ln(1+y) \, dx \, dy$$

$$59. \int_E x^3 e^{x^2 y} \, dx \, dy$$

con

$$E = \left\{ (x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 < x < 1, 1 < y < \frac{1}{x} \right\}.$$

$$60. \int_D x \, dx \, dy$$

$$61. \int_D y \, dx \, dy$$

$$62. \int_D (x^2 y + 1) \, dx \, dy$$

$$63. \int_D y^3 e^x \, dx \, dy$$

dove D è l'insieme del semipiano $y > 0$ delimitato dalle circonferenze di centro l'origine e raggio 1 e 2, e dalle rette $x=0$ e $x=1$.

Lo stesso metodo può essere usato nel caso di integrali in tre o più variabili.

Esempio 4.2

Si calcoli

$$\int_E x(y+z) \, dx \, dy \, dz,$$

dove E è il tetraedro di vertici $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ e $(0,0,1)$.

Risulta

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x+y+z \leq 1\},$$

e dunque

$$\int_E x(y+z) \, dx \, dy \, dz = \int_T x \, dx \, dy \int_0^{1-x-y} (y+z) \, dz,$$

dove T è il triangolo

$$\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}.$$

Si ha allora

$$\begin{aligned} \int_E x(y+z) \, dx \, dy \, dz &= \int_T x \left[y(1-x-y) + \frac{1}{2}(1-x-y)^2 \right] \, dx \, dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 x \, dx \int_0^{1-x} [(1-x)^2 - y^2] \, dy, \end{aligned}$$

e quest'ultimo integrale è uguale a

$$\frac{1}{3} \int_0^1 x(1-x)^3 \, dx = \frac{1}{60}. \quad \blacksquare$$

Esercizi

Calcolare i seguenti integrali:

$$64. \int_E xy(y+z) \, dx \, dy \, dz \quad 65. \int_E (1+y\sqrt{x}) \, dx \, dy \, dz$$

$$66. \int_E (x+y) \, dx \, dy \, dz \quad 67. \int_E xye^z \, dx \, dy \, dz$$

$$68. \int_E \arcsin x \, dx \, dy \, dz \quad 69. \int_E \frac{dx \, dy \, dz}{1+x+y+z}$$

dove E è il tetraedro definito nell'Esempio 4.2.

$$70. \int_T (x + \ln y) dx dy dz \quad 71. \int_T xy \sin(\pi z) dx dy dz$$

$$72. \int_T \frac{1+2xy}{1+z^2} dx dy dz \quad 73. \int_T e^x dx dy dz$$

in cui T è il tetraedro con vertici nei punti $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 1)$ e $(0, 0, 1)$.

$$74. \int_E xy dx dy dz \quad 75. \int_E (x+z) \ln y dx dy dz$$

$$76. \int_E ye^x dx dy dz$$

con

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 3 - x + y\}.$$

$$77. \int_E (x + \sin z) dx dy dz \quad 78. \int_E \arctg(x+y) dx dy dz$$

dove si è posto

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq x - y\}.$$

$$79. \int_E dx dy dz \quad 80. \int_E x \ln(1+y) dx dy dz$$

con

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 6 - x^2 - y^2\}.$$

81. Si calcoli l'integrale

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_y^x xyz dz,$$

e si trovi il dominio D di integrazione.

Il teorema di Fubini può anche essere usato per ottenere una interessante formula di trasformazione degli integrali.

Sia $f(x)$ una funzione definita in un insieme misurabile E , misurabile e non negativa. Abbiamo già osservato che, posto

$$\mathcal{F}_0 = \{(x, y) \in E \times \mathbb{R} : 0 < y < f(x)\},$$

si ha

$$\int_E f(x) dx = m_{n+1}(\mathcal{F}_0).$$

D'altra parte si ha

$$\mathcal{F}_{0,t} = \{x \in E : (x, t) \in \mathcal{F}_0\} = \{x \in E : f(x) > t\} = F_t,$$

e dunque, per il teorema di Fubini (vedi *Lezioni*, cap. 6, Teorema 5.1, e in particolare la [5.8]):

$$\int_E f(x) dx = \int_0^{\infty} m_n(F_t) dt. \quad [4.1]$$

La formula [4.1], oltre al suo interesse intrinseco, può talvolta essere usata per semplificare il calcolo di alcuni integrali.

Esempio 4.3

Si calcoli

$$\int_{\mathbb{R}^2} (1+x^2+2y^2)^{-5/2} dx dy.$$

Si ha $0 < f(x, y) \leq 1$, e dunque $F_t = \emptyset$ se $t \geq 1$. Se invece $0 < t < 1$, si ha

$$F_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 > t^{-2/5} - 1 =: \varrho^2\},$$

e quindi F_t è l'ellisse di semiassi ϱ e $\frac{\varrho}{\sqrt{2}}$. Ne segue $m(F_t) = \frac{\pi \varrho^2}{\sqrt{2}}$, e dunque

$$\int_{\mathbb{R}^2} (1+x^2+2y^2)^{-5/2} dx dy = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \int_0^1 (t^{-2/5} - 1) dt = \frac{\pi\sqrt{2}}{3}. \quad \blacksquare$$

Esercizi

82: Sia $f(x)$ una funzione misurabile in un insieme E di misura finita. Dimostrare che la misura dell'insieme

$$\Phi_t = \{x \in E : f(x) = t\}$$

è diversa da zero al più per un'infinità numerabile di valori di t .

L'ultimo integrale si calcola mediante il teorema di Fubini:

$$\int_0^1 dv \int_0^1 \frac{du}{2\sqrt{1+u-v}} = \int_0^1 (\sqrt{2-v} - \sqrt{1-v}) dv = \frac{4}{3} (\sqrt{2} - 1). \blacksquare$$

Esercizi

Calcolare i seguenti integrali:

$$86. \int_T (x+y) dx dy \quad 87. \int_T x^2 dx dy$$

$$88. \int_T \ln(y+2x) dx dy \quad 89. \int_T (x^2+y) dx dy$$

dove T è il dominio definito nell'Esempio 5.2.

$$90. \int_E \frac{dx dy}{(x+y)^2} \quad 91. \int_E \frac{dx dy}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$92. \int_E x dx dy \quad 93. \int_E \frac{\ln x}{y^3} dx dy$$

dove E è l'insieme dell'Esempio 5.1.

$$94. \int_T dx dy \quad 95. \int_T y dx dy$$

$$96. \int_T x dx dy \quad 97. \int_T e^x \ln y dx dy$$

con

$$T = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq ye^{-x} \leq 2, 2 \leq ye^x \leq 3\}.$$

$$98. \int_T \cos \frac{x-y}{x+y} dx dy$$

in cui T è il triangolo di vertici $(0,0)$, $(1,0)$ e $(0,1)$.

$$99. \int_E dx dy \quad 100. \int_E x dx dy$$

$$101. \int_E \frac{dx dy}{xy}$$

dove E è l'insieme del primo quadrante delimitato dalle rette $y=2x$ e $2y=x$ e dalle ellissi $4x^2+y^2=4$ e $4x^2+y^2=16$.

$$102. \int_T dx dy \quad 103. \int_T (x+y) dx dy$$

$$104. \int_T \sin(\pi y) dx dy \quad 105. \int_T \frac{\ln y}{x} dx dy$$

dove T è il dominio delimitato dai grafici delle funzioni $y=\ln x$, $y=\ln x+2$, $y=-\ln x$ e $y=4-\ln x$.

$$106. \int_T \frac{dx dy}{xy} \quad 107. \int_T y^2 e^{xy} dx dy$$

$$108. \int_T xy^2 \ln xy dx dy \quad 109. \int_T \frac{\cos \frac{\pi}{2} y}{x^2} dx dy$$

nei quali si è posto

$$T = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, 2 \leq xy \leq 3\}.$$

$$110. \int_D (y^2 - x^2)^{xy} (x^2 + y^2) dx dy$$

con

$$D = \{(x, y) : x > 0, y > 0, 0 < a \leq xy \leq b, 0 < y^2 - x^2 < 1\}.$$

111. Calcolare il volume del solido

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x > 0, y > 0, \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1, 0 \leq z \leq \sqrt{xy}\}.$$

112. Ricordando che il *baricentro* di un solido E è il punto di coordinate

$$\bar{x}_i = \frac{1}{m(E)} \int_E x_i dx,$$

si trovi il baricentro del solido dell'esercizio precedente.

6 Coordinate polari

Un caso particolarmente importante di cambiamento di variabili consiste nell'introduzione di coordinate polari (in due o tre dimensioni) o cilindriche (in tre dimensioni). Nel caso bidimensionale si pone

$$\begin{cases} x = \rho \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \vartheta \end{cases}$$

116. Dire per quali valori di $\alpha < 0$ e $p > 0$ la funzione x^α è sommabile nell'insieme $E = \{(x, y) : 0 < x < 1, -x^p < y < x^p\}$. Per questi valori, calcolare l'integrale $\int_E x^\alpha dx dy$.

117. Dire per quali valori di $\alpha < 0$ e $p > 0$ la funzione z^α è sommabile nell'insieme $F = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : 0 < z < 1, x^2 + y^2 < z^{2p}\}$. Per questi valori calcolare l'integrale $\int_E z^\alpha dx dy dz$.

118. Dire per quali valori di α e p la funzione

$$\frac{y^\alpha}{x^2 + y^2}$$

è sommabile nell'insieme $T = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^p\}$.

Calcolare i seguenti integrali:

$$119. \int_E x e^{2y} dx dy \quad 120. \int_E x \ln x dx dy$$

dove E è l'insieme dell'Esempio 6.1.

$$121. \int_E x^2 y^2 dx dy \quad 122. \int_E \frac{2x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$$

$$123. \int_E \frac{x^2}{x^2 + 2y^2} dx dy \quad 124. \int_E \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} dx dy$$

dove E è la corona circolare di centro l'origine e raggi 1 e 2.

$$125. \int_G \frac{dx dy}{3y + 4x} \quad 126. \int_G x \operatorname{arctg} \frac{x}{y} dx dy$$

$$127. \int_G x e^y dx dy \quad 128. \int_G x \ln(1 + y) dx dy$$

nei quali G è la parte della corona circolare di centro l'origine e raggi 1 e 2, contenuta nel primo quadrante.

$$129. \int_B (x + y^2)^2 dx dy \quad 130. \int_B x^2 \operatorname{arctg}(x^2 + y^2) dx dy$$

$$131. \int_B \frac{x^2}{1 + y^2} dx dy \quad 132. \int_B \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} dx dy$$

$$133. \int_B \frac{y^2}{1 + x^2 + y^2} dx dy \quad 134. \int_B x^2 e^{x^2 + y^2} dx dy$$

dove B è il cerchio di raggio 1 con centro in O .

135. Determinare la misura e il baricentro dell'insieme

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0, 0 \leq z \leq \frac{x+y}{x^2+y^2} \right\}.$$

136. Si trovi l'area dell'intersezione dei cerchi $x^2 + y^2 - 2x \leq 0$ e $x^2 + y^2 - 2y \leq 0$.

Talvolta l'insieme E è dato direttamente in coordinate polari.

Esempio 6.4

Si calcoli l'area della porzione di piano racchiusa dalla curva

$$\varrho = a \frac{\sqrt{\cos 2\varphi}}{\cos \varphi}, \quad -\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}.$$

L'insieme in esame è in coordinate polari:

$$E = \left\{ (\varrho, \varphi) : -\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \varrho \leq a \frac{\sqrt{\cos 2\varphi}}{\cos \varphi} \right\}.$$

Si ha allora

$$m(E) = \int_E \varrho d\varrho d\varphi = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} d\varphi \int_0^{a \frac{\sqrt{\cos 2\varphi}}{\cos \varphi}} \varrho d\varrho,$$

da cui

$$m(E) = \frac{a^2}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos 2\varphi}{\cos^2 \varphi} d\varphi = a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right). \blacksquare$$

Esercizi

137. Si calcoli l'integrale

$$\int_E x^2 dx dy,$$

dove E è l'insieme dell'Esempio 6.4.

138. Si calcoli l'area della porzione di piano racchiusa dalla curva

$$\varrho = a \frac{\operatorname{tg} \varphi (1 - \operatorname{tg}^2 \varphi)}{\cos \varphi}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}.$$

Le coordinate polari sono utili per calcolare integrali estesi a domini circolari, anche quando non sono centrati nell'origine. Se il centro è nel punto (x_0, y_0) , si opererà il cambiamento di variabili

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \vartheta \\ y = y_0 + \rho \sin \vartheta. \end{cases}$$

Naturalmente la matrice jacobiana rimane la stessa, data che in essa entrano solo le derivate.

Esempio 6.5

Si calcoli

$$\int_C xy \, dx \, dy,$$

dove C è il semicerchio di centro $(1, 0)$ e raggio 1 contenuto nel semipiano delle y positive.

Si può operare il cambiamento di variabili $x = 1 + \rho \cos \vartheta$, $y = \rho \sin \vartheta$; si ottiene

$$\int_C xy \, dx \, dy = \int_0^1 \rho^2 \, d\rho \int_0^\pi (1 + \rho \cos \vartheta) \sin \vartheta \, d\vartheta = 2 \int_0^1 \rho^2 \, d\rho = \frac{2}{3}.$$

Allo stesso risultato si sarebbe potuti arrivare osservando che C è un dominio normale:

$$C = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\},$$

o anche usando le coordinate polari usuali $x = \rho \cos \vartheta$, $y = \rho \sin \vartheta$. In questo caso si deve avere $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$, e dunque il raggio ρ varierà tra 0 e $2 \cos \vartheta$, mentre ϑ varia tra 0 e $\frac{\pi}{2}$. Ne segue

$$\int_C xy \, dx \, dy = \int_0^{\pi/2} \sin \vartheta \cos \vartheta \, d\vartheta \int_0^{2 \cos \vartheta} \rho^3 \, d\rho,$$

da cui, calcolando gli integrali, si ottiene il valore $\frac{2}{3}$, come di dovere. ■

Esercizi

Calcolare i seguenti integrali:

$$139. \int_E y \, dx \, dy \qquad 140. \int_E x^2 y \, dx \, dy$$

$$141. \int_E (1 + x^2 + y^2) \, dx \, dy \qquad 142. \int_E (y - x^2) \, dx \, dy$$

dove E è il cerchio di raggio 1 centrato in $(0, 1)$.

$$143. \int_T \frac{dx \, dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

con $T = C_1 - C_2$, essendo C_1 e C_2 i cerchi di raggio 1, centrati nei punti $(0, 1)$ e $(0, 0)$.

$$144. \int_A (x^2 + y^2 - y + 1) \, dx \, dy$$

dove A è la corona circolare delimitata dalle circonferenze di raggi 2 e 3, centrate nel punto $(1, 2)$.

Veniamo ora alle coordinate polari in tre variabili. In questo caso si pone

$$\begin{cases} x = \rho \sin \vartheta \cos \varphi \\ y = \rho \sin \vartheta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \vartheta, \end{cases}$$

da cui segue

$$J = \begin{pmatrix} \sin \vartheta \cos \varphi & \sin \vartheta \sin \varphi & \cos \vartheta \\ \rho \cos \vartheta \cos \varphi & \rho \cos \vartheta \sin \varphi & -\rho \sin \vartheta \\ -\rho \sin \vartheta \sin \varphi & \rho \sin \vartheta \cos \varphi & 0 \end{pmatrix}$$

e quindi

$$|\det J| = \rho^2 \sin \vartheta.$$

Di conseguenza:

$$\begin{aligned} \int_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz &= \\ &= \int_G f(\rho \sin \vartheta \cos \varphi, \rho \sin \vartheta \sin \varphi, \rho \cos \vartheta) \rho^2 \sin \vartheta \, d\rho \, d\vartheta \, d\varphi, \end{aligned}$$

dove G è l'insieme E espresso tramite le coordinate polari ρ , ϑ e φ .

Esempio 6.6

Calcoliamo l'integrale

$$\int_B x^2 dx dy dz,$$

dove B è la palla unitaria in $\mathbf{R}^3$.

In coordinate polari la palla unitaria B è determinata dalle relazioni

$$\rho \leq 1, \quad 0 \leq \vartheta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Si ha allora

$$\int_B x^2 dx dy dz = \int_0^1 d\rho \int_0^\pi d\vartheta \int_0^{2\pi} \rho^4 \sin^3 \vartheta \cos^2 \varphi d\varphi.$$

Di conseguenza:

$$\int_B x^2 dx dy dz = \frac{4\pi}{15}. \quad \blacksquare$$

Esempio 6.7

Si calcoli l'integrale

$$\int_E \ln(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

dove E è l'intersezione della palla unitaria B con il cono

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : z \geq 0, x^2 + y^2 \leq z^2\}.$$

In coordinate polari il dominio E è determinato dalle relazioni

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \vartheta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

Ne segue

$$\int_E \ln(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^1 \rho^2 \ln \rho^2 d\rho \int_0^{\pi/4} \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi,$$

e dunque l'integrale cercato è uguale a

$$4\pi \int_0^1 \rho^2 \ln \rho^2 d\rho \int_0^{\pi/4} \sin \vartheta d\vartheta = 2\sqrt{2}\pi (\sqrt{2} - 1) \int_0^1 \rho^2 \ln \rho^2 d\rho.$$

Quest'ultimo integrale si calcola facilmente per parti, ottenendo

$$\int_E \ln(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{2\sqrt{2}}{9} \pi (\sqrt{2} - 1). \quad \blacksquare$$

Esercizi

Si calcolino i seguenti integrali:

$$145. \int_E x^2 dx dy dz \quad 146. \int_E y^2 z dx dy dz,$$

dove E è l'intersezione della palla di centro O e raggio 1 con il cono

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : z \geq 0, 3(x^2 + y^2) \leq z^2\}.$$

$$147. \int_G e^z dx dy dz \quad 148. \int_G z \ln z dx dy dz,$$

dove G è l'intersezione della palla unitaria con il cono

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : z \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3z^2\}.$$

Sempre in tre dimensioni, risultano talvolta utili le coordinate cilindriche, che consistono nell'introdurre coordinate polari bidimensionali nel piano xy , lasciando inalterata la variabile z . In formule:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \vartheta \\ z = z, \end{cases}$$

e dunque

$$\det J = \rho.$$

Si ha allora

$$\int_E f(x, y, z) dx dy dz = \int_G f(\rho \cos \vartheta, \rho \sin \vartheta, z) \rho d\rho d\vartheta dz,$$

dove G è il trasformato di E nelle variabili (ρ, ϑ, z) .

allora si può eseguire subito l'integrazione rispetto a ϱ , e si trova

$$m(S) = \pi \int_a^b [g^2(z) - f^2(z)] dz.$$

Esempio 6.10

Si calcoli il volume del solido

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : (1-z)^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1-z\}.$$

Il solido è ottenuto ruotando attorno all'asse z la figura

$$G = \{(x, z) : 1-z \leq x \leq \sqrt{1-z}, 0 \leq z \leq 1\}.$$

Si ha allora

$$m(S) = \pi \int_0^1 [1-z - (1-z)^2] dz = \frac{\pi}{6} \cdot \blacksquare$$

Per quanto riguarda il baricentro dei solidi di rotazione, è evidente che, nel caso di una rotazione completa, esso si troverà sull'asse z . Sarà allora sufficiente calcolare la quantità $\bar{z}$, o se si vuole la sua altezza. Risulta

$$\bar{z} = \frac{1}{m(E)} \int_E z dx dy dz = \frac{\pi}{m(E)} \int_a^b z [g^2(z) - f^2(z)] dz.$$

Esempio 6.11

L'altezza del baricentro del solido S dell'esempio precedente è data da

$$6 \int_0^1 z [1-z - (1-z)^2] dz = \frac{1}{2} \cdot \blacksquare$$

Le coordinate polari, e ancor più quelle cilindriche, sono utili per il calcolo del momento d'inerzia di un solido rispetto a un asse. Ricordiamo che si definisce *momento d'inerzia* del solido E rispetto a una retta r la quantità

$$I_r = \int_E \text{dist}(\mathbf{x}, r)^2 dx.$$

In particolare, i momenti d'inerzia rispetto ai tre assi x , y e z sono dati rispettivamente da

$$I_x = \int_E (y^2 + z^2) dx dy dz$$

$$I_y = \int_E (x^2 + z^2) dx dy dz$$

$$I_z = \int_E (x^2 + y^2) dx dy dz.$$

Se poi E è un solido di rotazione, ottenuto ruotando attorno all'asse z la figura $F = \{(x, z) : a \leq z \leq b, f(z) \leq x \leq g(z)\}$, si ha

$$I_z = \int_a^b dz \int_{f(z)}^{g(z)} \varrho^3 d\varrho \int_0^{2\pi} d\vartheta = \frac{\pi}{2} \int_a^b [g^4(z) - f^4(z)] dz.$$

Esempio 6.12

Il momento d'inerzia rispetto all'asse z del solido S degli esempi precedenti è

$$I_z = \frac{\pi}{2} \int_0^1 [(1-z)^2 - (1-z)^4] dz = \frac{\pi}{15} \cdot \blacksquare$$

Esercizi

Si calcolino i seguenti integrali

$$149. \int_E x^2 dx dy dz \qquad 150. \int_E (x^2 - y^2) dx dy dz$$

$$151. \int_E (x^2 - z^2) dx dy dz \qquad 152. \int_E y^2 \ln z dx dy dz$$

con

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : z > 0, x^2 + y^2 + 1 \leq z^2 \leq 4\}.$$

$$153. \int_E x^2 dx dy dz \qquad 154. \int_E z dx dy dz$$

$$155. \int_E e^{x^2+y^2} z dx dy dz \qquad 156. \int_E x^2 \sin \frac{\pi z}{2} dx dy dz$$

$$157. \int_E y^2 \cos \frac{\pi z}{2} dx dy dz \quad 158. \int_E \frac{|x|}{1+\sqrt{z}} dx dy dz$$

dove $E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$.

Si calcolino il volume, l'altezza del baricentro e il momento d'inerzia rispetto all'asse z dei solidi ottenuti facendo ruotare attorno all'asse z le seguenti figure:

$$159. G = \{(x, z) : 0 \leq x \leq \ln(z + \sqrt{z^2 - 1}), 1 \leq z \leq a\}$$

$$160. G = \{(x, z) : 0 \leq x \leq \frac{e^z + e^{-z}}{2}, 0 \leq z \leq a\}$$

$$161. G = \{(x, z) : \sqrt{z-1} \leq x \leq \sqrt{4-z}, 1 \leq z \leq 2\}$$

$$162. G = \{(x, z) : 0 \leq x \leq (a^{2/3} - z^{2/3})^{3/2}, 0 \leq z \leq a\}$$

$$163. G = \{(x, z) : 1 \leq a \leq z \leq b, 0 \leq x \leq \sqrt{z^2 - 1}\}$$

164. Si calcoli il volume del solido delimitato dalle superfici $z = x^2 + y^2$ e $z = \sqrt{3 - 2(x^2 + y^2)}$.

165. Si determini il volume dell'intersezione del cilindro $x^2 + y^2 - ax = 0$ e della sfera con centro nell'origine e raggio a .

166. Si calcoli il volume del solido ottenuto facendo ruotare la cardiode, di equazione $0 \leq \rho \leq a(1 + \cos \vartheta)$, $0 \leq \vartheta \leq \pi$, attorno all'asse x .

167. Si calcoli

$$\int_V \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{z} \right) dx dy dz,$$

dove

$$V = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2, z \geq 0\}.$$

168. Si calcoli il momento d'inerzia rispetto all'asse x del solido ottenuto ruotando la cicloide attorno a questo asse.

7 Derivazione sotto il segno di integrale

Ricordiamo dalle *Lezioni* (cap. 6, §9) alcuni risultati concernenti la continuità e la differenziabilità di integrali dipendenti da un parametro.

Teorema 7.1 Siano E un insieme misurabile di $\mathbf{R}^n$, A un aperto di $\mathbf{R}^k$, e $f(\mathbf{x}, \mathbf{t})$ una funzione definita in $E \times A$. Supponiamo che f sia integrabile in $\mathbf{x}$ per ogni $\mathbf{t} \in A$ e continua in $\mathbf{t}$ per quasi ogni $\mathbf{x} \in E$, e che esista una funzione

$g(\mathbf{x})$ sommabile in E e tale che $|f(\mathbf{x}, \mathbf{t})| \leq g(\mathbf{x})$ per quasi ogni $\mathbf{x} \in E$ e per ogni $\mathbf{t} \in A$. Allora la funzione

$$F(\mathbf{t}) = \int_E f(\mathbf{x}, \mathbf{t}) dx$$

è continua in A .

Questo teorema è una generalizzazione del teorema della convergenza dominata (*Lezioni*, cap. 6, Teorema 4.3), e si dimostra esattamente allo stesso modo.

Teorema 7.2 Se inoltre per quasi ogni $\mathbf{x} \in E$ la funzione $f(\mathbf{x}, \mathbf{t})$ è di classe $C^1(A)$, e se esistono k funzioni sommabili $g_1(\mathbf{x}), g_2(\mathbf{x}), \dots, g_k(\mathbf{x})$ tali che per quasi ogni $\mathbf{x} \in E$ e per ogni $\mathbf{t} \in A$ risulti

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t_i}(\mathbf{x}, \mathbf{t}) \right| \leq g_i(\mathbf{x}) \quad (i = 1, 2, \dots, k),$$

allora la funzione F è di classe $C^1(A)$, e si ha

$$\frac{\partial F}{\partial t_i}(\mathbf{t}) = \int_E \frac{\partial f}{\partial t_i}(\mathbf{x}, \mathbf{t}) dx.$$

Naturalmente, se si vuole dimostrare la continuità [o la differenziabilità] di F in un intorno di un punto $\mathbf{t}_0 \in A$, sarà sufficiente verificare le ipotesi del teorema, in particolare la disuguaglianza $|f(\mathbf{x}, \mathbf{t})| \leq g(\mathbf{x})$, in questo intorno. Questa osservazione è utile specialmente quando A non è limitato, o quando la funzione f tende all'infinito per $\mathbf{t}$ che si avvicina alla frontiera di A .

Una conseguenza di questo teorema ($k = n = 1$) è la formula della derivata della funzione

$$G(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x, t) dx.$$

Se, oltre alle ipotesi precedenti, si suppone anche che le funzioni $\alpha(t)$ e $\beta(t)$ siano derivabili in $A = (a, b)$, si ha

$$G'(t) = f(\beta(t), t) \beta'(t) - f(\alpha(t), t) \alpha'(t) + \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx.$$

Calcolare i seguenti integrali:

$$177. \int_D \cos \frac{x-y}{x+y} dx dy$$

$$178. \int_D \frac{x^2 y}{1+xy} dx dy$$

$$179. \int_D x \ln(1+y) dx dy$$

nei quali D è il triangolo di vertici $(0,0)$, $(0,1)$ e $(1,0)$.

$$180. \int_P \frac{y}{1+x} dx dy dz$$

$$181. \int_P \frac{dx dy dz}{1+x+y+z}$$

dove P è il tetraedro di vertici $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ e $(0,0,1)$.

$$182. \int_E e^{xy} \ln^3 x dx dy$$

$$183. \int_E (x+y) dx dy$$

dove E è il dominio limitato dalle rette $x=1$ e $x=e^3$ e dalle curve $y=\frac{1}{x}$ e $y=\frac{\ln x}{x}$.

$$184. \int_T [x \sin(x+y) - 2y \cos(x+y)] dx dy$$

$$185. \int_T x^2 e^y dx dy$$

in cui T è il quadrato di vertici $(0,1)$, $(1,0)$, $(0,-1)$ e $(-1,0)$.

$$186. \int_E x^2 dx dy$$

$$187. \int_E y \arccos x dx dy$$

dove $E = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq x^2 - 1\}$.

$$188. \int_E y \cos(x+z) dx dy dz$$

$$189. \int_E \frac{xy}{1+y^2} dx dy dz$$

dove E è l'insieme caratterizzato dalle disuguaglianze $0 \leq z \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq y \leq \sqrt{x}$, $z \leq x+z \leq \frac{\pi}{2}$.

$$190. \int_K \sin y dx dy dz$$

$$191. \int_K x^2 dx dy dz$$

$$192. \int_K (z^2 - y^2) dx dy dz$$

in cui K è il cono con vertice $(0,1,0)$ e base l'ellisse $x^2 + \frac{z^2}{9} \leq 1$, contenuta nel piano $y=0$.

$$193. \int_D xy dx dy$$

$$194. \int_D \frac{y}{x} dx dy$$

$$195. \int_D (x+y) dx dy$$

con $D = \{(x,y) : x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x+2y \leq 3, x^2 - 4y^2 \geq 1\}$.

Figura 5.2

$$196. \int_E (x^2 + y^2) dx dy dz$$

$$197. \int_E \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$198. \int_E \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2 + 2z^2}$$

dove E è la porzione della palla unitaria che sta al di sopra del piano orizzontale $z = \cos \alpha$ (fig. 5.2).

$$199. \int_E x dx dy$$

$$200. \int_E (x-y) dx dy$$

$$201. \int_E (xy-x) dx dy$$

$$202. \int_E \frac{x dx dy}{1+xy}$$

dove

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy \leq 1\}.$$

203. Provare che ogni insieme misurabile $E \subset \mathbb{R}^n$ si può scrivere come l'unione di un'infinità numerabile di compatti e di un insieme di misura nulla.

204. Si dice che un insieme E ha *frontiera continua*, se per ogni punto di ∂E esiste un intorno U tale che $\partial E \cap U$ è grafico di una funzione continua. Dimostrare che ogni insieme E con frontiera ∂E continua è misurabile.

Calcolare il volume, le coordinate del baricentro, e i momenti d'inerzia rispetto ai tre assi, dei solidi

$$205. D = \{(x,y,z) : 4(x^2 + y^2) \leq z \leq x^2 + y^2 + 3\}$$

$$206. D = \{(x,y,z) : 2x^2 y^2 + z^2 \leq 1, 1 \leq y \leq 2\}.$$

207. Calcolare l'area racchiusa dalla curva di equazione

$$\left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{25}.$$

7. Poiché per un cubo si ha $m(Q) = \left(\frac{\text{diam}(Q)}{\sqrt{n}}\right)^n$, se E ha misura nulla esisterà (vedi l'esercizio precedente) un'infinità numerabile di cubi Q_k con $\bigcup Q_k \supset E$ e $\sum (\text{diam}(Q_k))^n < n^{n/2}\epsilon$. Supponiamo viceversa che esistano degli insiemi con le proprietà richieste. Ognuno di questi insiemi E_k si può mettere in un cubo Q_k di lato uguale a $\text{diam}(E_k)$. Di conseguenza, si ha $E \subset \bigcup Q_k$, e $\sum m(Q_k) = \sum (\text{diam}(E_k))^n < \epsilon$.

8. Poiché risulta $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$, per ogni $G \subset \mathbf{R}^n$ si ha $\text{diam}(f(G)) \leq M \text{diam}(G)$. Supponiamo ora che $m(E) = 0$. Per ogni $\epsilon > 0$ esisterà un ricoprimento numerabile E_k di E , con $\sum (\text{diam}(E_k))^n < \epsilon$. Gli insiemi $F_k = f(E_k)$ sono un ricoprimento numerabile di $f(E)$, e si ha $\text{diam}(F_k) \leq M \text{diam}(E_k)$. Ma allora $\sum (\text{diam}(F_k))^n \leq M^n \sum (\text{diam}(E_k))^n < M^n \epsilon$.

9. $F_t = \mathbf{R}$ se $t < 0$, $F_t = [0, 1]$ se $0 \leq t < 1$, $F_t = \emptyset$ se $t \geq 1$.

10. La funzione è continua in $\mathbf{R}^2$ privato dell'asse delle y , e dunque i relativi insiemi $\tilde{F}_t$ sono aperti. D'altra parte, gli insiemi F_t differiscono dagli $\tilde{F}_t$ per l'aggiunta di parti dell'asse delle y , che ha misura nulla, e dunque sono anch'essi misurabili.

11. Posto $\Phi_t = \{x \in A : 1/f(x) > t\}$, risulta

$$\Phi_t = \begin{cases} \{x \in A : 0 < f(x) < 1/t\} & \text{se } t > 0 \\ F_0 = \{x \in A : f(x) > 0\} & \text{se } t = 0 \\ F_0 \cup \{x \in A : f(x) < 1/t\} & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

e quindi Φ_t è misurabile per ogni t .

12. Risulta $F = F_0' \cap F_0'''$.

13. Se A è un aperto di $\mathbf{R}$, si ha $(u \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(u^{-1}(A))$. Poiché u è continua, $u^{-1}(A)$ è un aperto, e dunque $f^{-1}(u^{-1}(A))$ è misurabile.

14. Si ha infatti $f^- \leq \psi^-$ [ovvero $f^+ \leq \psi^+$], e dunque l'integrale di f^- [o di f^+] è finito. Se poi $|f| \leq \psi$, ambedue gli integrali sono finiti, e f è sommabile.

15. Se f è sommabile, gli integrali di f^+ e f^- sono finiti, e quindi è finito anche quello di $|f| = f^+ + f^-$. Il viceversa segue dall'esercizio precedente.

16. $\frac{\pi}{6} - \frac{7}{18}$

18. $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}$

20. $\frac{3\pi}{32}$

22. $\frac{9}{2} \ln 3 - \frac{14}{3}$

24. $\frac{\pi}{24}$

26. $-\frac{29}{9} + 3\sqrt{\frac{3}{2}} \ln(\sqrt{3} + \sqrt{2})$

17. $\frac{3}{2} - \sin 1 - \cos 1$

19. $-\frac{3}{16}$

21. $\frac{4}{21}$

23. $\frac{16}{3} \ln 3 - \frac{52}{9}$

25. $\pi - 2$

27. $\frac{12}{5} \ln 2 - \frac{284}{25} + \frac{16\pi}{5}$

28. $\frac{1}{2} \left(e + \frac{1}{e} - 2 \right)$

30. $\cos 1 - \frac{1}{2} (1 + \cos 2)$

32. $\frac{10}{3} - \frac{7\pi}{8}$

34. $2 \ln 3 - 2 - 3\pi + 8\sqrt{2} \arctg \sqrt{2}$

36. $\frac{1}{3}$

38. $\frac{5}{36}$

40. $6 \cos 1 + 10 \sin 1 - \frac{23}{2}$

42. $\frac{3}{4} + 2 \ln 2 - \frac{15}{8} \ln 3$

44. $\ln 2 - \frac{5}{12}$

46. $\frac{\pi}{6} - \frac{7}{18}$

47. $\frac{\pi}{12} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{4}{3} + \frac{1}{3\sqrt{2}} \ln(3 - 2\sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{3} (\arctg(\sqrt{2} - 1) - \arctg(\sqrt{2} + 1))$

48. $\frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{\pi}{9}$

50. $\frac{5}{6}$

52. $-\frac{3}{2} + 3 \ln 3 - 2 \ln 2$

54. $\frac{1}{3}$

56. $1 - \ln 2$

58. $\ln 2$

60. $\frac{7}{3} - \sqrt{3}$

62. $\frac{1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{12}$

64. $\frac{1}{240}$

29. 0

31. $\frac{2\pi}{3} - \frac{14}{9}$

33. $\frac{26}{3} - \frac{3\pi}{2}$

35. $2e - 4e^{-1}$

37. $\frac{5}{3} \ln 2 - \frac{11}{18}$

39. $\frac{\pi}{16}$

41. $22e - \frac{119}{2}$

43. $\frac{e}{2}$

45. $\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \ln(1 + \sqrt{2})$

49. $\frac{4}{\pi^2}$

51. $\frac{3\pi}{8} - \frac{1}{2}$

53. $2 - \frac{4}{3} \ln 2$

55. $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$

57. $\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \ln 2$

59. $\frac{3 - e}{2}$

61. $\frac{3}{2}$

63. $\frac{9e - 3}{4}$

65. $\frac{347}{1890}$

66. $\frac{1}{12}$

68. $\frac{5\pi}{24} - \frac{11}{18}$

70. $-\frac{19}{72}$

72. $\frac{4}{9} - \frac{5\pi}{48}$

74. $\frac{3}{4}$

76. $\frac{11e}{6} - \frac{7}{3}$

78. $\frac{1}{6} \arctg 2 - \frac{11}{24} \ln 5 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \ln 2$

80. $\frac{27}{4} \ln 3 - \frac{91}{18}$

81. $\frac{a^6}{48}$. D è il tetraedro di vertici $(0, 0, 0)$, $(a, 0, 0)$, $(a, 0, a)$ e (a, a, a) .

82. Gli insiemi Φ_t sono misurabili, dato che $\Phi_t = F_t' \cap F_t''$. Poiché tutti i Φ_t sono disgiunti, al più un numero finito di essi ha misura maggiore di 1, in quanto la misura della loro unione, che è la somma delle loro misure, non può superare $m(E)$. Analogamente sono in numero finito quelli con misura compresa tra $\frac{1}{2}$ e 1, quelli tra $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{2}$, e così via. Ne segue che gli insiemi Φ_t con misura maggiore di zero sono al più un'infinità numerabile.

83. Per ogni intero n , i valori di t per i quali la misura di $\Phi_t \cap I_n$ è diversa da zero formano al più un insieme T_n numerabile. L'unione di tutti questi T_n è ancora numerabile.

84. Si ha infatti $m(F_t'') = m(F_t')$ per ogni t , tranne al più un insieme numerabile, e dunque per quasi ogni t .

85. Si ha

$$\{x \in E : |u(x)|^p > s\} = \{x \in E : |u(x)| > s^{1/p}\} = U_{s^{1/p}}$$

e quindi, usando la [4.1],

$$\int_E |u|^p dx = \int_0^\infty m(U_{s^{1/p}}) ds.$$

La tesi segue dal cambiamento di variabile $s = t^p$.

86. $\frac{8}{5} \sqrt{2} - \frac{59}{30}$

88. $\frac{20}{9} (1 - \sqrt{2}) + \frac{4}{3} \ln \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$

67. $e - \frac{65}{24}$

69. $\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4}$

71. $\frac{1}{24} \left(\frac{1}{\pi} - \frac{12}{\pi^2} + \frac{48}{\pi^3} \right)$

73. $\frac{1}{2} (e - 2)$

75. $-\frac{185}{36}$

77. $-\frac{3}{8} + \cos 1$

79. $\frac{26}{3}$

87. $\frac{28}{15} \sqrt{2} - \frac{13}{5}$

89. $\frac{8}{5} (3\sqrt{2} - 4)$

90. $-\frac{25}{6} \ln 2 + \frac{17}{6} \ln 3 - \frac{1}{6}$

92. $\frac{13}{108}$

94. $2(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

96. $(\sqrt{2} - 1)\sqrt{3} \ln 3 - (\sqrt{3} - 1)\sqrt{2} \ln 2$

98. $\frac{\sin 1}{2}$

100. $\frac{14}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{17}} \right)$

102. $\frac{2}{e} (e^2 - 1)(e - 1)$

104. 0

106. $\ln 2 \ln \frac{3}{2}$

108. $\frac{9}{2} \ln 3 - \frac{4}{3} \ln 2 - \frac{19}{18}$

110. $\frac{1}{2} \ln \frac{1+b}{1+a}$

111. $\frac{1}{45}$

113. Per $t > 1$ si ha $\int_{B_t - B} |x|^\alpha dx = \frac{\pi}{\alpha + 2} (t^{\alpha+2} - 1)$. Passando al limite per $t \rightarrow +\infty$, si

ottiene la tesi. Il valore dell'integrale, per $\alpha < -2$, è $\frac{-\pi}{\alpha + 2}$.

114. $\alpha > -3; \frac{4\pi}{\alpha + 3}$

116. $\alpha > -p - 1; \frac{2}{\alpha + p + 1}$

118. $\alpha > 0$ se $p \leq 1$; $\alpha > -1 + \frac{1}{p}$ se $p > 1$

119. $\frac{1}{e}$

121. $\frac{21\pi}{8}$

91. $\frac{1}{16} \left(3 \arctg 2 - \frac{3\pi}{4} + \frac{3}{10} \right)$

93. $\frac{3}{16} + \frac{37}{16} \ln 2 - \frac{27}{16} \ln 3$

95. $\frac{1}{2}$

97. $\frac{1}{8} \ln 2 (6 \ln 3 - 3 \ln 2 - 2)$

99. $\frac{3\pi}{4} - 3 \arctg \frac{1}{4}$

101. $2 \ln^2 2$

103. $\frac{1}{2} e^{-2} (e^4 - 1)(e^2 - 1) + 2e(2e - 3) + 2e^{-1}$

105. $9 \ln 3 - 4 \ln 2 - 6$

107. $\frac{3}{8} e^2 (5e - 2)$

109. $-\frac{2}{\pi^2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{3} \right)$

112. $\left(\frac{3}{14}, \frac{3}{14}, \frac{9}{112} \right)$

115. $\alpha < -3; \frac{-4\pi}{\alpha + 3}$

117. $\alpha > -1 - 2p; \frac{\pi}{\alpha + 2p + 1}$

120. $\frac{1}{6} \ln \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \ln 3 - \frac{4}{9}$

122. $\frac{3\pi}{2}$

123. $3\pi(\sqrt{2}-1)$

125. $\frac{\ln 6}{5}$

127. $e^2 - \frac{3}{2}$

129. $\frac{3\pi}{8}$

131. $\frac{4\sqrt{2}-5}{3}\pi$

133. $\frac{\pi}{2}(1-\ln 2)$

135. $m(E) = 1 + \sqrt{2}$, $\bar{x} = \frac{1}{2(1+\sqrt{2})} \left(\frac{9\pi}{8}, \frac{9\pi}{8} + \frac{3}{2}, \left(\frac{3\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) \ln 2 \right)$

136. $\frac{\pi}{2} - 1$

138. $\frac{4a^2}{105}$

140. $\frac{\pi}{4}$

142. $\frac{3\pi}{4}$

144. $\frac{105\pi}{2}$

146. $\frac{\pi}{384}$

148. $\frac{\pi}{64}(4\ln 2 - 9)$

150. 0

152. $\frac{\pi}{2} \left(\frac{23}{15} \ln 2 - \frac{77}{225} \right)$

154. $\frac{\pi}{3}$

156. $\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}$

158. $-\frac{14}{9} + \frac{8}{3} \ln 2$

124. $2\sqrt{2}\pi \ln 2$

126. $\frac{7}{3}$

128. $\frac{9}{2} \ln 3 - \frac{2}{3} \ln 2 - \frac{115}{36}$

130. $\frac{\pi}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right)$

132. $\frac{\pi}{16}$

134. $\frac{\pi}{2}$

137. $\frac{4-\pi}{4} a^4$

139. π

141. $\frac{5\pi}{2}$

143. $\frac{2\pi}{3} - \ln(2 + \sqrt{3})$

145. $\frac{\pi}{5} \left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8} \right)$

147. $2\pi(2\sqrt{e}-3)$

149. $\frac{19\pi}{30}$

151. $-\frac{97\pi}{30}$

153. $\frac{\pi}{12}$

155. $\frac{\pi}{2}$

157. $\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}$

159.

$$V = \pi \left(aL^2 - 2\sqrt{a^2-1}L + 2(a-1) \right)$$

$$h = \frac{\pi}{4V} \left(2a^2L^2 + a^2 - 1 - L^2 - 2a\sqrt{a^2-1}L \right)$$

$$I_z = \pi \left[12(a-1) + \frac{a}{2}L^2(L^2+12) - 2\sqrt{a^2-1}L(L^2+6) \right]$$

$$L = \ln(a + \sqrt{a^2-1})$$

160. $V = \frac{\pi}{4}(2a + \sinh 2a)$; $h = \frac{2a^2 + 2a \sinh 2a + 1 - \cosh 2a}{4a + 2 \sinh 2a}$; $I_z = \frac{\pi}{64}(\sinh 4a + 8 \sinh 2a + 12a)$

161. $V = 2\pi$; $h = \frac{17}{12}$; $I_z = 3\pi$ 162. $V = \frac{16\pi a^3}{105}$; $h = \frac{21a}{128}$; $I_z = \frac{512\pi a^5}{15015}$

163.

$$V = \frac{\pi}{3}(b-a)(b^2+ab+a^2-3)$$

$$h = \frac{3}{4}(b+a) \frac{b^2+a^2-2}{b^2+a^2+ab-3}$$

$$I_z = \frac{\pi}{2} \left\{ \frac{b^5-a^5}{5} - 2 \frac{b^3-a^3}{3} + b-a \right\}$$

164. $\left(-\frac{5}{6} + \sqrt{3}\right)\pi$ 165. $\frac{4a^3}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\right)$ 166. $\frac{8\pi a^3}{3}$

167. $\frac{\pi^2}{4} + \frac{\pi}{2} \ln 2$ 168. $\frac{63}{8} \pi^2 a^5$

169. Si ha $F'(t) = -p \int_E |u(x)-t|^{p-2}(u(x)-t) dx$, e $F''(t) = p(p-1) \int_E |u(x)-t|^{p-2} dx > 0$.

In particolare, $\varphi_p(t)$ è convessa, e tende all'infinito quando $|t|$ tende all'infinito. Ne segue che F ha un unico minimo.

170. Risulta $\frac{t^2 x \sqrt{|x|}}{1+t^2 x^2} \leq \frac{1}{\sqrt{|x|}}$, che è sommabile in $(-1, 4)$. Passando al limite, si ottiene $\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}} = 2$.

171. 2

172. Risulta $2\sqrt{tx} \leq t+x$, e dunque la funzione integranda si maggiora con $3/2$. Passando al limite, si ottiene il valore 1.

173. 3

174. Si ha $F' = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^2y^2)} = \frac{\pi}{2(1+y)}$. Di qui, osservando che $F(0) = 0$, si trova

$$F(y) = \frac{\pi}{2} \ln(1+y).$$

175. Risulta $F(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. Inoltre,

$$F'(x) = - \int_1^{+\infty} \left(x + \frac{1}{t}\right) \frac{e^{-tx}}{t} dt, \quad F''(x) = \int_1^{+\infty} x e^{-tx} dx = e^{-x}.$$

Da quest'ultima relazione segue che $F(x) = e^{-x} + Ax + B$, e dunque $F(x) = e^{-x}$.

176. Per $\tau > 0$, poniamo $t = 1/\sqrt{\tau}$. Essendo per definizione $f_t(\mathbf{x}) = \min\{f(\mathbf{x}), t\}$, si ha

$$\int_E f_t dx \leq \int_{E-I_t} f dx + tm(I_t \cap E).$$

D'altra parte $f(\mathbf{x})$ è limitata in $E - I_t$, e dunque esisterà un τ , che potremo sempre supporre maggiore di t , tale che $f(\mathbf{x}) \leq \tau$ in $E - I_t$. Ne segue che

$$\int_{E-I_t} f dx = \int_{E-I_t} f_t dx \leq \int_E f_t dx,$$

e confrontando con la precedente:

$$\int_E f_t dx - tm(I_t) \leq \int_{E-I_t} f dx \leq \int_E f_t dx.$$

La tesi segue facendo tendere τ a zero, e osservando che, per come si è scelto t , si ha $tm(I_t) \rightarrow 0$.

177. $\frac{\sin 1}{2}$

179. $\frac{4}{3} \ln 2 - \frac{8}{9}$

181. $\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4}$

183. $e^3 - 8e^{-3} - \frac{5}{2} + 2e + 4e^{-1}$

185. $4e + \frac{4}{e} - 12$

187. $\frac{\pi}{15}$

178. $\frac{13}{6} + \sqrt{5} \ln \frac{3-\sqrt{5}}{2}$

180. $\frac{4}{3} \ln 2 - \frac{8}{9}$

182. $12e^3 - 6 - \frac{63}{4}e$

184. $\sin 1 - \cos 1$

186. $\frac{4}{15} + \frac{\pi}{8}$

188. $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$

189. $\frac{1}{12} \left\{ \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 - 3\frac{\pi}{2} - 2 \right\} \ln\left(1 + \frac{\pi}{2}\right) - \frac{5}{72} \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 + \frac{\pi^2}{24} + \frac{\pi}{12}$

190. $3\pi(2 \cos 1 - 1)$ 191. $\frac{3\pi}{20}$

192. $\frac{5\pi}{4}$ 193. $\frac{8}{27}$

194. $\frac{19}{8} \ln 3 - \frac{5}{4} \ln 5 - \frac{1}{2}$ 195. $\frac{3}{2}$

196. $\frac{\pi}{30} (8 - 15 \cos \alpha + 10 \cos^3 \alpha - 3 \cos^5 \alpha)$ 197. $2\pi(1 - \cos \alpha + \cos \alpha \ln \cos \alpha)$

198. $2\pi \left(\frac{\pi}{4} - \arctg(\cos \alpha) \right) - \pi \cos \alpha \ln \left(1 + \frac{\lg^2 \alpha}{2} \right)$

199. $\frac{7}{4}$ 200. 0

201. $\ln 2 - \frac{3}{2}$ 202. $\frac{5}{2} \ln 2 - \frac{1}{2}$

203. Per ogni $\epsilon > 0$ esistono un aperto $A \supset E$ e un compatto $K \subset E$, con $m(A) - m(K) < \epsilon$. Prendiamo $\epsilon = 1/s$, $s = 1, 2, \dots$, e siano A_s e K_s l'aperto e il compatto corrispondenti. Poniamo $F = \bigcup K_s$ e $G = \bigcap A_s$. Si ha $F \subset E \subset G$ e $m(G) - m(F) = 0$, cosicché a maggior ragione $m(E) - m(F) = 0$. Ne segue che E è l'unione dei compatti K_s e dell'insieme $E - F$ di misura nulla. Si osservi che abbiamo anche dimostrato che E è l'intersezione di un'infinità numerabile di aperti A_s , meno un insieme $G - E$ di misura nulla.

204. Sia $\mathbf{x} \in \partial E$, e sia U un intorno di $\mathbf{x}$ tale che $\partial E \cap U$ è grafico di una funzione continua. Per l'esercizio 2, $\partial E \cap U$ ha misura nulla. Poiché ∂E si può ricoprire con un'infinità numerabile di tali intorni (dimostrarlo), si può concludere che ∂E ha misura nulla, e dunque, per l'esercizio 4, E è misurabile.

205. $V = \frac{3\pi}{2}$; $\bar{\mathbf{x}} = \left(0, 0, \frac{7}{3}\right)$; $I_x = I_y = \frac{19\pi}{2}$, $I_z = \frac{\pi}{2}$

206. $V = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \ln 2$, $\bar{\mathbf{x}} = \left(0, \frac{1}{\ln 2}, 0\right)$, $I_x = \frac{\pi}{4\sqrt{2}} (6 + \ln 2)$, $I_y = \frac{\pi}{4\sqrt{2}} \left(\frac{3}{16} + \ln 2\right)$, $I_z = \frac{99\pi}{64\sqrt{2}}$

207. $\frac{39\pi}{25}$ 208. $\alpha > -2$

209. Per ogni aperto A di $\mathbf{R}$, $u^{-1}(A)$ è un insieme misurabile. Per l'esercizio 203, quest'ultimo insieme è unione di una famiglia numerabile di compatti K_s , e di un insieme T di misura nulla. Poiché f^{-1} è continua, segue dal teorema di Weierstrass che $f^{-1}(K_s)$ è un compatto per ogni s . Inoltre, per l'esercizio 8, $f^{-1}(T)$ ha misura nulla. In conclusione, $(u \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(u^{-1}(A))$ è unione di un'infinità numerabile di compatti e di un insieme di misura nulla, e dunque è misurabile.