

Esercizi Matematica 2 per Matematici Ottobre 2005 - IV settimana

- 1) Calcolare z^{-1} , w^{-1} , zw , zw^{-1} , $z^{-1}w$, z^2 , z^3 , z^4 , le radici quadrate di z e le radici cubiche di z per le seguenti coppie:
 - (a) $z = 1 + i$, $w = 2 - i$;
 - (b) $z = 1 - i$, $w = 1 + 2i$;
 - (c) $z = 2e^{i\pi/3}$, $w = 3e^{i\pi/4}$
 - (d) $z = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$, $w = i$
 - (e) $z = \cos \theta + i \sin \theta$, $w = \pm i$
 - 2) Si studino le proprietà di iniettività, suriettività, eventuali inverse destre e sinistre per le seguenti funzioni $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$:
 - (1) $f_1(z) = z^2 + i$;
 - (2) $f_2(z) = (z + i)^2$;
 - (3) $f_3(z) = z - \bar{z}$;
 - (4) $f_4(z) = z/|z|$ se $z \neq 0$, $f_4(0) = 0$.
 - (5) $f_5(z) = z/\bar{z}$ se $z \neq 0$, $f_5(0) = 0$.
- Per ogni $w \in \mathbf{C}$, si determini la sua controimmagine per ciascuna delle funzioni date.
- 3) Si consideri l'insieme $\{z^n | n \in \mathbf{N}\}$ per un fissato $z \in \mathbf{C}$; trovare condizioni necessarie e sufficienti affinché:
 - (a) l'insieme sia finito;
 - (b) l'insieme ammetta una infinità di elementi tra loro allineati;
 - (c) l'insieme sia tutto contenuto nel cerchio unitario;
 - (d) l'insieme sia tutto esterno al cerchio unitario.
 - 4) Come l'esercizio precedente per l'insieme delle radici n -esime di z al variare di n .
 - 5) Definiamo $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbf{C} | |z| = 1\}$ (circolo unitario o circonferenza unitaria) e $R(1) = \{z \in \mathbf{C} | z^n = 1 \text{ per qualche } n \in \mathbf{N}\}$ (radici dell'unità). Mostrare che $R(1) \subseteq \mathbb{S}^1$ e che l'inclusione è stretta. Come si caratterizzano gli elementi di $R(1)$ in termini dell'argomento? Determinare le cardinalità di $R(1)$ e di \mathbb{S}^1 .
 - 6) È vero che tra due punti di \mathbb{S}^1 si trova sempre qualche punto di $R(1)$ (nel senso della geometria di \mathbb{S}^1 nel piano di Gauss)?
 - 7) Scrivere (e disegnare sul piano di Gauss) le radici n -esime di $-i$, $1+i$, $1-i$ per $n = 2, 3, 4, 5, 6$.
 - 8) Determinare $\cos(5t)$, $\cos(8t)$, $\sin(6t)$, $\sin(9t)$ in termini delle funzioni trigonometriche di argomento t (e loro potenze).
 - 9) Calcolare $\sin^3 t$, $\sin^4 t$, $\cos^5 t$, $\cos^6 t$ in termini delle funzioni trigonometriche di argomento t (e multipli di t).
 - 10) Dimostrare le formule sul parallelogramma per i numeri complessi, e dare un'interpretazione geometrica.
 - 11) Dare l'interpretazione geometrica nel piano di Gauss della inversione dei numeri complessi: se $z = \varrho e^{i\theta}$ allora $z^{-1} = \varrho^{-1} e^{-i\theta}$.
 - 12) Dare l'interpretazione geometrica nel piano di Gauss del passaggio all'opposto dei numeri complessi: se $z = \varrho e^{i\theta}$ allora $-z = \varrho e^{(i\theta+\pi)}$.
 - 13) Dare rappresentazioni grafiche nel piano di Gauss per la differenza e la divisione tra numeri complessi.
 - 14) Rappresentare nel piano di Gauss tutti i logaritmi complessi di e e di ie . Per un qualsiasi $z = \varrho e^{i\theta}$ disegnare nel piano di Gauss la famiglia dei suoi logaritmi.

- 15) Se $|z| = 1$, è vero che le radici n esime di z si ottengono ruotando opportunamente (e di quanto?) le radici n -esime dell'unità?
- 16) Calcolare le lunghezze dei lati dei poligoni regolari di n lati inscritti nella circonferenza unitaria.
- 17) Mostrare che la funzione $\mathbb{S}^1 \times \mathbf{R}_{>0} \rightarrow \mathbf{C} \setminus \{0\}$ che manda (ξ, ϱ) nel prodotto $\xi\varrho$ è una biiezione. Scrivere la funzione inversa.
- 18) Il semipiano di Poincaré è definito da $\mathfrak{P} = \{z \in \mathbf{C} | \operatorname{Im}(z) > 0\}$ (numeri complessi la cui parte immaginaria è positiva). Il disco unità è $\mathfrak{D} = \{z \in \mathbf{C} | |z| < 1\}$ (numeri complessi di modulo strettamente inferiore a 1). Mostrare che la funzione $f(z) = \frac{z-i}{z+i}$ è una biiezione $\mathfrak{P} \rightarrow \mathfrak{D}$. Determinare l'immagine della semicirconferenza di centro origine e raggio 1; e della semiretta verticale passante per l'origine. Mostrare che i tratti di circonferenze di centro il punto $-i$ sono mandati in tratti di circonferenze di centro il punto 1.
- 19) Siano a, b, c, d numeri reali tali che $ad - bc = 1$. Consideriamo la funzione (detta trasformazione lineare fratta) $s: \mathfrak{P} \rightarrow \mathfrak{P}$ (\mathfrak{P} è il semipiano di Poincaré) data da $s(z) = \frac{az+b}{cz+d}$. Mostrare che $\operatorname{Im}(s(z)) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|cz+d|^2}$, cosicché in effetti s è definita da \mathfrak{P} a \mathfrak{P} . Mostrare che s può essere scritta come composizione di funzione dei seguenti tre tipi: traslazione reale ($z \mapsto z + u$ con $u \in \mathbf{R}$), omotetie reali ($z \mapsto vz$ con $v \in \mathbf{R}$, $v > 0$), controinversioni ($z \mapsto -\frac{1}{z}$). Descrivere le figure formate da $s(z)$ se z descrive le semicirconferenze con centro sull'asse reale, oppure le semirette ortogonali all'asse reale.
- 20) *Formula di interpolazione di Lagrange.* Dati $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbf{C}$ (tutti distinti) e $b_0, b_1, \dots, b_n \in \mathbf{C}$ dimostrare che $F(X) = \sum_{i=0}^n b_i \frac{\prod_{j \neq i} (X - a_j)}{\prod_{j \neq i} (a_i - a_j)}$ è un polinomio di grado n che in a_i vale b_i per ogni $i = 0, \dots, n$.
- 21) Discutere la fattorizzazione in $\mathbf{C}[X]$, in $\mathbf{R}[X]$ e $\mathbf{Q}[X]$ dei polinomi $X^n + 1$ per ogni $n \in \mathbf{N}$; lo stesso per $X^n - 1$.