UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

ANALISI MATEMATICA III

Lauree in Fisica e Astronomia – A.A. 2024/25

Corrado Marastoni

Lezione di giovedì 09/01/2025

Analisi Matematica III (Fisica e Astronomia)

Test guidato di prova scritta (09/01/2025)

Università di Padova - Lauree in Fisica ed Astronomia - A.A. 2024/25

1. (a) Quali superfici di livello di $g(x, y, z) = x^2 + yz - \log(x - y + 2z)$ sono regolari? Detta S quella di $A(0, 1, 1)$, trovare lo spazio tangente affine e una parametrizzazione locale di S in A .
(b) Dire per quale $\alpha \in \mathbb{R}$ si ha che A è stazionario per $f(x, y, z) = x + \alpha y + z$ su S , determinandone la natura. Trovare poi gli estremi di tale f su $K = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 6, x + y \geq 0\}$.
2. Si consideri la funzione $f(x, y) = x \log(2 - \frac{y}{x})$.
(a) Studiare dominio, zeri, segno, curve di livello e limiti interessanti di f .
(b) Dire se ha senso l'integrale di f su $E = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 2x\}$; se sì, calcolarlo.
3. Si consideri nel piano verticale (x, z) l'insieme $A = \{(x, z) : x^2 + z^2 \leq R^2, z > 0, x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}R\}$, e sia D il solido di $\mathbb{R}^3$ ottenuto ruotando A di un quarto di giro in verso antiorario attorno l'asse z .
(a) Determinare area e baricentro di A , volume e momento d'inerzia di D rispetto all'asse z .
(b) Parametrizzare la porzione L della frontiera di D che fa parte della superficie sferica esterna; calcolarne poi l'area in due modi, sia usando la parametrizzazione che il teorema di Guldino.
(c) Verificare la formula di Kelvin-Stokes per L e per il campo $F = (0, 0, x)$.
(d) Detta B la porzione della frontiera di D sul piano orizzontale (x, y) , calcolare $\int_B xy^2 dx dy$ sia direttamente che tramite la formula di Green, verificando che il risultato non cambia.
4. È data l'equazione differenziale totale $(2xy - 1) dx - x^2 dy = 0$.
(i) Determinare le curve integrali dell'equazione.
(ii) Trovare gli equilibri e un integrale primo del sistema autonomo nel piano naturalmente associato all'equazione. Disegnarne poi le orbite e il verso di percorrenza.
(iii) L'insieme delle soluzioni del sistema ha qualche parità? Nel senso: se $\varphi(t) : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ (ove I è intervallo di $\mathbb{R}$) è soluzione, lo è necessariamente anche $-\varphi(t)$, o $\varphi(-t)$, o $-\varphi(-t)$, o nessuna?
(iv) Trovare il flusso del sistema, cioè le sue soluzioni al variare del dato $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.
5. Si consideri l'equazione differenziale $y'' + (1 - 2i)y' - 2iy = 2 \cos t - 5e^{-t}$ nell'incognita $y(t)$.
(a) Descrivere a priori la struttura dell'integrale generale, indi calcolarlo esplicitamente.
(b) Scrivere il sistema del primo ordine $Y' = AY + b(t)$ (ove $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$) equivalente all'equazione data; calcolarne poi e^{tA} e la soluzione con condizione iniziale nulla.

1. (a) (Figura 1a) Il gradiente di $g(x, y, z) = x^2 + yz - \log(x - y + 2z)$ è $\nabla g = (2x - \frac{1}{x-y+2z}, z + \frac{1}{x-y+2z}, y - \frac{2}{x-y+2z})$, che si annulla quando $2x = -z = \frac{1}{2}y = \frac{1}{x-y+2z}$: pertanto $y = 4x, z = -2x$ e $2x = \frac{1}{x-y+2z} = \frac{1}{x-(4x)+2(-2x)} = -\frac{1}{7x}$, ovvero $x^2 = -\frac{1}{14}$, impossibile. Ne segue che tutte le superfici di livello di g sono regolari. • Il punto $A(0, 1, 1)$ appartiene alla superficie di livello S data da $g(x, y, z) = g(A) = 1$, e lo spazio tangente affine a S in A è dato da $\nabla g(A) \cdot (x - 0, y - 1, z - 1) = (-1, 2, -1) \cdot (x, y - 1, z - 1) = 0$, ovvero il piano $x - 2y + z + 1 = 0$. Per una parametrizzazione locale, essendo $\frac{\partial g}{\partial x}(A) = -1 \neq 0$ possiamo esplicitare $x(y, z)$, ottenendo così una parametrizzazione locale $\gamma(y, z) = (x(y, z), y, z)$ con $x(1, 1) = 0, \nabla x(1, 1) = (2, -1)$ e (facendo ulteriori conti di derivazione dell'identità $g(x(y, z), y, z) \equiv 0$) l'hessiano $H_x(1, 1) = \begin{pmatrix} \ddot{x}_{yy}(1, 1) & \ddot{x}_{yz}(1, 1) \\ \ddot{x}_{yz}(1, 1) & \ddot{x}_{zz}(1, 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.
- (b) (Figura 1b) Il gradiente di $f(x, y, z) = x + \alpha y + z$ è $\nabla f = (1, \alpha, 1)$, e affinché A sia stazionario per f serve che $\nabla f(A) = (1, \alpha, 1)$ e $\nabla g(A) = (-1, 2, -1)$ siano dipendenti: questo dà $\alpha = -2$. Per capire il carattere di A per f su S basta comporre f con la parametrizzazione γ , ottenendo $F(y, z) := f(x(y, z), y, z) = x(y, z) - 2y + z$, e studiare il carattere del punto $(1, 1)$ per F . Si ha $F(1, 1) = f(0, 1, 1) = -1, \nabla F(y, z) = (\dot{x}_y - 2, \dot{x}_z + 1)$ (da cui $\nabla F(1, 1) = (\dot{x}_y(1, 1) - 2, \dot{x}_z(1, 1) + 1) = (0, 0)$, come previsto) e $H_F(y, z) = \begin{pmatrix} \ddot{F}_{yy} & \ddot{F}_{yz} \\ \ddot{F}_{yz} & \ddot{F}_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{x}_{yy} & \ddot{x}_{yz} \\ \ddot{x}_{yz} & \ddot{x}_{zz} \end{pmatrix} = H_x(y, z)$, da cui $H_F(1, 1) = H_x(1, 1) = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ che è definita positiva: ne segue che A è un punto di minimo locale stretto per f su S . • Nel compatto $K = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 6, x + y \geq 0\}$ non vi sono punti stazionari per $f(x, y, z) = x - 2y + z$ ne' tra i punti interni (il gradiente $\nabla f = (1, -2, 1)$ non si annulla mai) ne' tra i punti del disco posteriore $\left\{ \begin{matrix} x + y = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 < 6 \end{matrix} \right.$ (i due gradienti di f e della superficie del disco sono ovunque indipendenti). La condizione di stazionarietà per i punti sulla superficie sferica $\left\{ \begin{matrix} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y > 0 \end{matrix} \right.$ è data da $\left\{ \begin{matrix} \text{rango} \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} < 2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6, x + y > 0 \end{matrix} \right.$, ovvero $\left\{ \begin{matrix} x = z \\ y = -2x \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6, x + y > 0 \end{matrix} \right.$, con unica soluzione accettabile $P(-1, 2, -1)$. Infine, i punti stazionari sulla circonferenza $\left\{ \begin{matrix} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y = 0 \end{matrix} \right.$ sono dati da $\left\{ \begin{matrix} \det \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y = 0 \end{matrix} \right.$, ovvero $\left\{ \begin{matrix} x - y - 3z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y = 0 \end{matrix} \right.$, con soluzioni $Q_{\pm}(\pm 3\sqrt{\frac{3}{11}}, \mp 3\sqrt{\frac{3}{11}}, \pm 2\sqrt{\frac{3}{11}})$. Poiché $f(P) = -6 < f(Q_-) = -\sqrt{33} < f(Q_+) = \sqrt{33}$, il massimo assoluto di f su K è $\sqrt{33} \sim 5,7$ (assunto in Q_+) e il minimo assoluto è -6 (in P).
2. (a) (Figura 2) Il dominio di $f(x, y) = x \log(2 - \frac{y}{x})$ è dato da $x \neq 0$ e $2 - \frac{y}{x} > 0$, ovvero $\frac{2x-y}{x} > 0$: per $x \geq 0$ si ha dunque $y \leq 2x$. Nel dominio si ha $f(x, y) = 0$ quando $2 - \frac{y}{x} = 1$, ovvero sulla bisettrice $y = x$; si ha poi $\log(2 - \frac{y}{x}) > 0$ quando $2 - \frac{y}{x} > 1$ ovvero $\frac{x-y}{x} > 0$, pertanto vale $f(x, y) > 0$ se e solo se $y < x$. La curva di livello $C_k = \{(x, y) : f(x, y) = k\}$ è il grafico $y = x(2 - e^{k/x})$: notato che C_{-k} è la simmetrizzata di C_k (ovvero $(x, y) \in C_{-k}$ se e solo se $(-x, -y) \in C_k$), si ha che per $k > 0$ tale grafico tende a 0^- per $x \rightarrow 0^-$ e tende a $-\infty$ per $x \rightarrow 0^+$, ha un unico zero in $x = \frac{1}{\log 2}k$ ed è asintotico alla bisettrice $y = x$ per $x \rightarrow \infty$. La funzione $f \in C^\infty$ nel suo dominio, dunque i limiti interessanti sono nei punti della retta $y = 2x$, nei punti dell'asse $x = 0$ e nel punto all'infinito ∞_2 del piano. In un punto $(x_0, 2x_0)$ con $x_0 \neq 0$ il limite è chiaramente $\mp \infty$ a seconda che $x_0 \geq 0$. In un punto $(0, y_0)$ con $y_0 \neq 0$, preso $0 < \varepsilon < |y_0|$ e considerata la semipalla di centro tale punto e raggio ε contenuta nel dominio, in essa si ha che $x \log(2 - \frac{y_0 \pm \varepsilon}{x}) < f(x, y) < x \log(2 - \frac{y_0 - \varepsilon}{x})$ (ciò vale sia quando $y_0 > 0$, caso in cui la semipalla è quella con $x < 0$, sia quando $y_0 < 0$, caso in cui la semipalla è quella con $x > 0$), da cui per il teorema dei carabinieri segue che il limite di f è 0. Quanto all'origine $O(0, 0)$, tendendovi lungo $y = x$ il limite è 0 (e tale resta anche tendendovi lungo ogni altra retta $y = mx$ contenuta nel dominio, ovvero con $m < 2$), ma il limite non può essere 0 perché in ogni intorno di O vi sono altri punti della retta $y = 2x$ in cui il limite è ∞ (mentre, se il limite fosse 0, per definizione dovrebbe esistere un intorno di O nel quale $|f(x, y)| < 1$), dunque in O il limite non esiste; a tal proposito notiamo anche che quando $r \rightarrow 0$ si ha che $f(r \cos \theta, r \sin \theta) = r \cos \theta \log(2 - \text{tg } \theta)$ effettivamente tende a 0 ma non in modo uniforme rispetto a $-\frac{\pi}{2} < \theta < \arctg 2$. Quanto infine a ∞_2 , tendendovi lungo $y = x$ il limite è 0 mentre tendendovi lungo $y = \frac{1}{2}x$ il limite è $\mp \infty$, pertanto anche in questo caso il limite non esiste.
- (b) L'insieme di integrazione $E = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 2x\}$ è contenuto nel dominio di f , e su esso f è continua ma ne' limitata ne' a segno costante, dunque va prestata particolare attenzione perché l'integrale di Lebesgue potrebbe anche non avere senso (ciò accadrebbe nel caso in cui entrambi gli integrali delle sue parti positiva e negativa $f^\pm$ fossero infiniti). Notiamo che, posti $E_\pm = \{(x, y) \in E : x \geq y\}$ si ha $E = E_- \cup E_+$ (a meno di insiemi trascurabili) e $f \geq 0$ su $E_\pm$, dunque $\int_E f^\pm(x, y) dx dy = \pm \int_{E_\pm} f(x, y) dx dy$: esaminiamo dunque i due singoli integrali $\int_{E_\pm} f(x, y) dx dy$, in cui f ha segno costante e che dunque, convergano essi o no, possono essere affrontati come integrali iterati, e poi trarremo le debite conclusioni circa l'esistenza di $\int_E f(x, y) dx dy$ (più precisamente, se almeno uno dei due sarà finito avrà senso definire $\int_E f(x, y) dx dy = \int_{E_+} f(x, y) dx dy - \int_{E_-} f(x, y) dx dy = \int_{E_+} f(x, y) dx dy + \int_{E_-} f(x, y) dx dy$). • Si ha $\int_{E_+} f(x, y) dx dy = \int_{x=0}^{x=1} dx \int_{y=0}^{y=x} x \log(2 - \frac{y}{x}) dy = \int_{x=0}^{x=1} x((y-2x)(\log(2 - \frac{y}{x}) - 1))|_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 (-x(-1) - (-2x)(\log 2 - 1)) dx = (2 \log 2 - 1) \int_0^1 x^2 dx = \frac{2 \log 2 - 1}{3}$, dunque finito (e > 0). • Si ha $\int_{E_-} f(x, y) dx dy = \int_{x=0}^{x=1} dx \int_{y=x}^{y=2x} x \log(2 - \frac{y}{x}) dy = \int_{x=0}^{x=1} x((y-2x)(\log(2 - \frac{y}{x}) - 1))|_{y=x}^{y=2x} dx = \int_0^1 (0 - (-x)(-1)) dx = -\int_0^1 x^2 dx = -\frac{1}{3}$, pure esso finito (e < 0). • Dunque ha senso ed è finito anche $\int_E f(x, y) dx dy = \int_{E_+} f(x, y) dx dy - \int_{E_-} f(x, y) dx dy = \int_{E_+} f(x, y) dx dy + \int_{E_-} f(x, y) dx dy = \frac{2 \log 2 - 1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}(1 - \log 2) < 0$.
3. (a) (Figura 3) L'area della zona piana $A = \{(x, z) : x^2 + z^2 \leq R^2, z > 0, x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}R\}$ può essere calcolata agevolmente

per differenza, vedendo A come $A' \setminus A''$ ove A' è il settore circolare dato (in coordinate polari (ρ, ψ) del piano (x, z)) da $0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{4}$ e $0 \leq \rho \leq R$, e A'' è il triangolo $\{(x, z) : 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}R, 0 \leq z \leq x\}$: si ottiene dunque $\frac{1}{2} \frac{\pi}{4} R^2 - \frac{1}{2} (\frac{\sqrt{2}}{2} R)^2 = \frac{\pi-2}{8} R^2$. Anche il calcolo delle coordinate del baricentro può procedere per differenza tra settore circolare e triangolo: essendo $\int_{A'} x dx dz = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\psi \int_0^R \rho \cos \psi \rho d\rho = \frac{\sqrt{2}}{6} R^3$ e $\int_{A''} x dx dz = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} dx \int_0^x z dz = \frac{1}{6\sqrt{2}} R^3$ otteniamo $x_G = \frac{1}{\text{Area}(A)} (\int_{A'} x dx dz - \int_{A''} x dx dz) = \frac{4}{3\sqrt{2}(\pi-2)} R$; in modo simile si ottiene $z_G = \frac{1}{\text{Area}(A)} (\int_{A'} z dx dz - \int_{A''} z dx dz) = \frac{2(4\sqrt{2}-5)}{\sqrt{2}(\pi-2)} R$. A questo punto, per trovare il volume di D conviene usare il teorema di Guldino per i volumi dei solidi di rotazione, ottenendo $\frac{\pi}{2} x_G \text{Area}(A) = \frac{\pi}{12\sqrt{2}} R^3$. Passiamo infine al momento d'inerzia $\mathcal{I}$ di D rispetto all'asse z : D si può parametrizzare naturalmente in coordinate cilindriche (r, θ, z) con $(r, z) \in A$ e $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, dunque, detta μ la densità di massa, si ottiene $\mathcal{I} = \int_D \mu(x^2 + y^2) dx dy dz = \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_A r^2 r dr dz = \frac{\pi}{2} \mu \int_A r^3 dr dz$. Il calcolo di $\int_A r^3 dr dz$ può essere fatto ancora una volta per differenza tra A' e A'' , ma giusto per cambiare lo facciamo usando la formula di Green (per maggiori spiegazioni sulla quale rimandiamo a (d)), ottenendo $\int_{\partial A} \frac{1}{4} r^4 dz = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4} R^4 \cos^4 \psi R \cos \psi d\psi - \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} \frac{1}{4} (\frac{\sqrt{2}}{2} R)^4 dz = \frac{1}{4} R^5 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^5 \psi d\psi - \frac{\sqrt{2}}{32} R^5 = \frac{7\sqrt{2}}{120} R^5$. In conclusione vale $\mathcal{I} = \frac{\pi}{2} \mu \int_A r^3 dr dz = \frac{7\pi\sqrt{2}}{240} \mu R^5$.

- (b) L si parametrizza naturalmente con gli angoli $\psi \in [0, \frac{\pi}{4}]$ formato dal vettore posizione col piano orizzontale (x, y) e $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ delle coordinate cilindriche, avendo dunque $\phi(\psi, \theta) = (x(\psi, \theta), y(\psi, \theta), z(\psi, \theta)) = (R \cos \psi \cos \theta, R \cos \psi \sin \theta, R \sin \psi)$: l'elemento d'area risulta $d\sigma = R^2 \cos \psi d\psi d\theta$, da cui $\text{Area}(L) = \int_L d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} R^2 \cos \psi d\psi = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} R^2$. Usando invece Guldino, possiamo parametrizzare l'arco Γ di curva sul piano (x, z) che descrive L tramite $(x(\psi), z(\psi)) = (R \cos \psi, R \sin \psi)$, da cui $\text{Area}(L) = \frac{\pi}{2} \int_{\Gamma} x d\ell = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} R \cos \psi R d\psi = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} R^2$, come già ottenuto in precedenza.

- (c) Va verificato che $\Phi_L(\nabla \times F) = \oint_{\partial L} F \cdot d\vec{\ell}$, ove $\nabla \times F = (0, -1, 0)$ è il rotore di $F = (0, 0, x)$. Per L usiamo ancora la parametrizzazione $\phi(\psi, \theta) = (x(\psi, \theta), y(\psi, \theta), z(\psi, \theta)) = (R \cos \psi \cos \theta, R \cos \psi \sin \theta, R \sin \psi)$ con $\psi \in [0, \frac{\pi}{4}]$ e $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$: poiché la normale positiva a L che ne risulta è quella che entra nella sfera (verificare con le tre dita), l'orientazione indotta sul bordo ∂L è quella secondo cui il bordo, visto da fuori, è percorso in senso orario. • Si calcola $\Phi_L(\nabla \times F) = \int_{[0, \frac{\pi}{4}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \det \begin{pmatrix} 0 & -R \sin \psi \cos \theta & -R \cos \psi \sin \theta \\ -1 & -R \sin \psi \sin \theta & R \cos \psi \cos \theta \\ 0 & R \cos \psi & 0 \end{pmatrix} d\psi d\theta = R^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \psi d\psi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta = R^2 (\frac{1}{2} (\psi + \sin \psi \cos \psi)) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} (-\cos \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi+2}{8} R^2$. • Il campo F , ovunque parallelo all'asse z , è ortogonale ai due tratti orizzontali e nullo sul tratto nel piano $x = 0$ del circuito ∂L , dunque l'unico contributo a $\int_{\partial L} F \cdot dx$ viene dall'arco Γ , che stante l'orientazione oraria di ∂L va percorso dal basso verso l'alto: usando la parametrizzazione di Γ già vista nel punto precedente otteniamo dunque $\int_{\partial L} \omega = \int_0^{\frac{\pi}{4}} R \cos \psi R \cos \psi d\psi = R^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \psi d\psi = \frac{\pi+2}{8} R^2$, come già trovato.

- (d) La porzione B della frontiera di D sul piano orizzontale (x, y) è il quarto di corona circolare compreso tra i raggi $\frac{\sqrt{2}}{2}R$ e R : con le coordinate polari si ottiene $\int_B xy^2 dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^R (r \cos \theta) (r^2 \sin^2 \theta) r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin^2 \theta d\theta \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^R r^4 dr = (\frac{1}{3} \sin^3 \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{1}{5} r^5) \Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^R = \frac{1}{15} (1 - \frac{1}{4\sqrt{2}}) R^5$. • Ricordiamo la formula di Green: se W è un aperto di $\mathbb{R}^2$, $U \subset W$ un aperto con bordo regolare ∂U tutto contenuto in W e $f, g : W \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni C^1 , si ha che $\oint_{\partial U} (f dx + g dy) = \int_U (\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}) dx dy$ (ove si intende che ∂U è orientato in senso antiorario). Nel nostro caso abbiamo $W = \mathbb{R}^2$ e $U = B$; per ottenere la funzione integranda $x^2 y$ possiamo ad esempio scegliere $(f, g) = (0, \frac{1}{2} x^2 y^2)$, dunque si tratta di calcolare $\int_{\partial B} \frac{1}{2} x^2 y^2 dy$. Poiché la forma $\frac{1}{2} x^2 y^2 dy$ è nulla sugli assi, i contributi significativi all'integrale provengono dai due tratti curvilinei esterno e interno, percorsi rispettivamente in su e in giù: usando l'ovvia parametrizzazione polare si ha allora $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (R \cos \theta)^2 (R \sin \theta)^2 R \cos \theta d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{1}{2} (\frac{\sqrt{2}}{2} R \cos \theta)^2 (\frac{\sqrt{2}}{2} R \sin \theta)^2 \frac{\sqrt{2}}{2} R \cos \theta d\theta = \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{4\sqrt{2}}) R^5 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \sin^2 \theta d\theta =$ [posto $u = \sin \theta$] $\frac{1}{2} (1 - \frac{1}{4\sqrt{2}}) R^5 \int_0^1 u^2 (1 - u^2) du = (1 - \frac{1}{4\sqrt{2}}) R^5 (\frac{1}{3} u^3 - \frac{1}{5} u^5) \Big|_0^1 = \frac{1}{15} (1 - \frac{1}{4\sqrt{2}}) R^5$, come già trovato in precedenza.

4. (i) (Figura 4) Nell'equazione differenziale totale $\omega = p(x, y) dx + q(x, y) dy = 0$ con $p(x, y) = 2xy - 1$ e $q(x, y) = -x^2$, la forma ω non ha punti singolari (infatti il sistema $p(x, y) = q(x, y) = 0$ non ha soluzioni), e non è esatta in quanto $\frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial q}{\partial x} = 4x \neq 0$. Tuttavia, dopo aver notato che $x = 0$ è una curva integrale dell'equazione, notiamo anche che la funzione $\frac{1}{q} (\frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial q}{\partial x}) = -\frac{4}{x}$ non dipende da y , dunque un fattore integrante è $\exp(\int (-\frac{4}{x}) dz) = \frac{1}{x^4}$: in effetti la forma $\frac{1}{x^4} \omega$ è esatta (perché chiusa in ciascuno dei semipiani $x \geq 0$), con primitiva $F(x, y) = \frac{1}{3x^3} - \frac{y}{x^2}$. Le curve integrali dell'equazione totale sono dunque la già trovata $x = 0$, e le curve di livello $F(x, y) = k$: quanto a queste ultime, se $k = 0$ si trova l'iperbole equilatera $xy = \frac{1}{3}$, e in generale le altre curve $y = \frac{1-3kx^3}{3x}$ sono facilmente disegnabili (vedi in figura). In particolare si noti che, detta C_k la curva data da tale equazione, la curva C_{-k} è la simmetrizzata di C_k rispetto all'origine (ovvero vale $(x, y) \in C_{-k}$ se e solo se $(-x, -y) \in C_k$); inoltre C_k ha un asintoto in $x = 0$, e quando $k \neq 0$ ha un solo zero in $x = (3k)^{-\frac{1}{3}}$ (ove per $k < 0$ si intende che la radice cubica è negativa) ed è asintotica alla parabola $y = -kx^2$.
- (ii) Il sistema autonomo nel piano naturalmente associato all'equazione totale data è $\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ \dot{y} = 2xy - 1 \end{cases}$. Alle domande di questo punto si è già sostanzialmente risposto nel precedente punto (i): il sistema non ha alcun equilibrio (l'equazione totale non ha punti singolari), l'integrale primo è la funzione $F(x, y)$, e le orbite sono i singoli rami connessi delle curve integrali dell'equazione descritte in precedenza. L'unica cosa rimasta da discutere sono i versi di percorrenza di ciascuna orbita, ma anche questo è immediato: per le orbite del tipo $F(x, y) = k$, ovvero i rami delle curve $y = \frac{1-3kx^3}{3x}$, essendo $\dot{x} = x^2 > 0$ esse saranno percorse necessariamente nel verso delle x crescenti, mentre sulla orbita $x = 0$ (ovvero l'asse y) si ottiene

$\dot{y} \equiv -1$ e dunque l'asse verrà percorso in modo uniforme verso il basso, con legge oraria $y(t) = -t + y_0$ (ove $y_0 = y(0)$).

(iii) Per quanto detto prima su simmetria delle curve C_k e verso di percorrenza delle orbite, delle parità proposte l'unica che potrebbe esserci è quella per cui se $\varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t)) : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ è soluzione allora anche $-\varphi(-t) = (-\varphi_1(-t), -\varphi_2(-t)) : -I \rightarrow \mathbb{R}^2$ lo è, ove $-I$ è l'intervallo opposto di I . Ed è vero: detta $\psi(t) := -\varphi(-t)$ (dunque $(\psi_1(t), \psi_2(t)) = (-\varphi_1(-t), -\varphi_2(-t))$) si ha che $\begin{cases} \dot{\psi}_1(t) = \dot{\varphi}_1(-t) = \varphi_1(-t)^2 = (-\varphi_1(-t))^2 = \psi_1(t)^2 \\ \dot{\psi}_2(t) = \dot{\varphi}_2(-t) = 2\varphi_1(-t)\varphi_2(-t) - 1 = 2(-\varphi_1(-t))(-\varphi_2(-t)) - 1 = 2\psi_1(t)\psi_2(t) - 1 \end{cases}$, come si voleva.

(iv) • Se il dato iniziale è con $x_0 = 0$ abbiamo già risposto nel punto (ii): la soluzione è $(x(t), y(t)) = (0, -t + y_0)$, che è definita su tutto $\mathbb{R}$ e percorre uniformemente l'asse y verso il basso. • Se invece il dato iniziale è con $x_0 \neq 0$, da $\dot{x} = x^2$ si ricava facilmente che $x(t) = \frac{x_0}{1-x_0 t}$: ne consegue $\dot{y} = 2\frac{x_0}{1-x_0 t}y - 1$, ovvero l'equazione lineare $\dot{y} + 2\frac{x_0}{x_0 t - 1}y = -1$. Una primitiva di $u(t) = 2\frac{x_0}{x_0 t - 1}$ è $U(t) = 2 \log|x_0 t - 1| = \log(x_0 t - 1)^2$, e $\int e^{U(t)}(-1) dt = -\frac{1}{3x_0}(x_0 t - 1)^3$: si ha dunque $y(t) = e^{-U(t)}(\int_0^t e^{U(\tau)}(-1) d\tau + y_0 e^{U(0)}) = \frac{1}{(x_0 t - 1)^2}(-\frac{1}{3x_0}(x_0 t - 1)^3 - \frac{1}{3x_0} + y_0) = \frac{1}{3x_0}(\frac{3x_0 y_0 - 1}{(x_0 t - 1)^2} + 1 - x_0 t)$. La soluzione è allora $(x(t), y(t)) = (\frac{x_0}{1-x_0 t}, \frac{1}{3x_0}(\frac{3x_0 y_0 - 1}{(x_0 t - 1)^2} + 1 - x_0 t))$, definita sull'intervallo $]-\infty, \frac{1}{x_0}[$ (se $x_0 > 0$) o sull'intervallo $]\frac{1}{x_0}, +\infty[$ (se $x_0 < 0$), intorno in ogni caso dell'istante iniziale $t = 0$.

5. (a) L'equazione differenziale $y'' + (1-2i)y' - 2iy = 2 \cos t - 5e^{-t}$ è lineare del secondo ordine a coefficienti costanti, con termine non omogeneo $\beta(t) = 2 \cos t - 5e^{-t}$ definito su tutto $\mathbb{R}$: sappiamo che allora l'integrale generale S è uno spazio affine di dimensione 2 di funzioni $y(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^2 , ottenuto traslando lo spazio vettoriale 2-dimensionale S_0 delle soluzioni dell'equazione omogenea associata con una qualsiasi soluzione $\tilde{y}(t)$ dell'equazione completa. • L'equazione caratteristica $\tau^2 + (1-2i)\tau - 2i = 0$ ha radici $2i$ e -1 , dunque $S_0 = \{a_1 e^{2it} + a_2 e^{-t} : a_1, a_2 \in \mathbb{C}\}$. Essendo poi $2 \cos t = e^{it} + e^{-it}$, iniziamo trovando due soluzioni particolari per e^{it} e e^{-it} per poi sommarle: esse saranno rispettivamente del tipo $u e^{it}$ e $v e^{-it}$ con u, v da determinare, e i calcoli danno $u = \frac{1+i}{2}$ e $v = -\frac{1-i}{6}$. Quanto a $-5e^{-t}$, poiché -1 è radice caratteristica semplice una soluzione particolare sarà del tipo $w t e^{-t}$, e i calcoli danno $w = 1 - 2i$. Una soluzione particolare per $\beta(t) = 2 \cos t - 5e^{-t}$ sarà pertanto $\tilde{y}(t) = \frac{1+i}{2} e^{it} - \frac{1-i}{6} e^{-it} + (1-2i)t e^{-t}$, da cui l'integrale generale risulta essere $S = \{a_1 e^{2it} + (a_2 + (1-2i)t) e^{-t} + \frac{1+i}{2} e^{it} - \frac{1-i}{6} e^{-it} : a_1, a_2 \in \mathbb{C}\}$.
- (b) Posto $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$, il sistema $Y' = AY + b(t)$ equivalente all'equazione data è quello con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2i & -1+2i \end{pmatrix}$ e $b(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \cos t - 5e^{-t} \end{pmatrix}$. Già sappiamo che gli autovalori di A sono $2i$ e -1 , e che una risolvete per il sistema omogeneo associato è la matrice wronskiana delle soluzioni $\{e^{2it}, e^{-t}\}$, ovvero $W(t) = \begin{pmatrix} e^{2it} & e^{-t} \\ 2i e^{2it} & -e^{-t} \end{pmatrix}$: otteniamo dunque $e^{tA} = W(t)W(0)^{-1} = \begin{pmatrix} e^{2it} & e^{-t} \\ 2i e^{2it} & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2i & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1-2i}{5} \begin{pmatrix} e^{2it} & e^{-t} \\ 2i e^{2it} & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2i & -1 \end{pmatrix} = \frac{1-2i}{5} \begin{pmatrix} e^{2it} + 2i e^{-t} & e^{2it} - e^{-t} \\ 2i(e^{2it} - e^{-t}) & 2i e^{2it} + e^{-t} \end{pmatrix}$. Infine, per trovare la soluzione $Y_0(t)$ del sistema con condizione iniziale nulla (ovvero $Y_0(0) = 0$) si può usare la formula $Y_0(t) = e^{tA} \int_0^t e^{-\tau A} b(\tau) d\tau$, o si può ricordare che naturalmente sarà $Y_0(t) = \begin{pmatrix} y_{0,1}(t) \\ y_{0,2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0(t) \\ y_0'(t) \end{pmatrix}$ ove $y_0(t)$ è la soluzione in S tale che $y_0(0) = y_0'(0) = 0$ (i calcoli dovrebbero dare $(a_1, a_2) = (\frac{1+8i}{3}, -\frac{2(1+5i)}{3})$).

1a. Ex. 1: la superficie S , il punto A e le curve di livello di f . 1b. Ex. 1: il compatto K e le curve di livello di f .

2. Ex. 2: segno, zeri, curve di livello, l'insieme E . 3. Ex. 3. la figura piana A e il solido D . 4. Ex. 4: alcune curve integrali.

1. (a) Quali superfici di livello di $g(x, y, z) = x^2 + yz - \log(x - y + 2z)$ sono regolari? Detta S quella di $A(0, 1, 1)$, trovare lo spazio tangente affine e una parametrizzazione locale di S in A .
- (b) Dire per quale $\alpha \in \mathbb{R}$ si ha che A è stazionario per $f(x, y, z) = x + \alpha y + z$ su S , determinandone la natura. Trovare poi gli estremi di tale f su $K = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 6, x + y \geq 0\}$.

(a) $\nabla g = \left(2x - \frac{1}{x-y+2z}, z + \frac{1}{x-y+2z}, y - \frac{2}{x-y+2z} \right)$
 $\nabla g = 0 \dots$ mai. Dunque tutte le sup. di livello di g sono regolari.
 $g(A) = 1$, $\nabla g(A) = (-1, 2, -1) \Rightarrow$ sp. tg. c.H. $x - 2y + z + 1 = 0$
 Param.: $\frac{\partial g}{\partial x}(A) = -1 \neq 0 \rightarrow x(y, z)$ con $x(1, 1) = 0$,
 $\nabla x(1, 1) = (2, -1)$ (e un anti-ulteriori: $H_x(1, 1) = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$)
 dunque $\gamma(y, z) = (x(y, z), y, z)$ (param. locale di S attorno a A)

(b) $\nabla f = (1, \alpha, 1)$ dev. zero $\parallel \nabla g(A) = (-1, 2, -1) \Leftrightarrow \alpha = -2$
 (mettere di A : $F(y, z) := f(x(y, z), y, z) = x(y, z) - 2y + z$
 $F(1, 1) = f(0, 1, 1) = -1$,
 $\nabla F(y, z) = (\tilde{x}_y - 2, \tilde{x}_z + 1) \Rightarrow \nabla F(1, 1) = (0, 0)$ (ok)
 $H_F(y, z) = H_x(y, z) \Rightarrow H_F(1, 1) = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ DEF. positiva $\Rightarrow$ pts di minimo locale

Nei punti interni di K si $\nabla f \neq 0 \Rightarrow$ estremi assunti sul bordo.

Dettagli della ricerca nelle note (vedi anche la figura).

2. Si consideri la funzione $f(x, y) = x \log(2 - \frac{y}{x})$.

(a) Studiare dominio, zeri, segno, curve di livello e limiti interessanti di f .

(b) Dire se ha senso l'integrale di f su $E = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 2x\}$; se sì, calcolarlo.

(a) Dominio: parte colorata. f positiva / negativa in zone gialle / grigie.
 Gli zeri di f : retta rossa $y = x$.
 Dettagli nelle note.

(b) Insieme E è aperto.
 Su esso, f non è né limitata
 né a segno costante.
 Zone di positività / negatività:

$$E_{\pm} = \{(x, y) \in E : x \gtrless y\}.$$

Esaminare $\int_{E_{\pm}} f \, dx \, dy$ con $F+T$:
 affinché $\int_E f \, dx \, dy$ esista dovremmo

avere entrambi finiti, e in tal caso $\int_E f = \int_{E^+} f + \int_{E^-} f$.

$$\begin{aligned} \int_{E^+} f \, dx \, dy &= \int_{x=0}^{x=1} dx \int_{y=0}^{y=x} x \log(2 - \frac{y}{x}) \, dy = \int_{x=0}^{x=1} x \left[(y-2x) \left(\log(2 - \frac{y}{x}) - 1 \right) \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= (2 \log 2 - 1) \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{2 \log 2 - 1}{3} \quad \text{finito } (e > 0) \end{aligned}$$

$$\int_{E^-} f \, dx \, dy = \int_{x=0}^{x=1} dx \int_{y=x}^{y=2x} x \log(2 - \frac{y}{x}) \, dy = \dots = -\int_0^1 x^2 \, dx = -\frac{1}{3} \quad \text{finito } (e < 0)$$

$$\text{Dunque esiste } \int_E f \, dx \, dy = \frac{2 \log 2 - 1}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{3} (1 - \log 2) < 0$$

3. Si consideri nel piano verticale (x, z) l'insieme $A = \{(x, z) : x^2 + z^2 \leq R^2, z > 0, x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}R\}$, e sia D il solido di $\mathbb{R}^3$ ottenuto ruotando A di un quarto di giro in verso antiorario attorno l'asse z .

- Determinare area e baricentro di A , volume e momento d'inerzia di D rispetto all'asse z .
- Parametrizzare la porzione L della frontiera di D che fa parte della superficie sferica esterna; calcolarne poi l'area in due modi, sia usando la parametrizzazione che il teorema di Guldino.
- Verificare la formula di Kelvin-Stokes per L e per il campo $F = (0, 0, x)$.
- Detta B la porzione della frontiera di D sul piano orizzontale (x, y) , calcolare $\int_B xy^2 dx dy$ sia direttamente che tramite la formula di Green, verificando che il risultato non cambia.

(a) Area (per di meno): $\frac{\pi-2}{8} R^2$
 Baricentro (calcol per differenza) e
 Volume (con Guldino): vedi note

(b) Parametrizziamo L con $\psi = \frac{\pi}{2} - \varphi$ (costante) e θ (variabile), con $0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{4}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
 $\gamma(\psi, \theta) = (R \cos \psi \cos \theta, R \cos \psi \sin \theta, R \sin \psi)$
 $ds = R^2 \cos \psi d\psi d\theta \Rightarrow \text{Area}(L) = \int_0^{\pi/4} \int_0^{\pi/2} R^2 \cos \psi d\psi d\theta = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} R^2$

Alternativa con Guldino: arco di arco $\Gamma: (R \cos \psi, R \sin \psi)$
 dunque $\text{Area}(L) = \frac{\pi}{2} \int_{\Gamma} x dl = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/4} R \cos \psi \cdot R d\psi = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} R^2$.

(c) $F = (0, 0, x) \Rightarrow \nabla \times F = (0, -1, 0)$

Param. $\gamma(\psi, \theta)$ ha normale a/ncade entrante $\Rightarrow$
 orientazi associato di ∂L e' in senso orario (vide de fig).

Si calcola $\oint_L (\nabla \times F) = \frac{\pi+2}{8} R^2$ (altro calcol, vedi note)

D'altra parte F ($\parallel$ axe z) e' $\perp$ tutti orientati di ∂L

e nulla su parte $x=0 \Rightarrow \oint_{\partial L} F \cdot dl = \int_0^{\pi/4} R \cos \psi \cdot R \cos \psi d\psi = \frac{\pi+2}{8} R^2$.

Polar: $\int_B xy^2 dx dy = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^R (r \cos \theta) (r \sin \theta)^2 r dr = \dots$

Green: $\int_B (\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}) dx dy = \oint_{\partial B} (f dx + g dy)$

Per avere $\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = xy^2$ scegliamo $f=0$ e $g = \frac{1}{2} x^2 y^2$

$\oint_{\partial B} \frac{1}{2} x^2 y^2 dy = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (R \cos \theta)^2 (R \sin \theta)^2 R \cos \theta d\theta + 0 + \int_{\pi/2}^0 \frac{1}{2} (\frac{\sqrt{2}}{2} R \cos \theta)^2 (\frac{\sqrt{2}}{2} R \sin \theta)^2$
 $+ \int_0^{\pi/2} (\frac{\sqrt{2}}{2} R \cos \theta)^2 (\frac{\sqrt{2}}{2} R \sin \theta)^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} R \cos \theta d\theta + 0 = \dots$

4. È data l'equazione differenziale totale $(2xy - 1) dx - x^2 dy = 0$.

- Determinare le curve integrali dell'equazione.
- Trovare gli equilibri e un integrale primo del sistema autonomo nel piano naturalmente associato all'equazione. Disegnarne poi le orbite e il verso di percorrenza.
- L'insieme delle soluzioni del sistema ha qualche parità? Nel senso: se $\varphi(t) : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ (ove I è intervallo di $\mathbb{R}$) è soluzione, lo è necessariamente anche $-\varphi(t)$, o $\varphi(-t)$, o $-\varphi(-t)$, o nessuna?
- Trovare il flusso del sistema, cioè le sue soluzioni al variare del dato $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

(i) $\omega = (2xy - 1) dx + (-x^2) dy$
 Nessun punto singolare
 Non esatta ma $\frac{1}{q} \left(\frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial q}{\partial x} \right) = -\frac{1}{x}$ Non si vede da y
 Fattore integrale $\exp\left(\int -\frac{1}{x} dx\right) = \frac{1}{x^2}$
 $\frac{1}{x^2} \omega$: esatta con primitiva $F(x, y)$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{2y}{x^3} - \frac{1}{x^4} \\ \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{1}{x^2} \end{cases} \Rightarrow F(x, y) = \frac{1}{3x^3} - \frac{y}{x^2}$$

Curve integrali: $x=0$, e curve $F=K$.

Per $K=0$: iperboli equilateri $xy = \frac{1}{3}$ (vedi figura)

(ii) Sistema autonomo $\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ \dot{y} = 2xy - 1 \end{cases}$

Pos da aggiungere tranne i versi di percorrenza

(iii) Unica parità è $-\varphi(-t)$, e lo è (vedi note)

(iv) Dato iniziale $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$

- Se $x_0 = 0$: $x \equiv 0$, $\dot{y} = -1 \Rightarrow (x(t), y(t)) = (0, y_0 - t)$
- Se $x_0 \neq 0$: $\dot{x} = x^2 \Rightarrow x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t}$ e poi

$$\dot{y} = 2 \frac{x_0}{1 - x_0 t} y - 1 \Rightarrow \dot{y} + \frac{2x_0}{x_0 t - 1} y = -1 \text{ lineare}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{3x_0} \left(\frac{3x_0 y_0 - 1}{(x_0 t - 1)^2} + 1 - x_0 t \right) \text{ (vedi note)}$$

5. Si consideri l'equazione differenziale $y'' + (1 - 2i)y' - 2iy = 2 \cos t - 5e^{-t}$ nell'incognita $y(t)$.

- (a) Descrivere a priori la struttura dell'integrale generale, indi calcolarlo esplicitamente.
 (b) Scrivere il sistema del primo ordine $Y' = AY + b(t)$ (ove $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$) equivalente all'equazione data; calcolarne poi e^{tA} e la soluzione con condizione iniziale nulla.

(a) Eq. lineare $\mathbb{R}^2$ ordine 2 a coeff. costanti: Soluzioni su $\text{trans} \mathbb{R}$, formano uno spazio affine di dim. 2 in $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
 Radici caratteristiche $2i$ e $-1 \Rightarrow S_0 = \langle e^{2it}, e^{-t} \rangle$.
 Per soluzioni particolari vedi note.

(b) $Y' = AY + b(t)$, con $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2i & -1+2i \end{pmatrix}$,
 $b(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \cos t - 5e^{-t} \end{pmatrix}$
 Risolvente $W(t) = \begin{pmatrix} e^{2it} & e^{-t} \\ 2ie^{2it} & -e^{-t} \end{pmatrix}$

$$e^{tA} = W(t) \cdot W(0)^{-1}$$

Per le soluzioni con condizioni iniziali nulle rinviamo

$$\text{le formule } Y_0(t) = e^{tA} \int_0^t e^{-\tau A} b(\tau) d\tau$$

oppure $Y_0(t) = \begin{pmatrix} y_0(t) \\ y'_0(t) \end{pmatrix}$ ove $y_0(t)$ è soluzione di (i)

talché $y_0(0) = y'_0(0) = 0$ (vedi note).