Primo appello 2005/2006 - Tema 1-M

Esercizio 1

Studiare la seguente funzione

$$f(x) = \arctan \log \left| \frac{x+8}{x+4} \right|. \quad (*)$$

[Dominio, segno, limiti ed eventuali asintoti, continuità ed eventuali prolungamenti per continuità, derivabilità e eventuali limiti della derivata prima (facoltativo), monotonia, punti di estremo relativo ed assoluto, abbozzo del grafico]

Svolgimento

Dominio: Evidentemente l'unica restrizione riguarda l'argomento del logaritmo, che deve verificare

$$\left| \frac{x+8}{x+4} \right| > 0 \quad \text{e} \quad x+4 \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq -8 \quad \text{e} \quad x \neq -4,$$

per cui il dominio D della funzione è l'insieme

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-4, -8\}.$$

Segno: Si ha

$$f(x) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \log \left| \frac{x+8}{x+4} \right| \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left| \frac{x+8}{x+4} \right| \geq 1$$

cioè se e solo se

$$\frac{x+8}{x+4} \leq -1 \quad \text{oppure} \quad \frac{x+8}{x+4} \geq 1.$$

Dalla prima si ottiene

$$2 \cdot \frac{x+6}{x+4} \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -6 \leq x < -4,$$

e dalla seconda

$$\frac{4}{x+4} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -4.$$

Dunque

1. $f(x) > 0$ se e solo se $x > -6$ e $x \neq -4$;
2. $f(x) < 0$ se e solo se $x < -6$ e $x \neq -8$;
3. $f(x) = 0$ se e solo se $x = -6$.

Limiti ed eventuali asintoti: Poiché

$$\lim_{x \rightarrow -8^\pm} \log \left| \frac{x+8}{x+4} \right| = -\infty,$$

risulta

$$\lim_{x \rightarrow -8^\pm} f(x) = -\frac{\pi}{2},$$

e quindi f è prolungabile per continuità in $x = -8$ ponendo $f(-8) = -\pi/2$. Inoltre, poiché

$$\lim_{x \rightarrow -4^\pm} \log \left| \frac{x+8}{x+4} \right| = +\infty,$$

risulta anche

$$\lim_{x \rightarrow -4^\pm} f(x) = \frac{\pi}{2},$$

e dunque f è anche prolungabile per continuità in $x = -4$, ponendo $f(-4) = \pi/2$. In questo modo f risulta funzione continua su tutta la retta reale. È evidente che, poiché $|f(x)| \leq \pi/2$, $x = -8$ e $x = -4$ risultano rispettivamente punto di minimo assoluto e punto di massimo assoluto per la funzione prolungata. Inoltre, essendo limitata, f non ha asintoti verticali. Ricerchiamo eventuali asintoti orizzontali: poiché

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \log \left| \frac{x+8}{x+4} \right| = 0,$$

si ha

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0,$$

e quindi la retta di equazione $y = 0$ è asintoto orizzontale completo per f , che allora non ammette asintoti obliqui.

Derivata prima: In D la funzione è derivabile essendo composizione di funzioni derivabili. Per $x \in D$ si ottiene

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \log^2 \left| \frac{x+8}{x+4} \right|} \cdot \frac{x+4}{x+8} \cdot \frac{x+4 - (x+8)}{(x+4)^2} \\ &= -\frac{4}{1 + \log^2 \left| \frac{x+8}{x+4} \right|} \cdot \frac{1}{(x+4)(x+8)}. \end{aligned}$$

Poiché

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -8} \left(1 + \log^2 \left| \frac{x+8}{x+4} \right| \right) (x+8) &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow -4} \left(1 + \log^2 \left| \frac{x+8}{x+4} \right| \right) (x+4) &= 0, \end{aligned}$$

si ha

$$\lim_{x \rightarrow -8^-} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -8^+} f'(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -4^-} f'(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -4^+} f'(x) = -\infty,$$

e quindi $x = -8$ e $x = -4$ sono cuspidi. Quanto al segno di $f'(x)$, è evidente che

$$f'(x) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+4)(x+8) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -8 < x < -4,$$

da cui risulta che

1. f è strettamente crescente in $[-8, -4]$;
2. f è strettamente decrescente in $] -\infty, -8]$ e in $[-4, +\infty[$;
3. ha un punto di minimo assoluto in $x = -8$ e di massimo assoluto in $x = -4$, come avevamo già osservato.

Un abbozzo del grafico si trova in figura 1.

Figura 1: Esercizio 1

Esercizio 2

Calcolare, se esiste, l'ordine di infinitesimo di f in (*) (Esercizio 1)

1. per $x \rightarrow -6$ (rispetto a $(x + 6)$);
2. per $x \rightarrow +\infty$ (rispetto a $1/x$).

Svolgimento

1. Poiché per $x \rightarrow -6$ si ha

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \arctan \log \left| -1 + \left(\frac{x+8}{x+4} + 1 \right) \right| = \arctan \log \left| -1 + 2 \cdot \frac{x+6}{x+4} \right| \\
 &= \arctan \log \left(1 - 2 \cdot \frac{x+6}{x+4} \right) \\
 &= \log \left(1 - 2 \cdot \frac{x+6}{x+4} \right) + o \left(\log \left(1 - 2 \cdot \frac{x+6}{x+4} \right) \right) \\
 &= -2 \cdot \frac{x+6}{x+4} + o \left(\frac{x+6}{x+4} \right),
 \end{aligned}$$

si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow -6} \frac{f(x)}{x+6} \stackrel{\text{PdS}}{=} \lim_{x \rightarrow -6} -2 \cdot \frac{x+6}{x+4} \cdot \frac{1}{x+6} = 1,$$

da cui si deduce che l'ordine di infinitesimo richiesto è 1.

2. Per $x \rightarrow +\infty$ si ha

$$\begin{aligned} f(x) &= \arctan \log \left| 1 + \left(\frac{x+8}{x+4} - 1 \right) \right| = \arctan \log \left(1 + \frac{4}{x+4} \right) \\ &= \log \left(1 + \frac{4}{x+4} \right) + o \left(\log \left(1 + \frac{4}{x+4} \right) \right) \\ &= \frac{4}{x+4} + o \left(\frac{4}{x+4} \right). \end{aligned}$$

Se ne deduce che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) \stackrel{\text{PdS}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{4}{x+4} = 4,$$

e quindi l'ordine di infinitesimo richiesto è 1.

Esercizio 3

Disegnare sul piano di Gauss l'insieme

$$S = \left\{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} \left(\frac{z+1}{z-i} \right) \leq 0, \quad |z-1-i| \leq 1 \right\}.$$

Svolgimento

Si osservi che certamente $i \notin S$, perchè $(z+1)/(z-i)$ non è definito per $z=i$. Poniamo $z = x + iy$, con $x, y \in \mathbb{R}$. Si ha

$$\begin{aligned} \frac{z+1}{z-i} &= \frac{x+1+iy}{x+i(y-1)} \cdot \frac{x-i(y-1)}{x-i(y-1)} = \frac{(x+1)x + y(y-1) + i[xy - (x+1)(y-1)]}{x^2 + (y-1)^2} \\ &= \frac{(x+1)x + y(y-1)}{x^2 + (y-1)^2} + i \frac{xy - (x+1)(y-1)}{x^2 + (y-1)^2}, \end{aligned}$$

da cui si ottiene

$$\operatorname{Im} \left(\frac{z+1}{z-i} \right) = \frac{xy - (x+1)(y-1)}{x^2 + (y-1)^2}.$$

Dunque

$$\operatorname{Im} \left(\frac{z+1}{z-i} \right) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad xy - (x+1)(y-1) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x - y + 1 \leq 0.$$

Sul piano di Gauss la disequazione $y \geq x+1$ rappresenta il semipiano al di sopra della retta di equazione $y = x+1$. La disequazione $|z-1-i| \leq 1$ rappresenta il cerchio di centro $z_0 = 1+i$ e raggio 1. Per disegnare S bisogna intersecare tale cerchio con il semipiano di cui sopra, escludendo il punto $z=i$ (vedi figura 2).

Figura 2: Esercizio 2

Esercizio 4

Al variare di $x \in \mathbb{R}$ studiare la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n(x^2 + 7x + 12)^n}{12^n(n^2 + 1)}.$$

Svolgimento

Studiamo la convergenza assoluta, e quindi la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n|x^2 + 7x + 12|^n}{12^n(n^2 + 1)}.$$

Usando il criterio della radice si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n|x^2 + 7x + 12|^n}{12^n(n^2 + 1)}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n}|x^2 + 7x + 12|}{12 \sqrt[n]{n^2 + 1}} = \frac{|x^2 + 7x + 12|}{12}.$$

Distinguiamo tre casi.

1.

$$\frac{|x^2 + 7x + 12|}{12} < 1. \quad (1)$$

In tal caso la serie converge assolutamente e quindi anche semplicemente. Osserviamo che (1) è verificata se e solo se

$$-1 < \frac{x^2 + 7x + 12}{12} < 1 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 + 7x + 12 > -12 \\ x^2 + 7x + 12 < 12. \end{cases}$$

La prima disequazione, $x^2 + 7x + 24 > 0$, è sempre verificata perché il discriminante del polinomio di secondo grado è $\Delta = 49 - 2 \cdot 24 < 0$. Quindi (1) è verificata se e solo se

$$x^2 + 7x + 12 < 12 \quad \Leftrightarrow \quad -7 < x < 0.$$

Dunque, se $x \in]-7, 0[$, la serie converge assolutamente.

2.

$$\frac{|x^2 + 7x + 12|}{12} > 1. \quad (2)$$

In tal caso il termine generale della serie non è infinitesimo, e quindi la serie non può convergere assolutamente né semplicemente. Grazie al lavoro svolto al punto 1, (2) è verificata se e solo se

$$x < -7 \quad \text{oppure} \quad x > 0.$$

Dunque, se $x \in]-\infty, -7[$ oppure $x \in]0, +\infty[$, la serie non converge assolutamente né semplicemente.

3.

$$\frac{|x^2 + 7x + 12|}{12} = 1. \quad (3)$$

Osserviamo che (3) vale se e solo se $x = -7$ oppure $x = 0$. In tal caso la serie dei moduli si riduce a

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{n^2 + 1},$$

che è divergente per il criterio asintotico del confronto perché

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n/(n^2 + 1)}{1/n} = 1,$$

e la serie armonica notoriamente diverge. Studiamo la convergenza semplice. Per $x = 0$ o $x = -7$ si ha

$$\frac{x^2 + 7x + 12}{12} = 1,$$

e la serie si riduce a

$$\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + 1},$$

che è una serie a termini di segno alterno. Si osservi che

(a)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n^2 + 1} = 0;$$

(b) la successione

$$n \mapsto \frac{n}{n^2 + 1} \doteq a_n$$

è decrescente. Infatti $a_{n+1} \leq a_n$ se e solo se

$$\frac{n+1}{(n+1)^2 + 1} \leq \frac{n}{n^2 + 1} \quad \Leftrightarrow \quad (n^2 + 1)(n+1) \leq n(n^2 + 2n + 2),$$

cioè se e solo se $n^2 + n - 1 \geq 0$, che è sempre verificata per $n \geq 2$.

Se ne deduce che la serie converge semplicemente per il criterio di Leibniz.

Riassumendo:

- la serie converge assolutamente, e quindi anche semplicemente, se e solo se $-7 < x < 0$;
- la serie converge semplicemente, ma non assolutamente, se e solo se $x = 0$ oppure $x = -7$;
- se $x < -7$ oppure $x > 0$, la serie non converge assolutamente né semplicemente.