Analisi Reale e Complessa - a.a. 2006/2007

Quarto appello

Esercizio 1

Siano $\varepsilon > 0$ e $f_\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ la funzione definita da

$$f_\varepsilon(x) = \frac{1}{x + i\varepsilon}.$$

- (i) Si provi che $f_\varepsilon \in L^2(\mathbb{R})$.
- (ii) Si calcoli la trasformata di Fourier $\widehat{f}_\varepsilon$ di f_ε (sugg.: usare metodi di variabile complessa, separando il caso $\omega > 0$ dal caso $\omega < 0$).
- (iii) Si calcoli il limite per $\varepsilon \rightarrow 0^+$ di $\widehat{f}_\varepsilon$ in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.
- (iv) Usando (iii), si calcoli il limite per $\varepsilon \rightarrow 0^+$ di f_ε in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ (sugg.: può essere utile ricordare che $H = \frac{1}{2}(1 + \text{sgn})$).

Svolgimento

- (i) Si noti che $f \in C^0(\mathbb{R})$ essendo $x + i\varepsilon \neq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Ne segue che $f \in L^2(-1, 1)$. Inoltre, poiché

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} |x||f(x)| = 1,$$

si deduce che $f \in L^2(\mathbb{R} \setminus]-1, 1[)$, essendo $1/|x| \in L^2(\mathbb{R} \setminus]-1, 1[)$. Dunque $f \in L^2(\mathbb{R})$.

- (ii) Grazie al Teorema di Plancherel, per q.o. $\omega \in \mathbb{R}$ si ha

$$\widehat{f}_\varepsilon(\omega) = \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-i\omega x}}{x + i\varepsilon} dx,$$

una volta appurato che il valor principale dell'integrale in questione esista. Poiché

$$\lim_{\substack{z \rightarrow \infty \\ z \in \mathbb{C}}} \frac{1}{z + i\varepsilon} = 0,$$

usando il Lemma di Jordan e il Teorema dei Residui si ricava che

$$\text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-i\omega x}}{x + i\varepsilon} dx = \begin{cases} -2\pi i \operatorname{res} \left(\frac{e^{-i\omega z}}{z + i\varepsilon}, -i\varepsilon \right) & \text{se } \omega > 0, \\ 0 & \text{se } \omega < 0. \end{cases} \quad (1)$$

Essendo $z = -i\varepsilon$ un polo del primo ordine per $z \mapsto e^{-i\omega z}/(z + i\varepsilon)$, si ha

$$\operatorname{res} \left(\frac{e^{-i\omega z}}{z + i\varepsilon}, -i\varepsilon \right) = \lim_{z \rightarrow -i\varepsilon} e^{-i\omega z} = e^{-\varepsilon\omega},$$

da cui, usando (1),

$$\widehat{f}_\varepsilon(\omega) = \begin{cases} -2\pi i e^{-\varepsilon\omega} & \text{se } \omega > 0, \\ 0 & \text{se } \omega < 0. \end{cases}$$

(iii) Fissata una funzione test $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, si ha

$$\langle \widehat{f}_\varepsilon, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}_\varepsilon(\omega) \varphi(\omega) d\omega = -2\pi i \int_0^{+\infty} e^{-\varepsilon\omega} \varphi(\omega) d\omega. \quad (2)$$

Si noti che per ogni $\omega > 0$ si ha

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} e^{-\varepsilon\omega} \varphi(\omega) = \varphi(\omega), \quad |e^{-\varepsilon\omega} \varphi(\omega)| \leq |\varphi(\omega)| \in L^1(\mathbb{R}).$$

Si può quindi usare il Teorema di Lebesgue per passare al limite nell'integrale in (2), ottenendo

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \langle \widehat{f}_\varepsilon, \varphi \rangle = -2\pi i \int_0^{+\infty} \varphi(\omega) d\omega = -2\pi i \langle H, \varphi \rangle,$$

dove H è la funzione di Heaviside. Dunque

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \widehat{f}_\varepsilon = -2\pi i H \quad \text{in } \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

(iv) Poiché la trasformazione di Fourier conserva la convergenza in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, detto f il limite di f_ε in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, si ha che $\widehat{f} = -2\pi i H$. Usando la formula di dualità si ottiene

$$f(-x) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[-2\pi i H](x) = -i \widehat{H}(x) = -i \left(\pi\delta - i \text{p.v.} \frac{1}{x} \right) = -\text{p.v.} \frac{1}{x} - \pi i \delta,$$

da cui si ottiene

$$f = \text{p.v.} \frac{1}{x} - \pi i \delta,$$

essendo p.v.(1/x) dispari e δ pari.

N.B. Per calcolare $\widehat{H}$ è sufficiente osservare che

$$H(x) = \frac{1}{2}(1 + \text{sgn } x),$$

da cui si ricava

$$\widehat{H} = \frac{1}{2} \left(2\pi\delta - 2i \text{p.v.} \frac{1}{\omega} \right) = \pi\delta - i \text{p.v.} \frac{1}{\omega}.$$

Esercizio 2

Sia data la funzione di variabile complessa

$$f(z) = \frac{\cosh(1/z)}{1-z}$$

- i) Classificare le singolarità di f .
- ii) Calcolare il residuo di f in $z_0 = 0$ ed in $z_1 = 1$.
- iii) Calcolare, al variare di $\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$,

$$\int_{C_\lambda(0)} f(z) dz,$$

dove $C_\lambda(0)$ è la circonferenza di centro l'origine e raggio λ .

Svolgimento

- (i) Le singolarità di f si trovano nei punti $z_0 = 0$ e $z_1 = 1$. $z_0 = 0$ è una singolarità essenziale. Infatti

$$\lim_{\substack{z \rightarrow 0 \\ \operatorname{Re} z = 0}} f(z) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cosh(1/iy)}{1 - iy} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(1/y)}{1 - iy}$$

e tale limite non esiste. La singolarità $z_1 = 1$ è un polo del primo ordine: infatti

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} -\cosh(1/z) = -\cosh 1 \neq 0. \quad (3)$$

- (ii) Da (3) si ricava che

$$\operatorname{res}(f, 1) = -\cosh 1.$$

Essendo $z_0 = 0$ una singolarità essenziale per calcolare $\operatorname{res}(f, 0)$ dobbiamo passare attraverso lo sviluppo di Laurent di f centrato in $z_0 = 0$. Poiché possiamo supporre $|z| < 1$, si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1-z} \cdot \cosh \frac{1}{z} = \left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} \frac{1}{z^{2n}} \right) = \sum_{k,n \geq 0} \frac{1}{(2n)!} z^{k-2n} \\ &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{\substack{k-2n=j \\ k,n \geq 0}} \frac{1}{(2n)!} \right) z^j. \end{aligned}$$

Ne segue che

$$\operatorname{res}(f, 0) = \sum_{\substack{k-2n=-1 \\ k,n \geq 0}} \frac{1}{(2n)!} = \sum_{\substack{2n=k+1 \\ k,n \geq 0}} \frac{1}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} = \cosh 1 - 1.$$

- (iii) Grazie al Teorema dei Residui si ha

$$\begin{aligned} \int_{C_\lambda(0)} f(z) dz &= \begin{cases} 2\pi i \operatorname{res}(f, 0) & \text{se } 0 < \lambda < 1, \\ 2\pi i (\operatorname{res}(f, 0) + \operatorname{res}(f, 1)) & \text{se } \lambda > 1, \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2\pi i (\cosh 1 - 1) & \text{se } 0 < \lambda < 1, \\ -2\pi i & \text{se } \lambda > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Esercizio 3

Si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x) & \text{per } 0 < x < 1/2 \\ 0 & \text{per } 1/2 < x < 1. \end{cases}$$

- i) Si determini la serie di Fourier della prolungata 2-periodica pari $\tilde{f}$ di f e se ne studi la convergenza (in $L^2(-1, 1)$, puntuale ed uniforme in $\mathbb{R}$);

ii) se ne deduca la somma della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 - 4n^2};$$

iii) si calcoli la derivata nel senso delle distribuzioni di $\tilde{f}$ e si provi che è una distribuzione temperata.

Svolgimento

(i) La prolungata periodica 2-periodica pari di f (si veda la figura 1) per $-1 < x < 1$ si scrive,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} |\sin(\pi x)| & \text{se } |x| < 1/2, \\ 0 & \text{se } 1/2 < |x| < 1. \end{cases}$$

Figura 1

La sua serie di Fourier è pertanto una serie di soli coseni. Calcoliamone i coefficienti di Fourier. Essendo una serie di soli coseni, $b_k = 0$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Riguardo alla successione degli a_k , per $k = 0, 1$ si ha

$$\begin{aligned} a_0 &= \int_{-1}^1 \tilde{f}(x) dx = 2 \int_0^{1/2} \sin(\pi x) dx = -\frac{2}{\pi} \cos(\pi x) \Big|_0^{1/2} = \frac{2}{\pi}, \\ a_1 &= \int_{-1}^1 \tilde{f}(x) \cos(\pi x) dx = 2 \int_0^{1/2} \sin(\pi x) \cos(\pi x) dx = \int_0^{1/2} \sin(2\pi x) dx \\ &= -\frac{1}{2\pi} \cos(2\pi x) \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{\pi}, \end{aligned}$$

e per $k > 1$

$$\begin{aligned} a_k &= \int_{-1}^1 \tilde{f}(x) \cos(k\pi x) dx = 2 \int_0^{1/2} \sin(\pi x) \cos(k\pi x) dx \\ &= \int_0^{1/2} [\sin(\pi x + k\pi x) + \sin(\pi x - k\pi x)] dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{\pi(k+1)} \cos(\pi(k+1)x) \Big|_0^{1/2} + \frac{1}{\pi(k-1)} \cos(\pi(k-1)x) \Big|_0^{1/2} \\
&= \frac{1}{\pi(k+1)} \left[1 - \cos\left(\frac{\pi}{2}(k+1)\right) \right] + \frac{1}{\pi(k-1)} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}(k-1)\right) - 1 \right] \\
&= \frac{1}{\pi(k+1)} \left[1 + \sin k \frac{\pi}{2} \right] + \frac{1}{\pi(k-1)} \left[\sin k \frac{\pi}{2} - 1 \right] \\
&= \frac{2}{\pi} \frac{k}{k^2-1} \sin k \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \frac{1}{k^2-1}.
\end{aligned}$$

Quindi la serie di Fourier di $\tilde{f}$ si scrive

$$\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \frac{2}{\pi} \sum_{k=2}^{+\infty} \left[\frac{1}{k^2-1} \left(k \sin k \frac{\pi}{2} - 1 \right) \cos(k\pi x) \right].$$

Chiaramente la serie converge in $L^2(-1, 1)$ essendo $\tilde{f}$ funzione limitata e quindi appartenente a $L^2(-1, 1)$. Grazie al criterio di Dini ($\tilde{f}$ è $\mathcal{C}^1$ a tratti), nell'intervallo $] -1, 1[$ la serie converge puntualmente a $\tilde{f}(x)$ per $x \neq \pm 1/2$, mentre converge ad $1/2$ per $x = \pm 1/2$. Inoltre la serie non converge uniformemente, essendo $\tilde{f}$ funzione discontinua con

$$\lim_{x \rightarrow \pm 1/2^+} \tilde{f}(x) \neq \lim_{x \rightarrow \pm 1/2^-} \tilde{f}(x).$$

- (ii) Per calcolare la somma della serie considerata, si prenda $x = 1/2$ nella serie di Fourier di $\tilde{f}$. Grazie alle osservazioni sulla convergenza si ha

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=2}^{+\infty} \left[\frac{1}{k^2-1} \left(k \sin k \frac{\pi}{2} - 1 \right) \cos k \frac{\pi}{2} \right]. \quad (4)$$

Poiché

$$\cos k \frac{\pi}{2} = 0 \quad \text{per } k \text{ dispari,}$$

posto $k = 2j$, (4) si riscrive

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{j=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{4j^2-1} (2j \sin(j\pi) - 1) \cos(j\pi) \right] = \frac{1}{\pi} - \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{(-1)^j}{4j^2-1},$$

da cui si ricava

$$\frac{2}{\pi} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{(-1)^j}{1-4j^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{(-1)^j}{1-4j^2} = \frac{\pi-2}{4}.$$

- (iii) Essendo $\tilde{f}$ funzione $\mathcal{C}^1$ a tratti e $x \mapsto \sin(\pi x)$ funzione 2-periodica

$$\sin(\pi(x+2k)) = \sin(\pi x + 2k\pi) = \sin(\pi x),$$

si ha

$$\tilde{f}'(x) = \pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \operatorname{sgn}(\sin(\pi x)) \cos(\pi x) \chi_{]-1/2+2k, 1/2+2k[}(x) + \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_{-1/2+2k} - \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_{1/2+2k}.$$

Esercizio 4

Siano A un insieme misurabile e $u \in L^1(A) \cap L^\infty(A)$. Si provi che $u \in L^2(A)$ e $\|u\|_{L^2} \leq \|u\|_{L^\infty}^{1/2} \|u\|_{L^1}^{1/2}$.

Svolgimento

Si ha

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^2(A)}^2 &= \int_A |u|^2 = \int_A |u| \cdot |u| \\ &\leq \|u\|_{L^\infty(A)} \int_A |u| = \|u\|_{L^\infty(A)} \|u\|_{L^1(A)} \end{aligned}$$

da cui la tesi.