Dipartimento di Matematica «T. Levi-Civita»
Università di Padova
Associazione «Patavina Mathesis»
Mathesis di Venezia
29 novembre 2024

ChatGPT ed educazione matematica: proposte per la scuola secondaria

Domingo Paola

Laboratorio di Didattica Matematica

DIMA – Università di Genova

… I timori legati all'uso delle tecnologie…

ALCUNE CRITICITÀ NELL'USO DELL'I.A. PER LA DIDATTICA

1. Può essere utilizzata per scrivere testi e risolvere problemi spacciando per propri i prodotti di una macchina

2. Può essere utilizzata come un moderno «oracolo», diminuendo così la capacità di un approccio consapevole e critico al sapere

3. Può essere solo una moda, senza alcun contributo ad affrontare i problemi legati all'educazione e all'istruzione

4. Può essere utilizzata con poca o nessuna attenzione agli aspetti etici (può contribuire ad aumentare l'impatto sull'ambiente, alla diffusione di informazioni false, di pregiudizi, di posizioni lesive dei diritti umani …)

Che cosa significa un approccio etico, in campo educativo, alle tecnologie dell'intelligenza artificiale?



Utilizzare eticamente la tecnologia digitale oggi significa cercare di trasformare l'innovazione in un mondo digitale *sostenibile*
Quali responsabilità della scuola

Il primo obiettivo è la cosiddetta *media education* che consente di affrontare il problema dell'analfabetismo digitale e del *digital divide*

Il secondo obiettivo è aumentare la consapevolezza di quali sono i diritti degli individui relativamente alla privacy nei confronti del potere dei grandi attori digitali

Il terzo obiettivo è aumentare la consapevolezza della necessità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e delle idee nell'era digitale

«È solo l'*education* che può rimuovere lo svantaggio epistemologico e pratico, per favorire la partecipazione attiva di tutti nel mondo digitale»

“[…] Possiamo smettere di cercare modelli teorici. Possiamo analizzare i dati senza alcuna ipotesi su cosa questi possano mostrare. Possiamo inviare i numeri nel più grande insieme di computer che il mondo abbia mai visto e lasciare che algoritmi statistici trovino modelli dove la scienza non può […] La correlazione soppianta la causalità e le scienze possono avanzare addirittura senza modelli teorici coerenti, teorie unificate o una qualche tipo di spiegazione meccanicistica”.

***Chris Anderson, The End of Theory,* Wired, 2008**

"[...] Possiamo smettere di cercare modelli teorici. Possiamo analizzare i dati senza alcuna ipotesi su cosa questi possano mostrare. Possiamo inviare i numeri ne grande insieme di computer che il m abbia mai visto e lasciare che alg statistici trovino modelli dove non può [...] La correlazion causalità e le scienze po addirittura senza mo teorie unificate o spiegazione m

***Chris Ande ory,* Wired, 2008**

«Meccanizzare» l'uomo o «umanizzare» la macchina?

IA e insegnamento-apprendimento della matematica: esempi per la scuola secondaria relativi a:

- Definire e aiutare la costruzione di significati per gli oggetti matematici

- Argomentare, giustificare, dimostrare

- Risolvere problemi

Definire e aiutare la costruzione di significati per gli oggetti matematici

Il concetto di funzione



Prompt: Potresti suggerirmi come introdurre il concetto di funzione a studentesse e studenti di 12-13 anni, giustificando anche la tua risposta?

Caratteristiche della risposta di ChatGPT

La funzione come macchina INPUT-OUTPUT con

- Esempi pratici (es. la macchina per i popcorn trasforma i chicchi di mais in popcorn)
- Rappresentazioni visive: una scatola che riceve un valore come INPUT, applica una regola e produce un altro valore come OUTPUT (es. una scatola che aggiunge 3 a qualunque valore inserito)
- Formule e grafici, ma a partire da esempi pratici (es. il prezzo di un gelato in funzione del numero di palline: se ogni pallina costa 2 €, il costo totale si ottiene moltiplicando l'INPUT, il numero x di palline, per 2. La formula è $f(x) = 2x$. Poi si passa al grafico cartesiano, mostrando come le coppie (INPUT, OUTPUT) stanno su una retta).

Giustificazione dell'approccio fornita da ChatGPT

L'approccio

- È concreto e quindi «aiuta gli studenti a comprendere meglio il concetto astratto di funzione, rendendolo meno intimidatorio»
- Favorisce la visualizzazione: i disegni di macchine INPUT-OUTPUT e i grafici cartesiani forniscono un supporto visivo che facilita la comprensione
- È semplice: «partire con funzioni lineari semplici evita di sovraccaricare gli studenti con dettagli troppo complessi, mantenendo l'attenzione e favorendo un apprendimento graduale»
- È interattivo: coinvolge gli studenti con esempi pratici facilitando l'apprendimento con una partecipazione attiva

Prompt: puoi indicarmi punti di forza, ma anche di criticità dell'approccio che hai suggerito rispetto a quello di funzione come particolare sottoinsieme di un prodotto cartesiano di insiemi?



- Definizione di Bourbaki, 1939 (Eléments De Mathématique, Théorie Des Ensémbles):

Funzione come tripla (X, Y, F) *di insiemi*: X dominio, Y codominio, $F \subset X \times Y$ grafico

$$(x, y_1), (x, y_2) \in F \quad \Rightarrow \quad y_1 = y_2$$

Caratteristiche della risposta di ChatGPT

Punti di forza: comprensibilità immediata; possibilità di visualizzare il concetto; rilevanza pratica (sia per il riferimento a situazioni quotidiane, sia per la possibilità per gli studenti di vedere subito semplici applicazioni)

Criticità: superficialità iniziale dovuta all'astrazione limitata con conseguente difficoltà a passare da questo approccio concreto a definizioni più astratte; limitazioni del rigore matematico dovute a una definizione informale, ma anche alla mancanza di generalizzazione (non affronta la generalizzazione del concetto di funzione a insiemi non numerici)

Prompt: riferendoti all'approccio concreto hai indicato, come criticità, la Mancanza di generalizzazione (Non affronta la generalizzazione del concetto di funzione a insiemi non numerici). Però anche con la definizione di funzione come macchina INPUT-OUTPUT si può far riferimento a contesti non numerici. Tu stesso hai proposto come esempio quello della macchina che trasforma chicchi di mais in popcorn; non mi sembra che il concetto di funzione come macchina INPUT - OUTPUT sia meno generale di quello di funzione come particolare sottoinsieme di un prodotto cartesiano. Semmai mi sembra che nel concetto di funzione come macchina INPUT-OUTPUT rimanga più nascosto il concetto di dominio di una funzione ... che ne pensi?

Parte della risposta di ChatGPT

Hai assolutamente ragione. Il concetto di funzione come macchina INPUT-OUTPUT può essere applicato a contesti non numerici, e può essere altrettanto generale quanto la definizione formale che coinvolge prodotti cartesiani. La criticità che hai sottolineato, riguardo alla mancanza di generalizzazione, non è del tutto corretta. Piuttosto, il problema può risiedere nella comprensione del concetto di dominio. Ecco una riformulazione del punto, tenendo in considerazione la tua osservazione:

Criticità dell'approccio concreto (riformulata):

1. **Dominio meno evidente**:
    - **Dominio implicito**: Il concetto di dominio di una funzione può risultare meno evidente nell'approccio concreto, dove l'attenzione è più focalizzata sulla trasformazione dell'input in output piuttosto che sull'insieme di tutti gli input possibili.
    - **Esplicita necessità**: È necessario esplicitare agli studenti che ogni "macchina" ha un insieme specifico di valori in ingresso (dominio) per chiarire pienamente il concetto di funzione.

Funzione: macchina INPUT-OUTPUT che opera sugli INPUT restituendo, per ciascun INPUT uno e un solo OUTPUT

Disegno proposto da ChatGPT per rappresentare la macchina che «addiziona 3 a ogni INPUT»



Ecco il disegno semplificato della macchina INPUT-OUTPUT che puoi utilizzare in classe:

Questo diagramma mostra un solo input (21), un solo output (24) e la regola "Aggiungi 3" all'interno della scatola della funzione, rendendo il concetto di funzione ancora più chiaro e immediato per gli studenti.

• Definizione di Bourbaki, 1939 (Eléments De Mathématique, Théorie Des Ensémbles):

Funzione come tripla (X, Y, F) *di insiemi*: X dominio, Y codominio, $F \subset X \times Y$ grafico

$$(x, y_1), (x, y_2) \in F \quad \Rightarrow \quad y_1 = y_2$$

Prompt: è vero che la definizione di Bourbaki ha il merito di esprimere il concetto di funzione nel linguaggio degli insiemi?

Parte della risposta di ChatGPT

La definizione di funzione secondo Bourbaki ha il grande merito di ridurre tutto al linguaggio degli insiemi, fornendo una base rigorosa e generale per lo studio delle funzioni. Tuttavia, l'approccio didattico più intuitivo può essere preferibile per introdurre il concetto a studenti giovani o meno esperti. Man mano che gli studenti avanzano negli studi matematici, è utile introdurre la definizione formale per consolidare la loro comprensione teorica e applicativa delle funzioni.

• Definizione di Bourbaki, 1939 (Eléments De Mathématique, Théorie Des Ensémbles):

Funzione come tripla (X, Y, F) *di insiemi*: X dominio, Y codominio, $F \subset X \times Y$ grafico

$$(x, y_1), (x, y_2) \in F \quad \Rightarrow \quad y_1 = y_2$$

Prompt: Però nella definizione di Bourbaki si parla di coppia ordinata, quando si dice che se (x,y_1) appartiene all'insieme F e (x,y_2) appartiene a F, allora $y_1 = y_2$. Come si può esprimere una coppia ordinata nel linguaggio degli insiemi?

Parte della risposta di ChatGPT

Nel linguaggio degli insiemi, una coppia ordinata (a, b) può essere espressa utilizzando solo i concetti di insiemi. Il modo classico per farlo è usare una definizione proposta dal matematico polacco Kazimierz Kuratowski. Secondo questa definizione, la coppia ordinata (a, b) è rappresentata come l'insieme $\{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Prompt: Nella ricerca in didattica della matematica si parla spesso dell'importanza di parlare dei concetti matematici utilizzando diversi registri di rappresentazione, in particolare quello numerico, simbolico e grafico. Perché questo fatto è importante, soprattutto con il concetto di funzione?

Parte della risposta di ChatGPT

Aiuta a migliorare la comprensione, perché offre diversi modi di vedere lo stesso concetto; i registri numerico e grafico forniscono un ponte tra l'intuizione concreta e la simbolizzazione astratta; aiuta a sviluppare competenze diversificate (abilità aritmetiche, manipolazione algebrica, interpretazione visiva); aiuta a riconoscere connessioni tra diversi tipi di rappresentazioni di uno stesso concetto; consente di tenere conto di diversi stili di apprendimento; rinforza la memoria e il richiamo

Osservare, congetturare, argomentare, dimostrare

Il quadrilatero di Varignon





Osservare, congetturare, argomentare, dimostrare: con GeoGebra

Considera un quadrilatero ABCD e i punti medi M del lato AB, N del lato BC, P del lato CD e Q del lato DA.
Che tipo di quadrilatero è MNPQ?





con GeoGebra

1. Esplorazioni – osservazioni – verifiche con studente come *protagonista*:

- diversi tipi di trascinamento (casuale, come in un film, per individuare regolarità; mirato, considerando casi particolari)
- uso della misura, per individuare regolarità e verificarle empiricamente (lunghezze segmenti, ampiezze angoli, pendenze segmenti …)
- costruzione di quadrilateri particolari per verificare congetture
- uso dello strumento di dimostrazione automatica con:
  Verifica(m==p), check numerico e = true
  DettagliVerifica(m==p), check simbolico

che sono a disposizione con GeoGebraART (Automated Reasoning Tools)

l2 = {true, {"TestUguaglianza(A,B)"}}



con GeoGebra

2. Esplorazioni – verifiche con GeoGebra come *protagonista*:

- Uso dello strumento «relazione» per scoprire relazioni tra due o più oggetti individuati dallo studente, per esempio *MN* e *PQ*



check numerico



check simbolico



con GeoGebra

3. Ricerca di teoremi con GeoGebra come *protagonista*:

- uso del comando «Discover» per scoprire relazioni tra oggetti: si fornisce un punto e GeoGebra, con metodi combinatori, offre diverse proprietà relative a uguaglianze di segmenti, parallelismo, allineamento, perpendicolarità che sono testate simbolicamente

Per esempio, selezionando il punto B (Discover(B)) si ottiene

Sets of parallel and perpendicular lines:
- BD ∥ MQ ∥ NP

Congruent segments:
- AM = BM
- BN = CN

Per esempio, selezionando il punto M (Discover(M)) si ottiene

Sets of parallel and perpendicular lines:
- AC ∥ MN ∥ PQ
- BD ∥ MQ ∥ NP

Congruent segments:
- AM = BM
- MN = PQ
- MQ = NP

Osservare, congetturare, argomentare, dimostrare: con GeoGebra

Al termine di questo lavoro la convinzione che alcune congetture sono teoremi è massima: *MNPQ* è un parallelogramma!



questa è la condizione necessaria per essere motivati a spiegare *perché*

Spiegare con l'aiuto di ChatGPT



Prompt: Considera un quadrilatero ABCD e i punti medi M del lato AB, N del lato BC, P del lato CD e Q del lato DA. Che tipo di quadrilatero è MNPQ?

ChatGPT: Il quadrilatero MNPQ, formato dai punti medi dei lati di un quadrilatero generico ABCD, è un **parallelogramma**. Questa proprietà è conosciuta come il **teorema di Varignon**, il quale afferma che i punti medi dei lati di un quadrilatero qualsiasi, uniti in successione, formano sempre un parallelogramma.
Alcune proprietà di questo parallelogramma:
Le sue diagonali sono parallele ai lati del quadrilatero originale.
Le diagonali di questo parallelogramma sono metà delle diagonali del quadrilatero ABCD.
Indipendentemente dalla forma di ABCD (che può essere un quadrilatero qualunque, anche concavo o crociato), MNPQ sarà sempre un parallelogramma.

Spiegare con l’aiuto di ChatGPT



Prompt:
Puoi darmi una dimostrazione del teorema di Varignon?

ChatGPT: fornisce una corretta dimostrazione usando il piano cartesiano e i vettori

Prompt:
Puoi darmi una dimostrazione del teorema di Varignon che utilizzi la geometria di Euclide?

Spiegare con l'aiuto di ChatGPT

Certo! Ecco una dimostrazione del teorema di Varignon che utilizza la geometria euclidea, senza fare ricorso al calcolo delle coordinate o ai vettori.

Ipotesi

Sia ABCD un quadrilatero generico, con i punti medi M, N, P e Q rispettivamente sui lati AB, BC, CD, e DA.

Tesi

Il quadrilatero formato dai punti M, N, P, e Q è un parallelogramma.

Dimostrazione geometrica:

1. **Consideriamo i triangoli:** Prendiamo in considerazione due triangoli opposti nel quadrilatero $ABCD$:
   - Triangolo $\triangle ABD$
   - Triangolo $\triangle BCD$

   Nei triangoli ABD e BCD, colleghiamo i punti medi dei lati:
   - Nel triangolo $\triangle ABD$, i punti M e Q sono rispettivamente i punti medi dei lati AB e AD.
   - Nel triangolo $\triangle BCD$, i punti N e P sono rispettivamente i punti medi dei lati BC e CD.
2. **Proprietà della linea dei punti medi:** Dal **teorema della linea dei punti medi** della geometria euclidea, sappiamo che:
   - Il segmento che unisce i punti medi di due lati di un triangolo è parallelo al terzo lato e la sua lunghezza è metà di quest'ultimo.

   Applicando questo teorema:
   - Nel triangolo $\triangle ABD$, il segmento MQ (che unisce i punti medi M e Q) è parallelo al lato BD e la sua lunghezza è metà di BD.
   - Nel triangolo $\triangle BCD$, il segmento NP (che unisce i punti medi N e P) è parallelo al lato BD e la sua lunghezza è metà di BD.
3. **Segmenti paralleli e congruenti:** Poiché $MQ \parallel BD$ e $NP \parallel BD$, segue che $MQ \parallel NP$. Inoltre, poiché MQ e NP sono entrambi metà di BD, abbiamo che $MQ - NP$.



4. **Segmenti opposti paralleli e congruenti:** In maniera simile, possiamo applicare il teorema della linea dei punti medi ai triangoli $\triangle ABC$ e $\triangle ACD$:
   - Nel triangolo $\triangle ABC$, il segmento MN (che unisce M e N) è parallelo al lato AC e la sua lunghezza è metà di AC.
   - Nel triangolo $\triangle ACD$, il segmento PQ (che unisce P e Q) è parallelo al lato AC e la sua lunghezza è metà di AC.

   Poiché $MN \parallel AC$ e $PQ \parallel AC$, segue che $MN \parallel PQ$. Inoltre, poiché MN e PQ sono entrambi metà di AC, abbiamo che $MN - PQ$.
5. **Conclusione:** Abbiamo dimostrato che:
   - $MN \parallel PQ$ e $MN - PQ$
   - $MQ \parallel NP$ e $MQ - NP$

   Per definizione, un quadrilatero con i lati opposti paralleli e uguali in lunghezza è un **parallelogramma**.

Quindi, il quadrilatero $MNPQ$ è un parallelogramma, come afferma il teorema di Varignon.

Spiegare con l'aiuto di ChatGPT

Certo! Ecco una dimostrazione del teorema di Varignon che utilizza la geometria euclidea, senza fare ricorso al calcolo delle coordinate o ai vettori.

Ipotesi

Sia ABCD un quad
, CD, e DA.

Tesi

Il quadrilatero for

Dimostrazione

1. Consideriamo
   $ABCD$:
   - Triangolo
   - Triangolo

   Nei triangoli
   - Nel trian
     AD.
   - Nel trian
     .
2. Proprietà del
   euclidea, sapp
   - Il segmer
     sua lungh

   Applicando q
   - Nel trian
     lato BD
   - Nel trian
     BD e la sua lunghezza è metà di BD.
3. **Segmenti paralleli e congruenti:** Poiché $MQ \parallel BD$ e $NP \parallel BD$, segue che $MQ \parallel NP$. Inoltre, poiché MQ e NP sono entrambi metà di BD, abbiamo che $MQ - NP$.



ralleli e congruenti: In maniera simile, possiamo applicare il teorema della
i triangoli $\triangle ABC$ e $\triangle ACD$:

ABC, il segmento MN (che unisce M e N) è parallelo al lato AC e la
metà di AC.

ACD, il segmento PQ (che unisce P e Q) è parallelo al lato AC e la sua
à di AC.

$PQ \parallel AC$, segue che $MN \parallel PQ$. Inoltre, poiché MN e PQ sono
, abbiamo che $MN - PQ$.

o dimostrato che:

$N - PQ$ ←

$Q - NP$ ←

quadrilatero con i lati opposti paralleli e uguali in lunghezza è un ←
parallelogramma.

Quindi, il quadrilatero $MNPQ$ è un parallelogramma, come afferma il teorema di Varignon.

Spiegare con l’aiuto di ChatGPT



Prompt:
Nella dimostrazione che hai fatto avresti potuto limitarti a dimostrare che MN è parallelo a PQ e che MQ è parallelo a NP, giusto? Mi sembra non sia necessario dimostrare l’uguaglianza dei lati opposti. Ho ragione?

Hai perfettamente ragione! Per dimostrare che un quadrilatero è un **parallelogramma**, è sufficiente dimostrare che **le coppie di lati opposti sono paralleli.** Non è necessario dimostrare esplicitamente che i lati opposti sono uguali, anche se è una proprietà conseguente.

Infatti, la definizione di un parallelogramma nella geometria euclidea è quella di un quadrilatero con **i lati opposti paralleli.** Una volta che abbiamo dimostrato che $MN \parallel PQ$ e $MQ \parallel NP$, abbiamo già abbastanza informazioni per concludere che $MNPQ$ è un parallelogramma, senza dover dimostrare l'uguaglianza dei lati opposti.

L'uguaglianza dei lati opposti può essere una conseguenza diretta delle dimostrazioni sui punti medi, ma per provare che il quadrilatero è un parallelogramma, è sufficiente la condizione di parallelismo.

Grazie per l'osservazione!

Spiegare con l'aiuto di ChatGPT



Prompt:

Considera ora una configurazione particolare del quadrilatero ABCD. Fai l'ipotesi che sia un rettangolo. In base a questa ipotesi, che tipo di quadrilatero diventa MNPQ, cioè il quadrilatero che ha per vertici i punti medi di ABCD?

Se il quadrilatero $ABCD$ è un rettangolo, allora il quadrilatero $MNPQ$, formato dai punti medi dei suoi lati, diventa un **rombo**.

Ecco perché:

1. **Parallelogramma:** In base al teorema di Varignon, sappiamo già che i punti medi dei lati di un qualsiasi quadrilatero formano un parallelogramma. Quindi, anche se $ABCD$ è un rettangolo, $MNPQ$ sarà un parallelogramma.
2. **Lati congruenti:** Nei rettangoli, i lati opposti sono paralleli e di uguale lunghezza. Poiché i punti medi dividono ogni lato in due segmenti uguali, i segmenti formati unendo i punti medi sono tutti della stessa lunghezza. Questo significa che in $MNPQ$, i quattro lati sono uguali tra loro.
3. **Conclusione:** Un quadrilatero che ha i lati opposti paralleli (come ogni parallelogramma) e tutti i lati uguali è un **rombo**.

Proprietà aggiuntive:

- **Diagonali:** Le diagonali del rombo $MNPQ$ sono perpendicolari tra loro. Inoltre, queste diagonali sono parallele e lunghe metà rispetto alle diagonali del rettangolo $ABCD$.

In sintesi, se $ABCD$ è un rettangolo, allora $MNPQ$ sarà un **rombo**.

Spiegare con l'aiuto di ChatGPT

Prompt:
Quindi possiamo dire che condizione sufficiente affinché MNPQ sia un rombo è che ABCD sia un rettangolo. La condizione è anche necessaria? Possiamo, cioè, dire che "solo se ABCD è un rettangolo allora MNPQ è un rombo"?



ChatGPT:

No, la condizione non è necessaria. Non possiamo affermare che "solo se $ABCD$ è un rettangolo, allora $MNPQ$ è un rombo". In altre parole, $MNPQ$ può essere un rombo anche se $ABCD$ non è un rettangolo.

Perché?

1. **Condizione sufficiente:** È vero che se $ABCD$ è un rettangolo, allora $MNPQ$ è un rombo. Come abbiamo visto, i lati opposti di $MNPQ$ saranno paralleli e tutti uguali se $ABCD$ è un rettangolo.
2. **Condizione necessaria:** Tuttavia, esistono altre configurazioni del quadrilatero $ABCD$ che portano $MNPQ$ a essere un rombo, anche se $ABCD$ non è un rettangolo. Un esempio classico è il **quadrato**. Se $ABCD$ è un quadrato, $MNPQ$ sarà anch'esso un rombo, dato che in un quadrato i lati sono tutti uguali e i punti medi dei lati formano un rombo con diagonali perpendicolari.

Altri casi possono includere quadrilateri che non sono né rettangoli né quadrati, ma comunque simmetrici o con particolari proprietà che assicurano che i lati di $MNPQ$ siano uguali.

Conclusione:

La condizione che $ABCD$ sia un rettangolo è **sufficiente** ma **non necessaria** affinché $MNPQ$ sia un rombo. Altre configurazioni, come il quadrato o certi tipi di parallelogrammi, possono anch'esse generare un rombo come quadrilatero dei punti medi.

Spiegare con l'aiuto di ChatGPT

Prompt:
il controesempio che proponi non mi convince: infatti un quadrato è un particolare rettangolo; quindi non hai portato alcun controesempio alla proposizione "solo se ABCD è un rettangolo allora MNPQ è un rombo". Puoi produrre un vero controesempio?



Hai ragione! Il quadrato è effettivamente un caso particolare di rettangolo, quindi non è un valido controesempio per la proposizione "solo se $ABCD$ è un rettangolo allora $MNPQ$ è un rombo".

Per produrre un vero controesempio, dobbiamo trovare un quadrilatero $ABCD$ che **non** sia un rettangolo, ma per cui $MNPQ$ risulti comunque un rombo. Un possibile controesempio è un **parallelogramma** che **non** è un rettangolo.

Controesempio: Parallelogramma non rettangolo

Consideriamo $ABCD$ un **parallelogramma obliquo**, cioè un parallelogramma che non ha angoli retti. In questo caso, $ABCD$ non è un rettangolo, ma i punti medi M, N, P, e Q dei lati AB, BC, CD, e DA, rispettivamente, formano comunque un **rombo**.

Spiegazione:

1. Nei parallelogrammi, i lati opposti sono paralleli e uguali. Questo implica che i segmenti MN e PQ, così come MQ e NP, sono paralleli e uguali in lunghezza, formando un parallelogramma.
2. Nel caso particolare di un parallelogramma, il quadrilatero $MNPQ$ ha **lati uguali** perché i segmenti MN, PQ, MQ, e NP sono ciascuno metà di un lato del parallelogramma $ABCD$. Di conseguenza, $MNPQ$ è un rombo, poiché tutti i suoi lati sono uguali e i lati opposti sono paralleli.

Conclusione:

Questo è un vero controesempio alla proposizione: $MNPQ$ può essere un rombo anche quando $ABCD$ **non** è un rettangolo, ma un parallelogramma obliquo. Pertanto, la condizione che $ABCD$ sia un rettangolo non è necessaria affinché $MNPQ$ sia un rombo.

Spiegare con l’aiuto di ChatGPT

Prompt:
Anche in questo caso mi sembra che tu ti stia sbagliando: i segmenti PQ e MN sono uguali fra loro, perché sono entrambi la metà di una delle diagonali del parallelogramma ABCD; analogamente i segmenti MQ e NP sono uguali perché sono la metà dell’altra diagonale. Però le diagonali di un parallelogramma non sono, in generale, uguali tra loro, quindi, per esempio, MQ e PQ non sono, in generale, uguali. Quindi, in generale, MNPQ non è un rombo! Puoi produrre un vero controesempio?



Vero controesempio: aquilone

Consideriamo $ABCD$ un **aquilone**, ovvero un quadrilatero convesso in cui due coppie di lati consecutivi sono uguali, ma gli angoli non sono necessariamente retti (quindi non è un rettangolo).

Un aquilone ha le seguenti proprietà:

1. **Diagonali:** Una diagonale è l'asse di simmetria e divide l'aquilone in due triangoli isosceli.
2. **Punti medi:** I punti medi dei lati dell'aquilone formeranno un rombo, perché:
   - La diagonale maggiore dell'aquilone è divisa in parti uguali dai punti medi dei lati ad essa paralleli.
   - La diagonale minore (perpendicolare) viene anche essa divisa simmetricamente.
   - I lati di $MNPQ$ risultano quindi tutti uguali, e le diagonali di $MNPQ$ sono perpendicolari.

Conclusione:

$ABCD$ può essere un aquilone (che non è né un rettangolo né un parallelogramma in generale) e $MNPQ$ risulta comunque un rombo. Questo fornisce un vero controesempio alla proposizione "solo se $ABCD$ è un rettangolo, allora $MNPQ$ è un rombo".

Spiegare con l'aiuto di ChatGPT

Prompt: Anche questo non funziona: se ABCD è un aquilone, allora MNPQ è un rettangolo, non un rombo. Infatti, in generale, i lati consecutivi di MNPQ non sono uguali. Sei sicuro che esista un controesempio alla proposizione "solo se ABCD è un rettangolo allora MNPQ è un rombo"?



Grazie per la tua persistenza, e apprezzo molto le tue osservazioni. Dopo una riflessione più attenta, posso confermare che non esiste un controesempio alla proposizione "solo se $ABCD$ è un rettangolo, allora $MNPQ$ è un rombo". Questa affermazione è infatti corretta.

Ecco perché:

Se $MNPQ$ è un rombo, deve avere:

1. Lati uguali.
2. Diagonali perpendicolari.

Affinché $MNPQ$ soddisfi queste condizioni, il quadrilatero $ABCD$ deve avere delle proprietà molto specifiche. Abbiamo già visto che $MNPQ$ è un parallelogramma in ogni caso, ma affinché diventi un rombo, occorre una particolare simmetria nel quadrilatero $ABCD$, che si trova proprio nei rettangoli.

Dimostrazione del perché la condizione è necessaria:

- Se $ABCD$ è un rettangolo, allora le diagonali di $ABCD$ sono uguali. Ciò comporta che i segmenti MN, PQ, MQ, e NP, che sono metà delle diagonali di $ABCD$, siano uguali tra loro. Questo fa sì che i lati di $MNPQ$ siano tutti uguali, e poiché $MNPQ$ è un parallelogramma, risulta essere un rombo.
- Se $ABCD$ non è un rettangolo, le diagonali di $ABCD$ non sono uguali, quindi i lati di $MNPQ$ non possono essere uguali, e $MNPQ$ non può essere un rombo.

Conclusione:

La condizione che $ABCD$ sia un rettangolo è sia sufficiente che necessaria affinché $MNPQ$ sia un rombo. Non esistono controesempi alla proposizione, quindi possiamo affermare che:

"Solo se $ABCD$ è un rettangolo, allora $MNPQ$ è un rombo" è una proposizione vera.

Spiegare con l'aiuto di ChatGPT

Prompt: Dici che, se ABCD non è un rettangolo, allora le diagonali di ABCD non sono uguali e da questo fai discendere l'affermazione che MNPQ non può essere un rombo. Questo vuol anche dire che, se esistesse un quadrilatero ABCD con le diagonali uguali, diverso da un rettangolo, allora MNPQ potrebbe essere un rombo. Può essere utile per trovare un controesempio alla proposizione "solo se ABCD è un rettangolo allora MNPQ è un rombo"?



Controesempio con un aquilone simmetrico:

Consideriamo un **aquilone simmetrico** (in cui le diagonali sono uguali ma non è un rettangolo). In questo caso, le proprietà delle diagonali uguali implicano che i punti medi M, N, P, e Q formano un rombo, perché i lati di $MNPQ$ risultano essere uguali.

Conclusione:

- Abbiamo trovato un possibile controesempio: un **aquilone simmetrico** (deltoide con diagonali uguali) che non è un rettangolo, ma dove $MNPQ$ è comunque un rombo.
- Questo implica che la proposizione "solo se $ABCD$ è un rettangolo allora $MNPQ$ è un rombo" non è vera.

Un **aquilone simmetrico** rappresenta quindi un controesempio valido.

Alcune brevi riflessioni conclusive
Attività didattiche di questo tipo …

Aiutano a fare matematica in modo diverso, analizzando, criticando, discutendo gli output dell'IA, una *voce* che si aggiunge a quella dell'insegnante e degli studenti

Aiutano a riflettere su attività fondamentali in matematica, come il risolvere problemi e dimostrare

Contribuiscono ad acquisire competenze nell'importante *arte* di porre «buone domande»

Contribuiscono a un approccio consapevole e critico agli strumenti dell'intelligenza artificiale

Aiutano a capire la profonda differenza che esiste tra il modo di essere intelligenti delle attuali macchine e il modo di essere intelligente dell'uomo, contribuendo a comprendere meglio le peculiarità della natura umana

Alcune brevi riflessioni conclusive

«Senza gli input che noi inseriamo nel prompt, gli strumenti di IAG non produrrebbero nulla. Ma la qualità delle domande poste è essenziale per ottenere risposte rilevanti e approfondite. Ciò implica non solo la padronanza della lingua e la capacità di esprimersi in modo coerente, ma anche una comprensione profonda del contesto e degli obiettivi dell'interazione.

L'*ars interrogandi*, cioè la capacità di porre domande significative e pertinenti che guidano le macchine nel processo di interazione e di ricerca di informazioni, richiede quindi un pensiero critico e creativo che consenta all'interlocutore umano di adattare le proprie domande in base alle risposte ricevute e alle informazioni fornite dall'IAG».

«Il prompting, in questo contesto, può essere visto come una chiave di lettura moderna per accedere a una pluralità di contenuti e per sviluppare una capacità critica e riflessiva nell'uso degli strumenti di IAG. Attraverso l'insegnamento di queste tecniche, si può promuovere un approccio più consapevole e critico verso i media e le tecnologie di comunicazione, elemento centrale nel tessuto sociale e culturale contemporaneo»

Alcune brevi riflessioni conclusive

L'I.A. VA PERÒ UTILIZZATA IN UN CONTESTO LABORATORIALE CARATTERIZZATO DA …

- Didattica lunga
- Approccio consapevole e critico agli strumenti
- Attenzione più ai processi che ai prodotti
- Attenzione all'interazione sociale
- Classe come comunità di ricerca, con il docente come coordinatore sempre pronto a intervenire, ma sistematicamente sullo sfondo

La colpa, caro Bruto, non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi, se siamo schiavi

Shakespeare, Giulio Cesare, Atto I

www.matematica.it/paola

Grazie!