

## INSIEMI E FUNZIONI: PRIMA L'UOVO O LA GALLINA?

“Ieri è attraccata nel porto di Genova una nave di 30.000 tonnellate di stazza, salpata da New York, che trasportava rottami di ferro. Trovare l'età del capitano.”

Questo problema fu proposto agli studenti del primo anno di università da un professore di Analisi Matematica: “la settimana prossima portatemi la soluzione”. Quando gli studenti la settimana successiva dissero che non erano riusciti a trovare la soluzione per quanti calcoli avessero fatto, e per quante induzioni avessero tentato, il professore rispose che avrebbero potuto andare a Genova, controllare il registro di arrivo delle navi, trovare il nome del capitano e il suo grado e quindi cercare il registro dei comandanti di navi mercantili e trovare la data di nascita del capitano. Effettivamente c'è una corrispondenza biunivoca tra la nave citata nel problema e l'età del suo comandante; l'incapacità degli studenti di trovare la soluzione dipende dal fatto che essi ritenevano di poter trovare la soluzione effettuando dei calcoli sui dati. L'impossibilità di rispondere a questo quesito tramite calcoli evidenzia un concetto di funzione del tutto nuovo rispetto a quello considerato dagli studenti, il quale rispecchiava la nozione di funzione come ciò che individua dei valori tramite calcoli sui valori di una variabile. Il concetto di funzione come corrispondenza biunivoca tra elementi di due insiemi è invece ora considerato indipendente da formule che coinvolgono gli elementi di tali insiemi.

La teoria degli insiemi, riconoscibile come tale e come ramo della matematica a sé stante, è nata negli ultimi decenni dell'Ottocento: in quegli anni si verificano numerose precisazioni: la definizione di numero irrazionale, la topologia su  $\mathbb{R}^n$ , gli insiemi infiniti, la teoria dei cardinali, gli ordinali transfiniti.

Si abbandona l'idea di cosa sia naturale, cosa sia intuitivo. L'intervallo, la retta, i numeri, sembravano oggetti estremamente intuitivi: ci si avvicina invece a qualcosa che intuitivo non è più. Il creatore della teoria degli insiemi può essere considerato il tedesco Georg Cantor (1845-1918), e un altro grande matematico tedesco, David Hilbert, dirà che le ricerche di Cantor ci hanno condotto in paradiso.

I grandi pilastri della matematica furono per secoli la geometria e i numeri: figure e misure. Nel sec VI a. C. la scuola pitagorica aveva come base della matematica i numeri interi e i loro quozienti, cioè i numeri razionali; e la scoperta della non razionalità della  $\sqrt{2}$  fece crollare queste certezze. Qualche tempo dopo Euclide basò la sua costruzione sulla geometria: i numeri non erano più grandezze primitive, ma semplicemente misure di segmenti e di loro combinazioni, eventualmente misure di prodotti di segmenti, cioè di aree.

I Greci conoscevano alcune curve particolari, ad esempio le sezioni di un cono: ellisse, iperbole e parabola, ma non avevano la necessità di considerare funzioni in generale. Questa necessità venne con la nascita della scienza moderna, cioè con la considerazione del moto dei corpi, la velocità, le traiettorie; in questo quadro più ampio si collocavano le curve già note e se ne scoprivano altre: l'ellisse era la traiettoria di un pianeta, la parabola era la traiettoria di un proiettile, la cicloide è la traiettoria di un punto di una ruota che rotola su una retta, o anche la traiettoria che segue un corpo che sotto l'effetto della sola gravità mette il minimo tempo per congiungere due punti. Può essere interessante sapere che invece Galileo credeva che tale traiettoria di minimo tempo fosse un arco di circonferenza. Si nota qui un primo esempio del concetto di minimo, e di come esso vari a seconda delle condizioni fisiche in cui si opera: il segmento è la linea di minima lunghezza tra due punti e quindi anche di minimo tempo a velocità costante, mentre l'arco di cicloide è il percorso di minimo tempo ad accelerazione costante. La curva che risolve un problema di minimo tempo si dice

*brachistocrona*, da un termine greco che significa “di tempo minimo”. Anche adesso spesso ci preoccupiamo di seguire una strada o un itinerario in cui ci si mette il minimo tempo piuttosto che la strada più corta dal punto di vista dello spazio da percorrere: dove si saltano semafori, dove si sfruttano sensi unici, dove c'è meno traffico.

Il concetto di funzione, legata esclusivamente al suo grafico e alla regolarità di questo (esistenza della sua tangente) si sviluppò durante l'intero Medio Evo e il Rinascimento. Nella prima metà del sec. XVII fu Cartesio a porre nuovamente i numeri come espressioni primarie e a porre il piano cartesiano come luogo naturale della rappresentazione dei grafici delle funzioni. Ma l'evoluzione della scienza non ebbe vita facile in quel periodo: escono a pochi anni di distanza due opere fondamentali di Galileo e Cartesio: Galileo viene imprigionato e costretto ad abiurare perché sostiene la teoria copernicana; Cartesio ne è anch'egli sostenitore, ma dopo il processo a Galileo sceglie di non pubblicare un trattato sul mondo per evitare persecuzioni e si isola rifugiandosi presso la regina Cristina di Svezia.

La prima apparizione della parola *funzione*, in latino *functio*, è registrata in un manoscritto di Leibniz del 1673 in un significato ancora lontano da quello che avrà successivamente: Leibniz stava trattando una grandezza che dipendeva da una curva, e dice che “sta eseguendo una funzione rispetto alla curva”, per esempio è la lunghezza del segmento di tangente dal punto di tangenza sulla curva all'asse delle  $x$ . Di fatto questa grandezza era una funzione di un punto variabile su una curva. Nello stesso manoscritto del 1673 la curva si suppone come una relazione tra  $x$  e  $y$  data tramite un'equazione. Nell'inverno del 1673 Leibniz, diplomatico a Parigi per conto di un principe tedesco, aveva fatto una visita a Londra dove aveva incontrato Newton e discusso con lui di quello che poi sarebbe stato il calcolo differenziale. Parigi e Londra erano due grandi capitali, all'avanguardia anche come livello di vita: in quegli anni si aprivano le prime “botteghe del caffè” a Parigi, e Londra si arricchiva con il commercio del the che percorreva le rotte atlantiche. I due scienziati erano arrivati quasi contemporaneamente al concetto di derivata, e questo poi causerà una diatriba per attribuire la priorità della scoperta. In realtà la notazione che adesso viene usata per indicare la derivata di una funzione  $f$ , cioè  $\frac{df}{dx}$ , fu introdotta da Leibniz, mentre a Newton si deve la notazione usata in meccanica  $\dot{y}$ . Tornato sul continente, Leibniz scrive in estate il lavoro *Methodus tangentium inversa, seu de functionibus*, cioè “Metodo inverso delle tangenti, ovvero sulle funzioni”. Ma egli intende le “funzioni” come grandezze che evidenziano un lavoro da compiere sulla curva, una funzione da espletare: essere tangente alla curva, o essere perpendicolare, o godere di un'altra proprietà sempre legata alla curva. Il termine “functio” viene usato con significato un po' vago per circa vent'anni, quando finalmente lo svizzero Giovanni Bernoulli in una lettera a Leibniz del giugno 1698 propone il termine “funzione di  $x$ ” per una quantità che varia al variare della  $x$ ; e Leibniz approva. Potremmo considerare quella lettera di Bernoulli come il battesimo del termine “funzione” nel significato di “quantità variabile al variare di un'altra”, sempre, beninteso, calcolabile tramite un'espressione.

Se consideriamo la retta bisettrice del primo e terzo quadrante tutti diranno che essa è espressa tramite l'equazione  $y = x$ , dove la  $x$  varia su un intervallo della retta orizzontale. È ancora presto per parlare dell'intera retta, intendendola completata con un punto all'infinito: il concetto di infinito fu più volte affrontato ancora dai Greci, ma non fu mai stabilito chiaramente. I Greci trattavano *procedimenti infiniti* come l'operazione di serie, ma si trovavano in imbarazzo davanti ad insiemi infinitamente grandi o infinitamente piccoli. Pitagora ancora credeva ad un punto come un corpicciolo molto piccolo, ma con le sue dimensioni. E Platone aveva fissato la riga e il compasso come gli unici strumenti con i quali dovessero essere risolti i problemi di

geometria. Durante tutto questo periodo l'unico modo permesso per definire relazioni tra una quantità e un'altra era attraverso *formule*; dapprima, con Cartesio (prima metà del Seicento), tali formule coinvolgevano soltanto polinomi in  $x$  e  $y$  (*funzioni algebriche*): il grado era arbitrario, ma i calcoli effettivi erano svolti per gradi piccoli, e poi estesi, spesso in forma acritica, a gradi qualunque. Ovviamente, risolvendo i polinomi rispetto all'una o all'altra delle variabili si introducevano anche i radicali ad esponente razionale: ad esempio, avendo l'equazione

$$x^2 - y^3 = 0$$

la sua soluzione rispetto ad  $y$  portava

$$y = x^{\frac{2}{3}}.$$

Le funzioni quindi furono semplicemente un modo sintetico per esprimere un grafico sul piano cartesiano; e non veniva considerata una funzione che aveva bisogno di due espressioni; ad esempio la funzione così definita

$$\begin{cases} y = -x & x \leq 0 \\ y = x & x > 0 \end{cases}$$

che si scriverebbe  $y = |x|$ ,  $-\infty < x < +\infty$  non veniva considerata una funzione, in quanto essa non si esprimeva con un'unica espressione analitica. Le funzioni erano dunque soltanto quelle definite su un intervallo della retta, ed esprimibili colà tramite una sola formula coinvolgente funzioni soltanto algebriche.

Sulla espressione di altre funzioni tramite i polinomi uscì, nel 1715, un trattato in latino di Brook Taylor, discepolo di Newton, che presentava allora una formula di approssimazione di funzioni con grafico piuttosto regolare (cioè dotate di derivate) tramite polinomi, formula che prese appunto il nome di *formula di Taylor*. Taylor si occupò del fenomeno della corda vibrante, e determinò l'ampiezza, la frequenza della vibrazione in funzione della lunghezza d'onda, della lunghezza della corda, della sua densità e della sua tensione.

Qualche decennio più tardi anche lo svizzero Leonardo Euler (latinizzato in Eulero) si interessò della corda vibrante e della musica. La suddivisione della scala musicale in sette note era già nota agli Egizi prima del X sec. a. C.; Pitagora, nel VI sec. a. C., studiò il rapporto tra i suoni e le lunghezze di corde vibranti, riconoscendo gli intervalli di ottava e quelli di quinta, e su questi ultimi basò una scala musicale, detta *scala pitagorica*, che non si discosta molto da quella attuale. Venedo ai tempi moderni, uno studio teorico molto approfondito sulle scale musicali e le tonalità fu fatto da Bach, che aveva studiato le teorie di Vivaldi, molto noto in Germania, e a Bach si deve la scala temperata che adesso è su tutti i pianoforti (Bach l'aveva creata dapprima per l'organo, suo strumento d'elezione, e poi per il clavicembalo).

Eulero era una ventina d'anni più giovane di Bach, e prese a studiare il modello matematico della teoria musicale di Bach. Nel suo studio (in latino) sulla corda vibrante cominciò a ritenere valide come funzioni anche espressioni comprendenti non più soltanto polinomi, ma anche funzioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche, in quanto approssimabili con polinomi tramite la formula di Taylor. Solo pochi anni dopo, nel 1739, il francese Jean Baptiste d'Alembert scriverà un trattato (in francese), in cui tratterà in dettaglio l'equazione della corda vibrante e la sua soluzione, che coinvolge funzioni trigonometriche.

(Detto di passaggio: per circa tre secoli, dalla metà del Cinquecento fino ad oltre la metà dell'Ottocento dura la lenta estinzione del latino come lingua dei trattati scientifici, sostituita a poco a poco dalle lingue nazionali: l'italiano, l'inglese, il francese, e, con maggiore ritardo, il tedesco. Escono quindi, spesso contemporaneamente e sullo stesso tema, trattati in latino e in lingue nazionali.)

Se fosse lecito considerare funzioni anche oggetti ottenuti come limite di funzioni elementari, ad esempio serie di funzioni elementari, fu a lungo materia di discussione tra i matematici, finché nel primo decennio dell'Ottocento Fourier pose le serie trigonometriche a base dei suoi studi sulla diffusione del calore. Il problema della diffusione del calore era un problema fondamentale per le artiglierie napoleoniche: lo sparo rendeva rovente la culatta del cannone, e c'era il problema di quando questa si fosse abbastanza raffreddata in modo da poter inserire un nuovo proiettile. Di argomento più distensivo fu invece lo studio della diffusione del calore sotto terra per localizzare meglio le cantine per tenere in fresco il vino anche durante l'estate.

Fourier, oltre che un matematico, fu un amministratore; seguì Napoleone nella campagna d'Egitto e lì rimase anche quando Napoleone tornò a Parigi; fu segretario dell'Istituto d'Egitto, istituzione culturale creata sul modello dell'Istituto di Francia; sotto la sua direzione scientifica alcuni soldati in perlustrazione scoprirono la stele di Rosetta, che poi servì per l'interpretazione della scrittura geroglifica.

La tesi fondamentale di Fourier era che ogni funzione si potesse rappresentare, in un intervallo, mediante una serie in seni e coseni. Egli non lo dimostrò, ma la cosa appariva vera in tutti i casi concreti che si presentavano. Si provò a dimostrarlo un matematico prussiano di origine francese, Peter Lejeune Dirichlet, e nel tentativo di dimostrarlo si imbatté in una funzione che invece non era rappresentabile tramite una serie di funzioni trigonometriche: quella che vale 1 sui razionali e 0 sugli irrazionali, e che prese il nome appunto di *funzione di Dirichlet*. Non vi era formula che potesse descrivere questa funzione; e allora Dirichlet propose come definizione di funzione quella che si usa ancora adesso: *corrispondenza che a ciascun elemento  $x$  di un certo insieme di definizione associa uno ed un solo elemento  $y$  di un altro insieme*, indipendentemente dal modo con cui questa corrispondenza viene definita. A quel tempo si sottintendeva che le  $x$  e le  $y$  appartenevano ad insieme numerici, la  $x$  veniva chiamata *argomento* o *variabile indipendente* e la  $y$  veniva chiamata *valore* o *variabile dipendente*. Successivamente verranno trattati anche insiemi di altra natura, e quindi sarà considerata una funzione anche la corrispondenza tra una nave e l'età del suo capitano.

La funzione di Dirichlet fu scoperta nel 1837. Tuttavia se passiamo ad espressioni che coinvolgono il concetto di limite, anche la funzione di Dirichlet ammette una rappresentazione come limite, non già sotto forma di serie trigonometrica, bensì il seguente:

$$f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(m! \pi x)^n.$$

Infatti, se prendiamo  $x = p/q$ , per un  $m$  abbastanza grande l'argomento del coseno è un multiplo pari di  $2\pi$ , e il coseno quindi vale 1, e pertanto vale 1 anche per  $n \rightarrow \infty$ . Viceversa, se  $x$  è irrazionale, l'argomento del coseno non può risultare un multiplo intero di  $2\pi$  per nessun valore di  $m$ ; quindi il valore del coseno è strettamente minore di 1, e il limite per  $n \rightarrow \infty$  è 0.

Può essere sorprendente che Galileo, Leibniz e Newton, che spaziarono dal Seicento alla prima metà del Settecento e pure si dedicarono intensamente a quello che adesso chiameremo calcolo differenziale, operando quindi su funzioni e su equazioni differenziali principalmente del secondo ordine, quasi non si siano occupati dei fondamenti e di che cosa fosse una funzione. Di fatto la loro matematica era sempre legata a problemi

fisici, per i quali i dati erano numerici, e l'esistenza delle soluzioni di equazioni erano garantite dal buon senso e dal comportamento dei fenomeni naturali. E del resto anche le funzioni di variabile complessa ebbero un grande sviluppo già prima dell'affermarsi del concetto di funzione astratta.

Abbiamo parlato di funzioni definite su intervalli della retta. È ancora presto anche per dire *retta reale* e per associare a questa tre concetti:

- il concetto di insieme *ordinato*, cioè dove è definito il *venire prima* e *venire dopo*, o di *più grande* e *più piccolo*;

- il concetto di insieme *denso*, cioè tale che tra due suoi punti ce ne è sempre almeno un altro; e per poter dare significato alla parola "tra" abbiamo bisogno dell'ordinamento;

- il concetto di insieme *continuo*, cioè senza buchi.

I primi due di questi concetti sono sempre stati intuiti e hanno formato la base dei calcoli e di varie teorie, ma stati individuati con una certa precisione verso la seconda metà dell'Ottocento. Anche il semplice concetto di *numero negativo* ha bisogno dell'ordinamento, in quanto *negativo* è un numero minore di 0.

L'Ottocento ripropose i numeri come base della costruzione matematica, e i numeri reali come numeri principe, in quanto approssimabili con numeri razionali. Cauchy costruì la teoria dei limiti, che consentì di passare dall'insieme dei razionali all'insieme dei reali. È sorprendente che mentre i fondamenti dei numeri reali erano ancora così incerti si fosse già sviluppata la teoria delle funzioni di variabile sia reale che complessa.

In realtà l'insieme dei numeri reali è un modello comodo, ma tutt'altro che utilizzabile. Dei numeri reali si prendono sempre delle approssimazioni tramite razionali, e anzi, tramite razionali finiti, escludendo anche quelli periodici. Né un essere umano né un calcolatore può trattare un numero infinito di cifre. Tutto il modello basato sui limiti, sulla continuità, sulla derivabilità, sulle equazioni differenziali è un bel modello dell'analisi che, a livello macroscopico, descrive abbastanza bene la natura fisica, ma è inutilizzabile nell'analisi numerica, così come è un cattivo modello quando si volesse utilizzarlo per descrivere la natura della fisica atomica e subatomica, dove intervengono quanti e quark.

Presentiamo ancora come ultimo esempio dell'evoluzione del concetto di funzione la  $\delta$ , introdotta dapprima nel 1893 dal fisico inglese Oliver Heaviside, ma poi legata al fisico inglese di origine francese Paul Dirac, che vinse il premio Nobel per la fisica nel 1933, insieme all'austriaco Erwin Schrödinger. Consideriamo le seguenti funzioni, e le rispettive derivate:

Se consideriamo funzioni con grafici espressi da rampe sempre più ripide, possiamo vedere che le derivate hanno grafici che racchiudono sotto di sé superficie che hanno sempre la stessa area, che supponiamo valga 1: basta che la base si restringa tanto quanto l'altezza aumenta. Facendo un'estrapolazione (cioè passando al limite) possiamo pensare che ci sia una "funzione" che vale sempre 0 salvo che nel punto 0 in cui vale  $\infty$ , e che racchiuda sotto di sé una "superficie" di area uguale a 1. La cosa appare piuttosto in contraddizione con l'intuizione: se il grafico di una funzione racchiude sotto di sé una superficie di una data area, tale area non cambia se la funzione viene cambiata di valore in un solo punto; e quindi la superficie dovrebbe avere area 0. Pertanto quello che abbiamo ottenuto non è una funzione nel senso numerico del termine. Il povero Heaviside fu aspramente criticato dai fisici del suo tempo e fu addirittura espulso dalla Royal Society per indegnità teorica. Ma poi l'uso di queste "funzioni generalizzate" si diffuse, specie tra i fisici, e i matematici ne iniziarono una sistemazione teorica. Negli anni Trenta la scuola sovietica, e negli anni Quaranta quella francese svilupparono una teoria che prese il nome di teoria delle *distribuzioni*, che comprendono come caso particolare le funzioni. Una sistemazione definitiva di questa teoria è dovuta al matematico francese Laurent Schwartz, morto nel luglio scorso, e i primi corsi istituzionali universitari in Italia sulla teoria delle distribuzioni furono agli inizi degli anni Sessanta. In particolare l'esempio che abbiamo appena visto, e al quale i fisici e gli ingegneri danno ancora, impropriamente, il nome di funzione, è una distribuzione, detta  $\delta$  di Dirac.

Vediamo quindi una certa altalena tra i vari concetti che sono stati considerati base della matematica. E nel Novecento si è avuto un avvicinarsi ancora più rapido.

Negli anni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento abbiamo un tentativo di mostrare che gli oggetti matematici sono di natura puramente logica: non ci si pone più il problema di cosa siano, bensì a quali leggi obbediscano: la legge che regola il loro comportamento diventa il tratto essenziale. I numeri non sono oggetti ma si identificano con le leggi a cui essi obbediscono.

È bene ricordare che la seconda metà dell'Ottocento è l'epoca della grande matematica tedesca. La Prussia diventa una grande potenza europea: Bismarck è cancelliere per quasi trent'anni, dal 1862 al 1890; viene istituito in Germania il suffragio universale; la Prussia è alleata dell'Italia nella terza guerra d'indipendenza nel 1866; è in una guerra vittoriosa contro la Francia nel 1870, consentendo ai bersaglieri l'irruzione nella Breccia di Porta Pia e la presa di Roma. Nel 1871 nasce l'impero tedesco, nascono i partiti operai, qualche anno dopo la Germania crea un dominio coloniale in Africa; nel 1882 si forma la Triplice Alleanza, e Koch scopre il bacillo della tubercolosi. La Germania diventa il centro culturale dell'Europa continentale, e Berlino con la sua università e la sua Accademia mette in secondo piano Parigi, Vienna, Pietroburgo.

In questo rigoglioso splendore culturale nasce in Germania la *teoria degli insiemi*, ideata dal Gottlob Frege in un trattato scritto in tedesco verso la fine dell'Ottocento, che adesso va sotto il nome di *teoria ingenua degli insiemi*. Gli insiemi sono definiti da due soli principi: il *principio di estensione* (o di *estensionalità*) e il *principio di comprensione*. Il primo definisce un insieme elencando gli oggetti che vi appartengono: il secondo lo definisce indicando le proprietà che i suoi oggetti devono soddisfare. Un insieme definito così:  $\{1, 2, \text{una capra}\}$  è definito per estensione, in quanto vengono indicati gli oggetti che ne fanno parte; l'insieme definito come *i numeri pari* invece non enumera singolarmente tutti gli elementi che ne fanno parte, ma definisce l'insieme indicando che tutti e soli gli elementi di quell'insieme godono della proprietà di essere numeri divisibili per due. In entrambi questi casi, dato un elemento posso dire se

esso appartiene all'insieme o no, e quindi l'insieme è conosciuto. I numeri naturali vengono costruiti così: dapprima si considera l'insieme vuoto,  $\emptyset$ , che è un concetto primitivo; poi si considera l'insieme che ha come elemento l'insieme vuoto  $\{\emptyset\}$ , e quindi ha un elemento, poi l'insieme che ha come elementi quest'ultimo insieme e l'insieme vuoto  $\{\{\emptyset\}, \emptyset\}$ , e quindi ha due elementi, quindi ancora l'insieme che ha per elementi quest'ultimo insieme, il precedente e l'insieme vuoto,  $\{\{\{\emptyset\}, \emptyset\}, \{\emptyset\}, \emptyset\}$  e quindi ha tre elementi, e così via, e si costruiscono così i numeri naturali a partire dagli insiemi.

Sembrerebbe che quindi tutta la matematica si potesse ridurre a numeri, e i numeri agli insiemi, e quindi tutta la matematica alla logica. Ma non è così, perché nel 1902 il filosofo inglese Bertrand Russel propose il seguente paradosso, cioè un enunciato che conduce a una contraddizione:

Dividiamo gli insiemi in due classi: quelli che contengono sé stessi e quelli che non contengono sé stessi. Ad esempio l'insieme di tutti gli insiemi che contengono più di un elemento appartiene a sé stesso, perché certo contiene più di un elemento; l'insieme dei numeri pari non appartiene a sé stesso, perché non è un numero pari.

Domanda: l'insieme  $I$  di tutti gli insiemi che non appartengono a sé stessi appartiene o no a sé stesso? Se supponiamo di sì, allora  $I$  deve essere un insieme che *non* appartiene a sé stesso, e ciò contraddice la supposizione che appartenesse a sé stesso; se supponiamo di no, allora  $I$  deve essere un insieme che *non* appartiene a sé stesso, e allora deve trovarsi in  $I$  e quindi appartenere a sé stesso.

Evidentemente ciò mette in crisi il principio di comprensione, e quindi una teoria degli insiemi basata solo su quei due principi conduce a delle contraddizioni e quindi non è una buona teoria. Un modo per salvarla fu di postulare che tutti gli insiemi siano sottoinsiemi di un insieme universale, e quindi non si possa considerare l'insieme di tutti gli insiemi. La categorizzazione degli insiemi fu estesa negli anni Quaranta alle strutture, poi negli anni Sessanta alle categorie.

Si andò comunque alla ricerca di una costruzione di una teoria degli insiemi che fosse non contraddittoria. Interessante è la teoria degli insiemi proposta dal matematico tedesco Ernst Zermelo nel 1904. Egli partì dal postulare che esistesse almeno un insieme, e poi costruì i successivi insiemi tramite operazioni varie, quali l'unione, il prodotto cartesiano, la potenza: gli insiemi erano quindi costruiti con operazioni analoghe a quelle che operavano sui numeri: l'unione corrispondeva alla somma, il prodotto cartesiano corrispondeva al prodotto, la potenza corrispondeva all'elevazione a potenza. Questi assiomi tuttavia non bastavano per ottenere la costruibilità di insiemi infiniti, e fu necessario quindi aggiungere un assioma che permettesse la costruzione di insiemi infiniti. Dei sette assiomi su cui si basava la sua teoria, uno, il sesto, fu a lungo contestato dagli altri matematici contemporanei. Esso non corrispondeva ai principi di estensione e di comprensione. Si può formulare come *assioma della scelta*, nel seguente modo: Dato un insieme  $U$  costituito da sottoinsiemi  $S_i$  non vuoti, è sempre possibile creare un nuovo insieme  $S$  (*insieme selettivo*) costituito da elementi ciascuno dei quali è scelto da uno dei sottoinsiemi  $S_i$  di  $U$ . Detto in parole semplici: se si hanno (infiniti) sacchi ciascuno con (infiniti) fagioli, è sempre possibile fare la zuppa prendendo un fagiolo da ogni sacco. Viene così considerata esistente la zuppa, senza che si sappia se un certo elemento vi appartiene o no. L'assioma si dice della *scelta* perché di fatto asserisce: per costruire un insieme prendendo un elemento da ogni sottoinsieme *esiste sempre una legge di scelta* anche se non la conosciamo, o non ci preoccupiamo di cercarla. L'ammettere che un insieme esista senza che lo si possa individuare tramite i suoi elementi è un potentissimo strumento per costruire insiemi, che senza questo strumento non potevano essere costruiti.

Ricordo che ancora quando ero studente io, alla fine degli anni Cinquanta, alcuni

miei professori ritenevano non valido l'assioma della scelta, ed i testi universitari di allora non contenevano dimostrazioni in cui si costruivano insiemi sfruttando l'assioma della scelta e non dicendo la legge con cui si costruivano: di tutti gli insiemi costruiti si diceva la legge con cui erano formati.

Al sistema di assiomatizzazione della teoria degli insiemi, rivista da Zermelo nel 1908, aggiunse un assioma l'israeliano di origine tedesca Abraham Fraenkel: i valori assunti da una funzione definita su un insieme costituiscono un insieme. E questa assiomatizzazione è quella accettata tuttora sotto il nome di *teoria di Zermelo-Fraenkel*. Arriviamo quindi ad un collegamento molto stretto tra funzioni ed insiemi: le funzioni si basano sul piano cartesiano, questo si basa sui numeri e i numeri sono riconducibili agli insiemi.

Alla teoria degli insiemi si era dedicato già qualche decennio prima Georg Cantor, che può essere definito il "padre della teoria degli insiemi". Era nato nel 1845 a Pietroburgo, da un mercante tedesco di religione protestante e una madre russa, cattolica. Il clima era freddo e quando il bambino aveva 11 anni il padre portò la famiglia in Germania in cerca di un clima più mite. Cantor rimpianse sempre i suoi anni di Pietroburgo, e non si sentì mai a suo agio in Germania, nonostante egli sia sempre rimasto in Germania dopo di allora e nonostante egli non abbia mai scritto in russo, lingua che pur doveva conoscere. Dopo la maturità Cantor fu mandato al politecnico di Zurigo perché divenisse un buon ingegnere. E invece la prematura morte del padre lo fece ritornare; studiò poi a Berlino, dove si addottorò nel 1867 con una tesi, scritta ancora in latino, sulle equazioni di secondo grado: *De aequationibus secundi gradus indeterminatis*. I suoi studi proseguirono nei campi di quella che ora chiameremo analisi. Non ebbe una carriera brillante, se paragonata alle aspirazioni: allora la massima aspirazione per un matematico era arrivare alla cattedra presso l'università di Berlino. Cantor rimase sempre invece con il posto di professore a Halle, un'università di terz'ordine. Si occupò anche dell'organizzazione dei matematici, fondando ed essendo il primo presidente della società matematica tedesca.

Tra i colleghi Cantor ebbe amici e nemici. Fu grande amico di Dedekind, di una quindicina d'anni più vecchio di lui, che si consigliò con lui per la rappresentazione dei numeri reali tramite le sezioni, come vengono insegnati ancora adesso. Anzi, è recentemente apparsa la traduzione italiana del carteggio tra questi due grandissimi matematici, da cui si desume, oltre che uno spaccato non sempre idilliaco dell'ambiente accademico tedesco, l'evoluzione di numerosi concetti che poi saranno basilari: il concetto di numero, la struttura continua della retta reale, i numeri irrazionali, la classificazione degli insiemi infiniti. Cantor appare, da questo carteggio, una personalità vivace ed entusiasta, romantica, ricca di interessi filosofici; ma traspaiono i segni della sua malattia mentale. Dedekind è più misurato, più freddo. Sullo sfondo di questo epistolario c'è la nascita della matematica moderna, quella che passa dagli oggetti alle strutture, quella che mette in crisi fondamenti millenari e cerca le vie di una costruzione di un nuovo edificio.

Un altro problema che lega insiemi e funzioni è quello della numerosità (o *cardinalità*) degli insiemi. Un insieme ha cardinalità 3 se può essere messo in corrispondenza biunivoca con l'insieme modello  $\{1, 2, 3\}$ . Questa corrispondenza è null'altro che il contare sulle dita. Ovviamente un numero che ha cardinalità 3 non può avere anche un'altra cardinalità, ad esempio 7; cioè un insieme che ha la cardinalità di un numero intero non può essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio. Quando però ci si trova davanti ad insiemi infiniti si vede subito che ad esempio i numeri naturali positivi 1, 2, 3, ... possono essere messi in corrispondenza biunivoca con i soli numeri positivi pari, che sono un loro sottoinsieme proprio: ad ogni



numero naturale viene associato il suo doppio, e ad ogni naturale pari viene associata la sua metà. Si conviene allora di definire *infinito* ogni insieme che può essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio. L'insieme dei numeri naturali positivi è dunque infinito. (Tralasciamo qui le varie discussioni sulle assiomaticizzazioni dei numeri naturali, e supponiamo di conoscerli.) Ad esempio, un segmento, prendiamo ad esempio l'intervallo aperto  $] - 1, +1[$  può essere messo in corrispondenza biunivoca con l'intera retta.

Aristotele diceva che di tipi di infinito ce n'era uno solo, ed era sempre in potenza e mai in atto; e il Medio Evo non si discostò da questo concetto. Ma il matematico arabo Abul Hassan Thābit, del IX secolo, già dispuiva sul fatto che esistono vari tipi di infinito.

Tutti gli insiemi infiniti possono essere messi in corrispondenza biunivoca tra loro? Si scopre di no: alcuni possono essere messi in corrispondenza biunivoca ad esempio con i numeri naturali, che sono infiniti, ma altri no. "Mettere in corrispondenza biunivoca con i naturali positivi" significa semplicemente "mettere in fila", ordinare i numeri dicendo chi è il primo, chi il secondo e così via. Ad esempio i numeri razionali positivi possono essere messi in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali nel modo seguente:

si scrivono i razionali secondo il quadro seguente:

$$\begin{array}{cccc} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots \\ \frac{2}{1} & \frac{2}{2} & \frac{2}{3} & \dots \\ \frac{3}{1} & \frac{3}{2} & \frac{3}{3} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

e poi si mettono in corrispondenza con i naturali mettendoli in fila per diagonali. Tutti i razionali vengono considerati con questo metodo, e quindi nessuno sfugge ad un suo posto nella fila. Ovviamente non si pretende che la fila sia ordinata in ordine di grandezza. Il tipo di infinito congruo ai naturali positivi è lo stesso degli interi relativi (basta mettere in corrispondenza i numeri positivi con i numeri dispari e quelli negativi con i pari), dei razionali. È facile vedere che anche i *numeri algebrici*, cioè le soluzioni di un'equazione algebrica a coefficienti interi, si possono mettere in corrispondenza con i naturali positivi; cioè tutte le soluzioni di equazioni del tipo

$$c_0x^n + c_1x^{n-1} + \dots + c_{n-1}x + c_n = 0$$

per qualsiasi grado  $n$  e per qualsiasi  $n$ -pla di coefficienti interi; infatti non si fa altro che aggiungere ai razionali per ogni equazione a coefficienti interi le sue soluzioni, che sono certo un numero finito. Immediata è la generalizzazione alle equazioni aventi coefficienti razionali; e una successiva generalizzazione ci dice che godono della stessa

proprietà anche tutte le soluzioni di tutte le equazioni algebriche aventi come coefficienti dei numeri algebrici, come ad esempio la seguente:

$$3ix^2 - (2 + 5\sqrt{17})x + \sqrt[3]{90} = 0.$$

Alcuni si sorprenderanno nel vedere un coefficiente complesso: ma anche certi numeri immaginari sono algebrici: ad esempio  $3i$  è soluzione dell'equazione

$$x^2 + 9 = 0.$$

Diremo che tutti questi insiemi hanno la *potenza del numerabile*.

Cantor abbandonò il tentativo di definire le grandezze in sé, ma si limitò a studiarne i comportamenti. Le grandezze diventarono puri simboli, che erano sottoposti a regole di composizione, che per tradizione possiamo chiamare somma, prodotto, divisione, passaggio all'opposto: sono questi comportamenti rispetto a certe operazioni che danno un valore matematico ai simboli. Gli enti matematici sono creati per mezzo di convenzioni arbitrarie, come in un gioco di scacchi in cui un pezzo è definito non dalla forma o dal nome bensì dalle mosse che le regole gli consentono, o in un gioco di carte, in cui il valore è definito dalle prese che la carta può fare o subire.

Questa nuova concezione delle entità matematiche, che riduceva tutto a regole di comportamento e toglieva una sostanza intrinseca ai numeri non fu condivisa dalla maggioranza dei colleghi di Cantor. In particolare un altro matematico tedesco, Kronecker, insegnante in un'università più prestigiosa, criticò pubblicamente in maniera aspra le teorie di Cantor. Ciò fu l'inizio di ricorrenti crisi depressive di Cantor, aggravate dalla morte di un figlio.

Cantor notò poi nel 1874 che i numeri reali non potevano essere messi in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali positivi: se si immagina di porre in fila tutti i reali scritti come allineamento decimale, si può sempre costruire tramite un procedimento diagonale un allineamento decimale che non coincide con nessuno dei reali della fila. Il tipo di infinito dei numeri reali era dunque diverso dalla potenza del numerabile, e poiché i reali contengono strettamente i naturali positivi, si definì che il tipo di infinito dei numeri reali era maggiore della potenza del numerabile, e fu detto *potenza del continuo*. Cantor dimostrò nel 1891 che dato comunque un tipo di infinito, se ne può trovare uno maggiore, e quindi dimostrò che le potenze sono un numero infinito. Alcune corrispondenze biunivoche sono tutt'altro che evidenti: ad esempio si può costruire una curva che occupi un'intera porzione di piano (curva di Peano), e quindi anche il piano ha la potenza del continuo, il che metterà in crisi il concetto di dimensione, che verrà poi messo definitivamente in crisi dalla scoperta dei frattali.

Abbiamo visto che i numeri algebrici hanno la potenza del numerabile, mentre i reali hanno potenza superiore. Ma allora esistono numeri reali che non sono algebrici, cioè non sono soluzioni di nessun polinomio a coefficienti interi uguagliato a 0?. E quanti sono? Incredibilmente, ve ne sono moltissimi, solo che non è così facile individuarli. Solo a metà dell'Ottocento fu dimostrato che la base dei logaritmi naturali, indicata con  $e$ , o *numero di Nepero* non era un numero algebrico; e solo nel 1882 il matematico tedesco Ferdinand Lindemann dimostrò che  $\pi$  non è algebrico. Ci sono voluti quindi secoli per trovarne anche solo qualcuno che non fosse algebrico; ma ad esempio è stato dimostrato che  $e^\pi$  non è algebrico, ma non è ancora stato dimostrato se non lo sia anche  $\pi^e$ , oppure  $\pi e$ . I numeri reali che non sono algebrici si dicono *trascendenti*. E tuttora non esiste metodo per decidere se un numero reale è algebrico o trascendente. E peraltro di  $\pi$  stesso non si conoscono tutte le cifre: ne sono state trovate alcuni milioni, ma non esiste un algoritmo numerico che ci consenta di

trovare la cifra di qualsiasi posto. Quindi anche quando diciamo che “conosciamo  $\pi$ ” intendiamo sempre che ne conosciamo un'approssimazione decimale finita.

Nel canto I dell'Eneide si racconta di Enea che, fuggito da Troia, approda a Cartagine e incontra la regina Didone, che aveva fondato quella città. La leggenda tramandataci da Virgilio racconta che Didone si innamorò di Enea e, rifiutata da lui, si uccise per amore. Dante la colloca nell'Inferno tra i lussuriosi, condannandone in verità soltanto il fatto che aveva tradito il coniuge già defunto. Ma come Didone aveva fondato Cartagine? A quanto pare, risolvendo un problema di area massima: infatti anche lei era approdata fuggitiva in Africa, portando via le ricchezze dalla città fenicia di Tiro dopo che il fratello le aveva ucciso il marito. A lei fu offerto di comperare una terra grande quanto poteva essere compresa in una pelle di bue. Didone prese una pelle di bue e ne ricavò una striscia finissima, con cui cinse un tratto di spiaggia: ebbe quindi bisogno di disporre la striscia solo su una semicirconferenza. Ma aveva capito che se si ha un contorno di una data lunghezza, la figura che ha area massima è il cerchio. Il rapporto tra le circonferenza e il diametro non era ancora conosciuto con precisione; tuttavia è interessante sapere che “circonferenza” si dice in greco *περιφέρεια*, che significa “cosa portata intorno”, da cui il nostro termine “periferia”; e proprio la prima lettera di questa parola è venuta ad indicare il rapporto tra la circonferenza e il suo diametro.

Forse la prima approssimazione di questo rapporto si ha nella Bibbia. Nel primo libro dei *Re* si narra che Salomone mise sette anni per edificare il tempio del Signore, e viene descritta la costruzione, il materiale usato, in larga parte legno, gli arredi, le dimensioni, le porte. Quindi Salomone ebbe bisogno di altri tredici anni per costruire la sua reggia. Anche di questa c'è una minuziosa descrizione: del palazzo, degli arredi, del materiale usato, dell'artista che diresse i lavori. In particolare viene citata la costruzione di un bacino, che era un serbatoio di acqua per lavacri:

*Fece un bacino di metallo fuso di dieci cubiti da un orlo all'altro, rotondo; la sua altezza era di cinque cubiti e la sua circonferenza di trenta cubiti.*

Troviamo qui per la prima volta il dato che il diametro di un bacino rotondo era di dieci cubiti e la circonferenza di trenta, e quindi l'osservazione che la circonferenza è lunga il triplo del diametro: considerando che eravamo dieci secoli prima di Cristo, l'approssimazione  $\pi \approx 3$  può essere considerata già molto buona. Per avere un'idea delle dimensioni, un cubito, che letteralmente voleva dire “gomito”, era un'unità di lunghezza lunga quanto appunto un avambraccio, circa 45 cm. Perciò questo bacino aveva un diametro di 4 metri e mezzo e un'altezza di 2,25 m., e conteneva perciò oltre 35.000 litri d'acqua.

Il fatto che  $\pi$  sia un numero trascendente portò anche a dare risposta ad un altro problema studiato per secoli senza soluzione fin quando la scoperta di Lindemann non rivelò che la soluzione era impossibile. Come abbiamo detto, gli strumenti classici della geometria erano la riga e il compasso, e con quelli per secoli furono risolti i problemi geometrici. Uno di questi appassionò i matematici: dato un cerchio, trovare, tramite la riga e il compasso, un quadrato di uguale area. Notevoli sforzi furono condotti per secoli, ma una soluzione non fu mai trovata, e il problema della *quadratura del cerchio* divenne sinonimo di problema difficilissimo (prima che si scoprisse che era impossibile risolverlo con quegli strumenti). Dante, alla fine dell'ultimo canto del *Paradiso* ci presenta quel problema come termine di paragone di cosa appunto che impegna la mente:

*Qual' è il geometra che tutto s'affige  
per misurar lo cerchio, e non ritrova  
pensando, quel principio ond'elli indige,*

*tal era io a quella vista nova*

La “vista nova” erano delle figure create nella luce di Dio nel punto più alto del Paradiso, e queste figure restano incomprensibili a Dante, finché non viene in suo aiuto un fulgore divino; ma Dante stesso dice che gli mancano le forze per raccontare ciò che vide.

La dimostrazione di Lindemann del 1882 della trascendenza di  $\pi$  comporta anche l'impossibilità di quadrare il cerchio, e ancora adesso la frase “cercare di quadrare il cerchio” indica un tentativo di impossibile riuscita. Un problema di uguale importanza, di fatto un'altra faccia dello stesso problema, fu il problema della *rettificazione della circonferenza*, cioè di costruire, tramite riga e compasso, un segmento lungo quanto una circonferenza partendo dal raggio.

Può essere interessante il notare che non da subito la lettera greca  $\pi$  ebbe il significato che ha ora. Dapprima aveva il significato di circonferenza di raggio 1. Con il significato attuale apparve per la prima volta in un trattato latino del 1706, corredato di ben 100 cifre decimali; si affermò più tardi, da che Eulero lo usò nella sua famosa opera *Introductio in analysin infinitorum* (Introduzione all'analisi degli infiniti) pubblicata nel 1748.

Abbiamo fin qui parlato dei numeri algebrici, che abbiamo ben definito ed abbiamo visto avere la potenza del numerabile, cioè si possono mettere in fila, e dei numeri trascendenti, che sono tutti quelli che non sono algebrici. Poiché i reali non si possono mettere in corrispondenza biunivoca con i naturali positivi, la loro cardinalità, o potenza, cioè il tipo di infinito, è maggiore del numerabile, come abbiamo già detto. Si pone adesso il problema: esiste tra la potenza del numerabile e quella del continuo una potenza intermedia? Nel 1883 Cantor congetturò di no; questa congettura prese il nome di *ipotesi del continuo*.

La dimostrazione di questa congettura fu il primo dei 23 problemi che il matematico tedesco David Hilbert propose al secondo congresso dei matematici svoltosi a Parigi nell'anno 1900. Hilbert aveva elencato tutta una serie di problemi importanti che egli proponeva di risolvere nel secolo che stava per iniziare. Alcuni di questi problemi sono stati effettivamente risolti nell'arco del secolo appena trascorso, altri no, altri ancora invece sono stati dichiarati indecidibili. Tra questi ultimi, proprio quello proposto da Hilbert per primo, che si chiede se esista una potenza intermedia tra quella del numerabile e quella del continuo. A lungo Cantor e i matematici successivi si sforzarono di dimostrare che effettivamente la potenza del continuo era il tipo di infinito immediatamente superiore a quello del numerabile, e Cantor andò quindi alla ricerca di un sottoinsieme dei numeri reali che avesse una potenza superiore a quella dei razionali e inferiore a quella dei reali stessi. Non lo trovò e quello fu uno dei vari motivi che peggiorarono le sue crisi depressive. Durante queste si interessò di altri argomenti, e studiò con impegno la letteratura inglese del periodo elisabettiano; uno degli argomenti a cui dedicò parecchie energie fu il tentativo di dimostrare che le tragedie di Shakespeare erano state in realtà scritte dal filosofo Francesco Bacone, e su questi temi dissertò anche in congressi di matematica, tra lo sbigottimento di tutti i presenti. Per le ricorrenti ricadute della sua malattia mentale Cantor fu esonerato spesso dall'insegnamento; nell'ultimo ricovero in manicomio nel 1917 ebbe anche a soffrire la fame, per la penuria di generi alimentari in Germania a causa della guerra, e lì morì di un attacco cardiaco nei primi giorni del 1918.

L'ipotesi del continuo continuò ad impegnare i matematici ancora per parecchi anni, fin quando nel 1938 il matematico austriaco di nascita ceca Kurt Gödel (poi naturalizzato statunitense) dimostrò che gli insiemi costruibili soddisfano gli assiomi della teoria di Zermelo-Fraenkel e anche l'ipotesi del continuo, e quindi questa non si può

dimostrare falsa partendo dagli assiomi di Zermelo-Fraenkel. Nel 1963 lo statunitense Paul Cohen dimostrò che per tutti gli insiemi compatibili con la teoria di Zermelo-Fraenkel vi sono alcuni casi in cui viene negata l'ipotesi del continuo. Pertanto essa è indipendente dalla teoria degli insiemi, in quanto non può essere né dimostrata né confutata basandosi sugli assiomi della teoria.

Gödel inoltre dette la risposta anche al secondo problema di Hilbert: dimostrare la coerenza della teoria dei numeri, reali o interi. Gödel dimostrò nel 1931 che la coerenza di qualsiasi sistema formale non è dimostrabile all'interno del sistema stesso, e quindi la coerenza di ogni teoria che comprenda quella dei numeri interi non si può dimostrare all'interno della teoria stessa. Nessuna teoria che pretenda di fondare la matematica può autogiustificarsi. Nessuna teoria coerente può essere completa, cioè può dimostrare tutte le verità matematiche esprimibili all'interno di sé stessa, e una di questi asserti indimostrabili è proprio la propria coerenza, per cui il teorema si dice *teorema di incompletezza*.

Nella ricerca del tipo di infinito degli insiemi, Cantor si imbatté in un altro caso bizzarro: un insieme che è "quasi vuoto", eppure ha la potenza del continuo, cioè ha tanti numeri quanti i numeri reali. E questo insieme ha un nuovo interessante aggancio con le funzioni.

Consideriamo l'intervallo  $[0, 1]$ , lo dividiamo in tre parti uguali e ne togliamo il terzo centrale; poi i due terzi laterali rimanenti li dividiamo ancora in tre parti uguali (che quindi sono noni dell'intervallo originario), e ne togliamo le parti centrali, e ripetiamo il procedimento all'infinito otteniamo che abbiamo tolto un insieme che ha misura 1, ma quello che resta è un insieme composto di numeri il cui allineamento ternario non contiene la cifra 1, e questi sono tanti quanti i reali. Tale insieme è detto *insieme di Cantor*. Ad esempio il numero  $1/4$  appartiene a tale insieme.

Infatti per ottenere l'espressione scritta in sistema ternario di un numero tra 0 e 1 scritto in forma decimale, se ne prende la parte intera (nel nostro caso 0), la si moltiplica per 3, si scrive la parte intera del risultato e si moltiplica per 3 la parte decimale restante; si scrive la parte intera del risultato e si moltiplica per 3 la parte decimale restante, e così via. Nel caso di  $1/4$  abbiamo che la parte intera è 0; vediamo la parte decimale:

$$\begin{array}{ll} 0,25 \times 3 = 0,75; \text{ trascrivo } 0; & 0 \\ 0,75 \times 3 = 2,25; \text{ trascrivo } 2; & 02 \\ 0,25 \times 3 = 0,75; \text{ trascrivo } 0; & 020 \\ 0,75 \times 3 = 2,25; \text{ trascrivo } 2; & 0202 \end{array}$$

e quindi abbiamo che  $0,25$  si scrive in numerazione ternaria  $0,0\overline{2}$ . Manca la cifra 1, e quindi  $1/4$  non appartiene mai ad un terzo centrale degli intervalli che vanno a formarsi, e perciò appartiene all'insieme di Cantor. D'altra parte è evidente che la lunghezza dei sottointervalli che restano diventa sempre più piccola fino allo zero.

Costruiamo adesso la funzione che è costante sui terzi centrali e lineare negli altri tratti, e procediamo all'infinito. Al limite abbiamo una funzione che ha derivata zero in tutto l'intervallo salvo che sull'insieme di Cantor, dove non è derivabile. Per essa non vale il teorema fondamentale del calcolo integrale, che vale se l'integranda esiste ovunque ed è continua; infatti, se  $f$  è la funzione di Cantor ed  $f'$  la sua derivata che esiste quasi dappertutto, e dove esiste è nulla, si ha:

$$1 = f(1) - f(0) \neq \int_0^1 f'(x) dx = 0.$$

Con quest'ultimo esempio di connessione tra insiemi e funzioni, vi ringrazio caldamente per l'attenzione e sono a disposizione per le vostre domande.